


THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
1891
LIBRARY



10,80 – Rel. 1,75 (12,55) Papier 70 = (13,25) =

INDEX FUNGORUM,

SISTENS

ICONES ET SPECIMINA SICCA NUPERIS TEMPORIBUS EDITA; ADJECTIS SYNONYMIS

AUCTORE

HERMANN HOFFMANN,

BOTANICES PROF. P. O. GISSENSI.

INDICIS MYCOLOGICI EDITIO AUCTA.

LIPSIAE,

SUMPTIBUS A. FÖRSTNERI, BIBLIOPOLAE.

(A. FELIX.)

1863.

EINLEITUNG.

Da seit dem grossen, für seine Zeit abschliessenden *Systema mycologicum* von E. FRIES (1821—1829) kein neueres systematisch geordnetes Hauptwerk, welches die ganze Pilzkunde umfasste, veröffentlicht worden ist, so erscheint es als ein dringendes Bedürfniss, bis zur Publication eines solchen die grosse Masse der Pilze wenigstens vorläufig alphabetisch zu ordnen und auf diese Weise zugänglich zu machen. FRIES' *Epicrisis* (1836—1838) umfasst nur die bis dahin erschienenen Hymenomyceten; desselben Verfassers *Summa vegetab. Scandinaviae* (1849) bezieht sich in der Aufzählung der Species ausschliesslich auf Schweden und giebt, wie die vorige Schrift, fast keine Citate von Herbarien, welche ein so wichtiges Hülfsmittel für diese Studien geworden sind. Dasselbe gilt von STREINZ' *Nomenclator* (1862) und in noch höherem Grade von FRIES' *Monographia Hymenomycetum*. I. (1857). BERKELEY *Outlines of brit. fungology* (1860) und RABENHORST's *Deutschlands Kryptogamen-Flora, Pilze*, 1844, haben nur eine locale Beschränkung und sind, namentlich ersteres, bezüglich der Citate unvollständig. Im Uebrigen aber sind wir auf Monographien beschränkt, welche nur einen kleinen Theil der Mykologie umfassen und von sehr ungleichem Werthe sind. — Vorliegender Index schliesst sich demnach der Zeitfolge der Publicationen nach dem *Systema mycologicum* von FRIES an, wobei ich jedoch ausdrücklich bemerke, dass die ebengenannten anderen Werke, namentlich die *Epicrisis*, RABENHORST u. s. w., als im Besitze eines jeden Mykologen befindlich vorausgesetzt, d. h. die dort enthaltenen Citate und Synonyme der Regel nach hier nicht noch einmal abgedruckt sind. Dieser Index ist bestimmt, diese Werke zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen.

Ich habe eine Zeit lang geschwankt, ob ich nicht alle seit FRIES und (für Deutschland) RABENHORST publicirten neuen Species aufnehmen sollte, auch die sehr grosse Zahl derjenigen, welche nur durch Diagnosen, nicht aber durch Abbildungen oder *Specimina sicca* bekannt gemacht worden sind. In der That ist eine Uebersicht dieser über die Maassen zerstreuten Literatur ein dringendes und nicht länger abzuweisendes Desiderat, und schon als Vorarbeit für ein zukünftiges *Systema mycologicum* ganz unentbehrlich. Aber das vorliegende Werk wäre dadurch noch manches Jahr hinausgeschoben worden, und so möge es denn auch in dieser anspruchsloseren Form nach Kräften nützen und fördern. Es würde alsdann auch statt der ganz äusserlichen und zufälligen alphabetischen Anordnung die systematische geboten gewesen sein; zu einer solchen Arbeit aber fühle ich mich, in Betracht der jetzigen Bewegung in der Mykologie, keineswegs berufen. Ueberdiess hätte diess wieder ein alphabetisches und Synonymenregister bedingt, womit eine

bedeutende Vergrösserung des Umfanges verbunden war. Wo soll man dann auch ein Ende finden? Blosse systematische Aufführung der Namen (mit den Citaten) würde Wenigen genügt haben; zu den neuen Arten allein die Diagnosen hinzufügen, wäre eine störende Halbheit; sie überall geben, führt natürlich zu einem vollständigen *Systema*, worüber ich mich schon ausgesprochen habe. Es geht eben hier, wie überall, das Erreichbare bleibt stets weit hinter dem zu Wünschenden zurück, und ohne eine gewisse Resignation ist an einen Abschluss nicht zu denken. Ich meines Theils finde, dass die Wissenschaft wie der Horizont ist; je weiter man vorangeht, desto mehr sieht man die Endlosigkeit, man lernt sich endlich beschränken, man muss einem Andern überlassen, was man nicht selbst thun will oder kann. Und ein solcher Wohlthäter wird auch für die systematische Pilzkunde einmal wieder geboren werden. Fürs Erste glaube ich, dass Wohlwollende und billig Denkende mir für meine mühsame und trockene Arbeit Dank wissen werden. So möge denn ein Sammelwerk in jenem Sinne Solchen überlassen bleiben, welche, mit genügender Musse ausgerüstet, in den grossen literarischen Centralpuncten leben und dort die vollständigen und reichen Hülfsmittel erschöpfend ausnutzen können, deren viele mir nur im Fluge zu durchblättern vergönnt war. Ich glaube, dass einem solchen Gelehrten dieser mein Index als eine brauchbare Hülfe sich erweisen werde, und rechne einstweilen darauf, dass derselbe bis dahin allen Denjenigen, welche sich mit dem Bestimmen von Pilzen beschäftigen, dienlich sein kann. — Um indess auch dem systematischen Bedürfniss wenigstens einigermassen in die Hände zu arbeiten, so weit diess bei einem Register dieser Art möglich ist, habe ich überall, wo es anging, auf Fries' *Summa veg. Sc.* verwiesen, als dem derzeit vollständigsten, ja einzigen Werke, welches das ganze System der Pilze gleichmässig durchgearbeitet, wenigstens bezüglich der *Genera*, darlegt; ein Werk, das ohnediess kein Mykologe entbehren kann. Zugleich wurden hierdurch eine grosse Anzahl werthvoller synonymischer Aufklärungen gewonnen, so dass ich die Mühe nicht für eine vergeudete halte, um so mehr, als das diesem Buche beigegebene Register nur die *Genera* enthält, und man danach sehr Vieles, wegen der veränderten Nomenclatur, kaum auffinden kann. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass ich mich auf's Emsigste bemüht habe, dem vorliegenden Werke durch die Sorgfalt in den Citaten, sowie durch den bedeutend vergrösserten Reichthum an benutzten Quellen — worüber ein Blick auf die folgende Uebersicht der citirten Hauptwerke im Vergleich zu meinem *Index mycologicus* in der Botanischen Zeitung 1860 genügenden Aufschluss giebt — möglichste Brauchbarkeit und Vollständigkeit zu verschaffen.

Der Verfasser.

INDEX FUNGORUM.

EXPLICATIO NOMINUM ABBREVIATORUM.

Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. 1840—1842. Bot. Mycologie par Montagne etc. 1848—1855. livr. 1—17.

Ann. Mag. n. h. = Annals and Magazine of natural history. 8°. Vol. I. 1838. — Vol. X. 1862.

Ann. sc. n. = Annales des sciences naturelles, Botanique. Sér. I. XIII. (1828). — XXX (1833). Sér. II. 1834 ff. Sér. III u. IV bis 1862 (XVII).

Act. Tur. = Mémoires de l'Académie de Turin. 4[to]. Sér. I. 1759 ff. bis 1857.

Afz. = Fries, E., Reliquiae Afzelianae; sist. ic. fung. in Guinea coll. Upsala 1860. fol. t. 1—12.

Badham = C. D. Badham, a treatise of the esculent funguses of England. London, Reeves. 1847. 8°.

Bail S. = Bail, System der Pilze. 1858. taf. ..

Berk. J. = M. J. Berkeley, Introduction to cryptogamic Botany. 1857. 8°. (Holzschnitte im Text).

Berk. Out. = M. J. Berkeley, Outlines of british fungology. London. 1860. 8°. (Namen auf den Tafeln ohne Autoren.)

Bisch. = Bischoff, Handbuch der bot. Terminologie, 1830 ff. 4[to]. Separatabdruck: Kryptogamenkunde mit 30 Tafeln. 1860 (meist Copien).

Bivona; = A. Stirpium rar. minusque cognitar. in Sicilia sponte proven. desc. ic. 3 Hefte. Panormi 1815.

Bonite = Voyage autour du monde exécuté sur la Bonite. 1836—1837. Botanique par Gaudichaud. I. 1844—1846. Text in 8°. (citirt bis p. 204).

Bon. = Bonorden, Handbuch der Mykologie. 1851. Atlas in 4[to]. Fig. ..

Bon. Con. = Bonorden, Coniomycetes, in Abhandl. d. nat. Ges. in Halle. 1860. V. 3. u. 4. 4[to].

Borszczow = Fungi ingrici. (Beitr. z. Pflanzenkunde des russ. Reichs. Lief. 10. Petersb. 1857. Kais. Akad. der Wissenschaften.)

Bot. Zt. = Botanische Zeitung von Mohl und Schlechtendal. 1843—1862.

Brit. f. = Berkeley british fungi. — 8°. (specim. sicc.) fsc. 1 (1836) — fsc. 4 (1843).

Bull. ac. belg. = Bulletins des séances de la classe des sciences de l'ac. roy. de Belgique. I. (1832) — 1860.

Canar. = Hist. nat. des iles Canaries p. Webb et Berthollet. Paris 1840. To. III. 2[me] partie. (plt. cell. p. Montagne).

Carol. = Ravenel fungi caroliniani exsiccati. Charleston. J. Russel. 4[to]. fsc. 1. 1852. — 5. 1860.

Casp. Schimm. = Rob. Caspary, über Schimmelpilze. (Monatsber. Berlin. Akad. Mai. 1855. 8°.)

Chile = Cl. Gay, Hist. politica e fisica de Chile. Paris et Chile 1844—48. Champ. p. Montagne. Sect. Cryptog. no. ..

Coems. Pil. = E. Coemans, Monogr. du genre Pilobolus. Ac. r. Belg., mém. cour. et sav. étr. 1861. XXX. 4[to].

Comm. it. = Commentario della societa critto gamologica italiana. 8°. n. 1 (1861) — 4 (1863). Genova, tipi de' sordo-muti.

Cord. Anl. = Corda, Anleitung zum Studium der Mykologie. Prag, 1842. 8°. Taf.. Fach.. Fig..

Cd. Ic. = Corda, Icones fung. tom. IV, taf. 1. 2. V. VI.

de Bary Br. = de Bary, Brandpilze. 1853. 8°.

Demid. = Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale. Paris. 1842. Bot. crypt. par Léveillé. Atlas in Fol.

Dsm. = Desmazières, Plts. crypt. de France. (Exsicc.) Edit. 2. 1836 — 1851. fsc. 1—37. — Ed. 3. 1853—1860. Lille. 4[to].

Dub. Hyst. = Duby, Mém. sur la tribu des Hysterinées. (Vol. XVI. des mém. de la Soc. d. Phys. et d'hist. nat. de Genève. 1861. 4[to].)

Fl. dan. = Flora danica. 1819—1861. vol.. taf..

Flora = Flora, od. regensburger botan. Zeitung. 1829—1861.

Fres. = G. Fresenius, Beiträge zur Mykologie. 4[to]. 1850—63. Frankf. bei Brönner. taf. 1—13. Fig. ..

Fres. Ent. = G. Fresenius, Ueber die Pilzgattung Entomophthora. (Abhdl. Senckenb. natf. Ges. Frankfurt. B. II. 1858. taf. 9. 4[to].

Fries Sv. = E. Fries, Sveriges ätliga och giftiga Svampar, utgifna af K. Vetensk. Akad. Stockholm. 1860. t. 1—17. u. t. 27—44.

Fuck. rh. = L. Fuckel Fungi rhenani exsiccati. no. 1—500. 4[to]. 1863. (Östrich i. Rheingau beim Verf.)

Fuck. Nass. = L. Fuckel, Enumeratio Fungorum Nassoviae. Ser. 1. 1861. 8°. Jahrb. Ver. f. Naturk. v. Nassau. F. XV. p. 1. Fig. ..

Fuck. s. = L. Fuckel, Auswahl getrockneter Pilze nach dieser Enumeratio geordnet.

Gaudich. voy. = de Freycinet, Voyage autour du monde. 1817—1820. Botanique par Gaudichaud. Planches in fol. 1826. taf. ..

Hedw. = Hedwigia, von Rabenhorst. 1852 ff. taf. .. Fig. .. I. II. no. 1—13. (1863).

Hoffm. Ic. = H. Hoffmann, Icones analyticae fungorum. Giessen. 4[to]. Heft 1—3 (1861—1863).

Hook. Lond. J. = W. J. Hooker, London Journal of Botany. I. (1842) bis VI. (1847).

Hook. J. = Hooker's Journ. and Kew-Garden Miscellany. I—IX. (1857).

Hrz. = Harzer, Naturgetr. Abb. der — Pilze. 1842. fol. taf. ..

Huss. = M[rs] T. J. Hussey, Illustrations of british mycology. 4[to]. London. I. 1847; II. 1855.

Ital. = Erbario crittogamico italiano, ed. de Notaris, Cesati .. no. 1—900 (incomplet).

Jungh. pr. = Junghuhn, Praemissa in floram cryptog. Javae insulae. fsc. 1. tab. 15. Extr. des Transactions de la soc. des sciences et des arts de Batavia. T. XVII. (1838).

Kl. = Klotzschii herb. viv. mycolog. Centuria I—XX; cont. cura Rabenhorst. no. .. 4[to].

Kl. II. = dto., editio nova (2); Centuria I—VIII. 1855 ff. no. .. 4[to].

Kops Fl. bat. = Kops, Flora batava, Amsterdam. vol. I. (1807) — XI. (1853). (lith. Habitusbilder ohne Analysen).

Krypt. Bad. = Kryptogamen Badens, von Jack, Leiner u. Stitzenberger. Exsiccata. Constanz ap. Leiner. 8°. (Citata ex Indice). no. 1—600.

Kühn, Kr. = J. Kühn, Krankheiten der Culturgewächse. Berlin. 1858. 8°.

Letell. = Icones fungorum; Figures des champignons serv. de suppl. aux planches de Bulliard. 4[to]. taf. 603—710. seconde édit. 1839 ff. Paris, Meilhac.

Lib. = M. A. Libert, Plantae cryptogamicae quas in Arduenna collegit. fasc. 1. (1830) — 4 (1837). — Leodii, Des. 4°.

Lindl. v. K. = J. Lindley, Vegetable Kingdom. London. 1853. (3. edit.). 8°.

Linn. = Linnaea, ed. Schlechtendal. vol. 3 (1828) — 31 (1862).

Linn. Journ. = Journal of the proceedings of the Linnean Soc. Botany. vol. 1 (1856) ff.

Linn. Trans. = Transaction of the Linnean Society. London. 4[to]. I (1791) — XXII (1859).

Loud. = Loudon's Encyclopedia of plants. 1855. 8°. London. (Abb. im Text, kleine Copien, meist nach Sowerby).

Micr. J. = Quarterly Journal of microscopical science. London. 8°. I (1854) — VIII (1860). Ser. II. vol. I (1861).

Nat. hist. Rev. = London natural history review. 8°. 1861.

Norweg. = J. Chr. Sommerfelt, Plantarum crypt. Norwegiae Centuria I (1826) — II (1830). Christiania. 4°.

Not. Sfer. = de Notaris, Sferiacei italici, Genova 1863. Centuria I. fig. 1—100.

Nov. Act. = Nova Acta Leopoldina. 4[to]. ab 1829. vol. XI bis XXVIII (1861).

Pay. b. cr. = J. Payer, Botanique cryptogamique. Paris. 1850. 8°. (Copien).

Phöb. Gift. = P. Phöbus, Deutschlands kryptog. Giftgewächse. 1838. 4[to].

Purton. = An appendix to the midland flora (England). 2 parts. London. 1821. vol. III. part. 1. 2. 8°.

Regel G. F. = E. Regel, Gartenflora. 1851—1862.

R. f. = Rabenhorst, Fungi europaei. [Ser. II.] Centuria I (1859) — VI (1863).

Robin. = Ch. Robin, Hist. n. d. végét. parasites. 1853. 8°.

Roques = Roques, Histoire des champignons. Paris. 1841. Atlas. gr. 8°.

Sagra Cuba = Ramon de la Sagra, Hist. phys. — Ile de Cuba. Bot.: Crypt. plts cellulaires par C. Montagne. Paris 1838—1842. Abb. in Fol. Text in 8°.

Schacht Kart. = H. Schacht, Bericht über die Kartoffelpflanze u. ihre Krankheiten. Berlin, Wiegandt. 1856. 4[to].

Schnzl. = A. Schnizlein, Iconogr. famil. plantar. 4[to].

Schweiz. = Schweizerische Kryptogamen, ges. u. herausg. von Wartmann und Schenk. 1862 ff. no. 1—100 (citata ex Indice). St. Gallen, typ. Scheitlin. 8°.

Staude = Fr. Staude, Die Schwämme Mitteldeutschlands, insbes. Coburgs. Coburg 1857. Fol. 52 Fig. (Meist Copien).

Sturm h. = Sturm, Deutschlands Flora. III. Pilze. Heft 1 (1813) — 36 (1862).

S. = E. Fries, Summa vegetabilium Scandinaviae. 1849. 8°.

Tul. F. h. = L. R. et Ch. Tulasne, Fungi hypogaei. 1851. Paris. fol.

Tul. Sel. = Iidem, Selecta fungorum carpologia. I. 1861. fol.

Ung. Ex. = Unger, Exantheme der Pflanzen. 1833. 8°.

Vent. = A. Venturi, Studi micologici. Brescia 1842. (Kl.-Fol. — Habitusbilder von Agaricis etc.).

Vent. mi. = Venturi, miceti del' agro Bresciano. 1860. Hym. Disc. Gastromyc., t. 1—100 (citata ex indice).

Vitt. = C. Vittadini, Monographia tuberacearum. Mediolani, typ. Rusconi. 1831. 4[to]. 5 Taf.


Viv. = Dom. Viviani, i funghi d'Italia. Genova 1834. fol. t. 1—60.

Voges. = Mougeot, Nestler, Schimper: Stirpes vogeso-rhenanae. Bruyerii Vog. 4°. 1810-1860. fsc. 1—15.

West. = Westendorp u. Wallays, Herbier cryptogamique belge. fsc. 1 (1850) — 28 (1859). Courtrai, Jaspin. 4°. (citata ex indice operis).


Die übrigen Citate bedürfen keiner besonderen Erklärung.





INDEX FUNGORUM.





Aecidium elongatum f. Berberidis: Fuck. s. 14. b. — Fuck. rh. 278.
—— —— f. Rhamni P. — Kl. 695. — Fuck. s. 14. a. — Fuck. rh. 277.
—— Epilobii DC. — R. f. 487. — Dsm. III. 11. — Brit. f. 317. — Wstd. 559. — Ital. 897.
—— Ervi W. — West. 1065.
—— —— Gmel: Dsm. 1008.
—— —— hirsuti. — Kl. 1489.
—— Euphorbiae. — Dsm. 1008.
—— —— P.: Bisch. f. 3850. — Fuck. s. 17. — de Bary Br. t. 5. f. 1—5. — Kl. II. 292. — Brit. f. 229. — Wstd. 837. — Fuck. rh. 279.
—— —— Cyparissiae. — Voges. 87.
—— —— sylvaticae DC. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 29 - 31; 1854. II. t. 9. f. 24—33 (Tulsn.).
—— Euphorbiarum. — [S. 511.] — Dsm. III. 556. — Wstd. 837. — Krypt. Bad. 16. — Ital. 218.
—— exanthematicum. — Bon. t. 1. f. 20.
—— Falcariae P. — Wstd. 746. — Bisch. f. 3851. — Fuck. s. 10. — Schntzl. t. 12. f. 7—10. — Kl. 1176 (= Aec. grandidentatum Bon.). — Fuck. rh. 268.
—— Fediae. — Ital. 597.
—— —— olitoriae. — Kl. 1792.
—— Foeniculi Cast. — Dsm. 1001.
—— Frangulacearum Schw. — [S. 511.]
—— Frangulae Schum. — Fl. dan. XIII. 2218. 2. — Kl. 276. 783.
—— fuscum Sow. — Wstd. 581.
—— Galii P. — Kl. 691. — Fuck. s. 18. — Fuck. rh. 280.
—— Galiorum P. — [S. 511.]
—— Geranii DC. — [S. 511.] — Kl. 695. — Kl. II. 376.
—— Glaucis. — Tijdschr. v. n. Gesch. 1845. XII. t. 6. f. 1 (Doz. Mlk.).
—— grandidentatum Bon. Con. 209. t. 3. f. 37. (= Aec. Tussilag. Cd.).
—— Grossulariae DC. — [S. 511.] — Wstd. 745. — Dsm. 1006. — Loud. f. 16673. — Bon. t. 3. f. 67.
—— —— P.: Kl. 691. — de Bary Br. t. 5. f. 8. t. 7. f. 1. — Kl. II. 191.
—— —— fructigenum. — Kl. 1791.
—— Hieracii Schum. — Fl. dan. XIII. 2215. 3.
—— Holböllii Horn. — Fl. dan. XIII. 2220.
—— hydnoideum. — Carol. IV. 91.
—— irregulare DC. — Wstd. 665.
—— Labiatarum DC. [S. 511.] — R. f. 593 (Salviae).
—— laceratum DC. — Brit. f. 111. — Carol. V. 96. — Bisch. f. 3848. — Fuck. s. 23. — Loud. f. 16677.
—— —— Sow: Wstd. 556.
—— —— Crataegi Ariae DC. — Wstd. 1064.
—— —— Oxyacanthae. — Dsm. 137 (Centridium).
—— Lampsanae. — Wstd. 747, 855.
—— Leguminosarum Lk. — [S. 511.] — Fuck. s. 15. b. — Dsm. 1372. — Fuck. rh. 266.
—— —— v. Orobi tuberosi. — Kl. 1089.
—— —— — —— verni. — Krypt. Bad. 416.
—— Leontodontis. — Dsm. 666. — Wstd. 848.
—— leucospermum. — [S. 511.] — Voges. 185. — Kl. 1495. — Fuck. s. 8. — Kl. II. 287. — Brit. f. 226. — Wstd. 662. — Krypt. Bad. 145.
—— Ligustri. — Sturm. h. 34. t. 10 (Strauss).
—— lineare. — Wstd. 91, 331.
—— Lonicerae S—l. — Ital. 48, 98. — Kl. 577.

Aecidium luminatum. — Carol. I. 91 (nitens Schw.).
—— Lycopsidis Dsv. — Wstd. 834.
—— Lysimachiae S—l. — R. f. 391.
—— Magellanicum. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1851. t. 163, 2.
—— Majanthae. — Wstd. 835.
—— Meleagris Dub. — Dsm. 168.
—— Mercurialis Schum. — Fl. dan. XIII. 2216. 2.
—— Mespili. — Dsm. 1118. — Wstd. 1156.
—— Myrtilli Schum. — Fl. dan. XIII. 2219. 3.
—— nitens Schw. — cf. luminatum.
—— Nymphoidis DC. — Bisch. 3854.
—— Onagrariarum. — [S. 511.]
—— Orchidearum D. — Dsm. 663. — Kl. 1690. — Wstd. 560.
—— Orobi. — Wstd. 743.
—— Oxyacanthae. — Wstd. 556.
—— Paeoniae. — Wstd. 484.
—— Parnassiae Grav. — Dsm. 668. — de Bary Br. t. 6. f. 4.
—— —— Rbh.: Kl. 1068.
—— —— S—l.: Kl. II. 90.
—— Pedicularis Libz. — Dsm. 1002. — Kl. 1493. — Wstd. 1158.
—— penicillatum A. S. — Wstd. 556.
—— Periclymeni Schum. — Letell. 620. 3 (Xylost.). — Fl. dan. XIII. 2218. 1. — Kl. II. 286. — Wstd. 832. — Fuck. rh. 276.
—— Personatarum s. l. — [S. 511.]
—— Phaseolorum Wllr. (candidum Bon.). — Kl. 887. — Kl. II. 373. — R. f. 188. — Wstd. 124. — Fuck. rh. 267.
—— Pini P. — (cf. Periderm. [S. 510.] — Bisch. 3849. — Loud. f. 16662. — Voges. 186. — Carol. I. 93. — Wstd. 660.
—— —— v. Ephedrae. — Carol. III. 95.
—— Plantaginis. — Ital. 247.
—— poculiforme Wllr. — elongatum Lk.
—— —— Berberidis. — Wstd. 227. 557: Rhamnor.
—— Polygonorum P. — [S. 511.]
—— Populi Schum. — [S. 512.]
—— Prenanthis P. — Kl. 1178.
—— Primulacearum DC. — [S. 511.] — cf. Aec. Lysimachiae S—l.
—— Primulae DC. — Brit. f. 341. — Dsm. 664.
—— pulchellum Schrad. — Wstd. 559.
—— punctatum P. — [S. 511.] — Fl. dan. XIII. 2217. 2. — Fuck. rh. 262.
—— quadrifidum DC. — Brit. f. 227. — Dsm. 169. — Letell. 620. 4. — Wstd. 661.
—— Ranunculacearum P. — [S. 511.] — Kl. 1494. — Wstd. 84. — Ital. 660. — Fuck. rh. 263—265.
—— —— Aquilegiae. — Kl. II. 791.
—— —— Calthae. — Wstd. 1159.
—— —— Clematidis (petiolorum). — R. f. 284. — Krypt. Bad. 414. — Wstd. 664.
—— —— Ficariae. — Dsm. 831. — Krypt. Bad. 323. — Kl. II. 89. — Fuck. s. 9.
—— —— Lycoctoni. — R. f. 96.
—— —— Ranunculi. — Krypt. Bad. 322.
—— —— Thalictri. — Wstd. 485. — Fuck. s. 9. c.
—— Ranunculi. — Kl. 891. — Fuck. s. 9. a. — Schum.: Fl. dan. XIII. 2216. 1.
—— —— (Aquilegiae et Thalictri). — Kl. 785.
—— resinaecola Rud. — [S. 511.]
—— Rhamni P. — Dsm. 1007. — Kl. 290. — Letell. 620. 2. — Wstd. 558.
—— Rhei. — Wstd. 328.
—— rubellatum Lk. — Rumicis S—l. — Kl. 782. — Kl. II. 790.

Aecidium rubellum DC. — [S. 511.] — Dsm. 667. — Loud. 16680. — Wstd. 328. — Ital. 300 (Rumic.).
—— Rumicis. — Voges. 286. — Purton. I. t. 26. — Wstd. 328. — Ital. 300.
—— —— v. Grossulariae. — Voges. 287. — Wstd. 715.
—— Scillae. — Fuck. rh. 282.
—— Scrophulariae. — Lib. 192. — Wstd. 1157.
—— Scrophularinearum Lasch. — Kl. 461. 781. — Kl. II. 374. — cf. Uredo Scr.
—— Sedi Ces. — Kl. 1087.
—— Senecionis D. — Dsm. 135.
—— Sii Falcariae. — Wstd. 746.
—— Silenacearum. — [S. 511.]
—— Sonchi. — Wstd. 1160. — Kl. II. 289.
—— Statices. — Wstd. 1265.
—— Synantherearum S—l. — [S. 510.]
—— Thalictri. — (cf. Ranunc.). — [S. 511.] — Loud. 16682.
—— Thesii Desv. — Dsm. 1001. — Kl. II. 87. — Brit. f. 318.
—— Tragopogi P. — [S. 511.] — Voges. 388. — Fl. dan. XIII. 2216. 3. — Krypt. Bad. 413. — Wstd. 833.
—— Trifolii repentis. — Ital. 216. — Kl. 1689 u. 1994.
—— —— Cast.: de Bary Br. t. 6. f. 2.
—— Tussilaginis Cd. (grandident. Bon.) — Loud. f. 16679. — Cd. Anl. t. C. f. 26: 1—2. — Pay. b. cr. p. 70. f. 312 u. 314. — Bon. t. 1. f. 25. — Kl. II. 789. — Voges. 390. 88. — Norweg. 175. — Wstd. 663. — Ital. 658.
—— Umbelliferarum. — [S. 511.] — Kl. II. 375.
—— urceolorum Schum. — Wstd. 750.
—— Urticae DC. — Dsm. 134. — Wstd. 85.
—— —— Schum.: Fl. dan. XIII. 2217. 3. — R. f. 390. — de Bary Br. t. 6. f. 3. t. 7. f. 2. — Fuck. s. 19. — Voges. 389. — Brit. f. 112. — Fuck. rh. 281.
—— Urticarum Schum. — [S. 511.] — Kl. 692. 781.
—— Valerianacearum DC. — [S. 511.] — Kl. 889. — Fuck. rh. 273.
—— Valerianae. — Kl. 1792.
—— Verbasci. — Ital. 518. — Kl. 1191. — R. f. 285.
—— Viciae. — Wstd. 743.
—— Violae. — Brit. f. 228. — Fl. dan. XIII. 2215. 1. — Kl. II. 291. — Wstd. 228. — Fuck. rh. 275.
—— Violarum. — [S. 511.] — Wstd. 228. — Kl. 890. — Dsm. III. 555.
—— Xylostei. — cf. Periclymeni.
—— zonale. — Dsm. III. 13.
Aegerita. — [S. 477.] — cf. Tuburcinia.
—— caesia Fr. — Fuck. s. 224.
—— candida P. — [S. 472 u. 477.] — Bisch. f. 3683. — Fuck. s. 223. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 7 (Berk. et Br.). — Kl. 1131. — Kl. II. 244. — Fuck. rh. 163.
—— crustacea. — Wstd. 300.
—— perpusilla. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 1.
—— plagiospora. — Bon. t. 11. f. 221.
—— punctiformis. — [S. 497. 3.]
Aerophyton. — [S. 468. 489 *.]
—— principis Eschw. — Bisch. f. 3791.
Aethalium. — [S. 449.]
—— flavum Grev. cf. Aeth. vaporar. — Cd. Anl. t. C. f. 34: 5. 6. — Schntzl. t. 15. f. 57. 58.
—— melaenum Chev. — zu Licea cylindrica? — (= Dermodium fallax Ns. f. 103; Wllr. n. 2114.).
Aethalium septicum P. — [S. 449.] — Bisch. f. 3631.
—— —— Fr.: Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 7. de Bary. — Fuck. S. 298. a. b. — Keimung: Verhandl. zool. bot. Ges. Wien 1859. t. 1. f. II. (Bail).
—— —— L. v. flavum. — Kl. 1027.
—— —— v. cinnamom. — Dsm. 1544.
—— —— v. vaporariorum; cf. Aeth. vapor.
—— vaporariorum Bull. — [S. 449**.] — R. f. 81.
Agaricus. — [S. 272.] — Typi subgenerum: cf. Hoffm. Ic. an. fg.; cf. Amanita. (Entwickelung: Pay. bot. cr. p. 9. f. 47—49.) — Bolbitius. — Coprinus. — Cortinarius. — Gomphidius. — Hygrophorus. — Lactarius. — Lentinus. — Lenzites. — Marasmius. — Montagnites. — Nyctalis. — Panus. — Paxillus. — Pholiota (Bail S. t. 36). — Russula. — Schizophyllum. — Stylobates. — Trogia. — Xerotus.
—— —— Fructific.: Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Léveillé).
—— abstrusus Fr. — [S. 292.]
—— acerbus Bull. — Vent. mi. 53. f. 6. 7. — Ital. 534. (Trichol.). — Vent. t. 8. f. 68. 69.
—— acerosus Fr. — [S. 285.]
—— acervatus Fr. — [S. 280.]
—— acicola. — [S. 282.] — Linn. 1830. V. t. 6. f. 3 (Jungh.).
—— acris (Lact.) Bolt. — Loud. f. 15791. — Schum.: Fl. dan. XIII. 2267. 2.
—— —— Bolt.: Bisch. f. 3441. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 7 (fruct. Lév.). — [S. 309.]
—— actinorhizus. — [S. 273. 36.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12.
—— acuminatus Schff. — [S. 297.]
—— acutesquamosus. [S. 273.] — Huss. II. 5. — Vent. mi. 55. f. 3. 4.
—— acutus Schum. = mutabil. v. denudat. Fl. dan. — P.: [S. 306.]
—— adiposus B. — [S. 289.] — Fl. dan. XII. 2078. 1. — Hrz. t. 79. — Berk. Out. t. 8. f. 2. — Brit. f. 16.
—— adnatus Schum. — Fl. dan. XII. 2148. 2.
—— Adonis. — [S. 281.]
—— adscendens Schum. — [S. 278.]
—— adustus (Russ.). — [S. 310.] — Loud. f. 15784. — Huss. I. 73.
—— aeruginosus Curt. (Psall.) [S. 295.] — Loud. f. 16019. — Kops Fl. bat. XI. 815. 2. — Hrz. t. 42. — Bail S. t. 35. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 1. (Pollinar. Hoffm.) — Dsm. III. 344. — Huss. I. 35.
—— aestivus Schum. = praecox Fl. dan.
—— aestuans Fr. — [S. 275.] — Letell. 699.
—— Aethiops Scop. — [S. 287.]
—— aetites. — [S. 282.]
—— affricatus Fr. [S. 283.]
—— Agardhii. — [S. 291.]
—— agathosmus. — [S. 307.]
—— aggregatus Schff. — [S. 278.]
—— aimatochelis. — Huss. I. 19; cf. haematochelis.
—— albellus Roq. t. 16. f. 1—3. — [S. 276.]
—— albescens. — Viv. 9.
—— albidus. — Wstd. 995. — Act. Tur. 1803. XII. t. 11. (Balbis.)
—— albo-brunneus (Trich.). — [S. 274.] — Loud. f. 15754. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 3. (Pollinar. Hoffm.) est butyraceus, t. Fr. — Viv. 32. — Vent. mi. 7. f. 3—5; 93. f. 1. 2. — Ital. 327.
—— albo-crenatus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 4 (Jungh.).

Oeid. Tragopogonis. De Bary. Champ. parasit. An. sc. nat.
4e ser. XX. Pl. 11. f. 7-10.





Agaricus capillaris Schum. — [S. 283.] — Fl. dan. X. t. 1670. 1. u. XII. 2142. 1. — Fuck. s. 1114. — Carol. III. 1.
—— capnoides. — [S. 295.]
—— caprinus Scop. — [S. 307.]
—— caput Medusae. — [S. 295.]
—— carbonarius Fr. — [S. 291.] — Kl. 303.
—— carcharias. — [S. 273. 34.]
—— cariosus (Aman.). — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. g. (Anat. Bonord.).
—— carneo-albus. — Carol. I. 2.
—— carneo-tomentosus. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 29. 31. Entwicklg. Hoffm.). — cf. Panus torulosus.
—— carneo-virens. — Linn. V. 1830. t. 6. f. 2. (Jungh.).
—— carneus. — [S. 276.] — Brit. f. 8.
—— carnosus. — Loud. f. 15749.
—— carpophilus. — [S. 293.]
—— cartilagineus. — [S. 564.]
—— caryophyllatus. — Viv. 3.
—— cascus. — [S. 296.]
—— castaneo-rufus. — cf. subdulcis.
—— castaneus Bull. — [S. 305.] — Bisch. f. 3465.
—— catinus. — [S. 278.]
—— caudatus. — [S. 297.] — Krypt. Bad. 159.
—— caudicinus. — cf. mutabilis.
—— caulicinalis Sow. — Huss. I. 68. — Loud. f. 15907.
—— causticus. — [S. 301 *.]
—— cauticinalis (Collyb.) Bull. — [S. 280 *.] — R. f. 107.
—— cauticinus Sw. — [S. 313 : 26.]
—— Ceciliae. — Berk. Out. t. 3. f. 5.
—— centrifugus. — [S. 300.]
—— centunculus. — [S. 292.]
—— cepaeoides. — Kl. 1708.
—— cepaestipes (Lepiota) Fr. — [S. 273.] — Fl. dan. X. 1798. — Lindl. v. K. p. 29. f. 5.
—— —— Sow.: Loud. f. 16011. — Sturm. h. 31 —. t. 1. (Szl.). — Kl. 1904. — Ital. 437.
—— ceraceus Sow. — Loud. f. 15840. — Kl. 1102. — (Hygroph.) [S. 308.]
—— ceraseus. — Fl. dan. X. 1677. 2.
—— cerasinus. — [S. 307 **.]
—— cerealis (Trichol.). — Kl. 1301.
—— cerinus P. — [S. 276.] R. f. 402.
—— —— b. flavus. — Kl. 1903.
—— cernuus. — [S. 296.]
—— cerodes. — [S. 292.]
—— cerussatus Fr. — [S. 277.] — Fl. dan. X. 1796.
—— cervinus. — [S. 286, 278.] — Hoffm.: Bisch. f. 3268.
—— —— Schff.: Kl. 211.
—— Cesatii (Crepidot.). — Kl. 1506.
—— cetratus. — [S. 288.]
—— chalybeus P. — [S. 287.] — Loud. f. 15946. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 24. (Spor. Berk.). — (Lepton.) Bail S. t. 37.
—— chamaeleontinus (Russ.). — [S. 311.]
—— chelidonius. — [S. 283.]
—— chioneus. — [S. 294 *.] — cf. septicus.
—— chloranthus. — [S. 281.]
—— chlorophanus (Hygroph.) Fr. — [S. 308.] — Hoffm. Ic. t. 5.
—— chloroticus. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 1. (Jungh.).
—— chordalis Fr. — [S. 313.] — R. f. 103. — Kl. 1210. (Maras.).
—— Christinae. — [S. 292.]
—— chrysenteron. — [S. 276.]

Agaricus chrysites. — [S. 275. 77.]
—— chrysodon. — [S. 307.]
—— chrysoleucus. — [S. 283.]
—— chrysophaeus. — Berk. Out. t. 7. f. 5.
—— chrysophyllus. — [S. 283.]
—— chrysorhoeus (Lact.). — [S. 310.]
—— cidaris. — [S. 292.]
—— cilicioides. — [S. 308.] — (Lact.). — Kl. 605.
—— cimicarius P. — Kl. 1205.
—— cimmerius. — [S. 282.]
—— cinerascens. — Viv. 20. — Vent. mi. 37. f. 1—3.
—— cinereo-violaceus. — [S. 302.]
—— cinereus Fr. (Coprin.). — Loud. f. 16044. — Roq. t. 21. f. 2. 3.
—— cingulatus Ahnf. — [S. 274. 45.] — Linn. 1830. V. t. 10. (Fries).
—— cinnabarinus. — [S. 302.]
—— cinnamomeus Schum. = lateritius Fl. dan. — (Cortin.) v. rubicundus. — Kl. II. 403. — (Dermocybe) R. f. 201. — [S. 303.] — Letell. 652. — Huss. I. 30.
—— cinn.) v. semisanguineus. — Letell. 618.
—— circellatus (Lactar.). — [S. 309.]
—— circinatus Schum. = rubescens Fl. dan. — [S. 290: 558; 284.]
—— cirrhatus Schum. — [S. 280.] — Kl. 1111. — Tul. Sel. I. 112.)
—— citrinellus (Mycen.) P. — [S. 283.] — Kl. II. 607.
—— citrinus. — Vent. mi. 13. f. 1. 2. — Roq. t. 23. f. 3. 4.
—— cladophyllus (Mycen.). — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 1. (Lév.).
—— clandestinus. — [S. 288.]
—— claricolor. — [S. 300.]
—— clavicularis. — [S. 283.]
—— clavipes (Trichol.). — [S. 277.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 7. (Anat. Bonord.).
—— clavularis. — [S. 283.]
—— clavus Batsch. — [S. 283: dilat., 290. 280.]
—— —— = Fibula Fl. dan.
—— —— Bull.: Loud. f. 15870.
—— cliduchus. — [S. 300.]
—— clivensis B. B. (Psilocybe). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 3. p. 376.
—— clivularum. — Letell. 676.
—— clusilis. — [S. 281.]
—— clypeatus Bolt. = semiputris Fl. dan. — Berk. Out. t. 7. f. 6. — [S. 287.]
—— clypeolarius Bull. — [S. 273.] — Fl. dan. X. 1732. 1. — (Lepiot.) Loud. f. 15742. — Bisch. f. 3277. — Kl. II. 406. — Carol. V. 2. — Vent. mi. 51. f. 3—5.
—— Cnista. — [S. 276.]
—— coalescens. — Viv. 16.
—— coccineus Sow. = strobilinus Fl. dan. — (Hygroph.) Kops Fl. bat. XI. 810. 1.
—— —— P.: Loud. f. 15843. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 16—21 (Phöb.).
—— —— Schff.: Kl. 318. — Hygr. [S. 308.] — Dsm. 1624. — Huss. I. 61. — R. f. 505. — Krypt. Bad. 60.
—— cochleatus P. — Loud. f. 15916. — (Lentin.).
—— —— Fr.: Bisch. f. 3252. — Berk. Out. t. 19. f. 4.
—— —— P.: Kl. 706.
—— coelestinus. — [S. 288.]
—— coerulescens. — [S. 300.] — Vent. mi. 53. f. 10. — Alger. t. 30. 1. (Lact.).
—— coeruleus (Russ.). — Vent. t. 7. f. 61. 62. — Staude t. 8. f. 4. (Russ.). — Coffeae. — Viv. 11.

Agaricus coffeatus. — [S. 277.]
—— cohaerens. — [S. 282.]
—— collariatus. — [S. 282.
—— collinitus Sow. — [S. 301.] — Viv. 48. — Loud. f. 15983. — Hrz. t. 29. — (Cortinar.) Kl. 1101. — Ital. 486.
—— collinus. — [S. 280.
—— colossus. — [S. 275.
—— colubrinus P. = clypeolarius Fl. dan.
—— columbetta. — [S. 275.] — Letell. 625. (albus P.).
—— colus. — [S. 305.
—— colymbadinus. — [S. 303.]
—— comatus. — Badham t. 10. 2. — Kops Fl. bat. VIII. 590. — Coprin. Lk.: Loud. f. 16039.
—— —— Kl. 218.
—— —— Müll.: Hrz. t. 21.
—— —— v. ovatus. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 64. Lamell.: Phöb.).
—— comitialis. — [S. 277.]
—— comosus. — [S. 289.
—— compressus With. — Loud. f. 15851.
—— comptulus B. B. — [S. 294. 278.] — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 4. p. 376.
—— Concha Hoffm. v. hercyn. subterr. t. 17. f. 3.
—— concinnus Bolt. = stipatus Fl. dan.
—— confluens P. (Collyb.). — [S. 280.] — Kl. 12. — Kl. II. 202. — Brit. f. 124.
—— confragosus. — [S. 289.]
—— congener Schum. = elegans Fl. dan.
—— conglobatus Vitt. — Vent. t. 4. f. 28. 29.
—— congregatus Sow. (Coprin.). — Sturm. h. 19 —. t. 2. (Corda).
—— —— Fr.: Loud. f. 16042.
—— conicus (Hygroph.). — [S. 308.] — Kops Fl. bat. XI. 810. 2. — ib. 845.
—— —— Scop.: Hrz. t. 28. B.
—— —— Schff.: Loud. f. 15841. — Vent. mi. 83. f. 3. 4.
—— conicus Schff. (Panaeol.). — Kl. 407.
—— —— Schff.: v. nigrescens Fr.: Kl. 507. — Vent. mi. 90. f. 1—4.
—— conigenus Fr. (Coll.). — [S. 280.] — Fuck. s. 1126.
—— —— HH.: Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 13. (= tenacellus Fr.) (Keimung); — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 48.
—— conissans (Flammula). — [S. 291.] — Kl. 1706.
—— connatus Schum. — Fl. dan. XI. 1908.
—— conocephalus (Coprinar.). — [S. 293.] — Kl. 1901.
—— conopilus. — [S. 296.] — Hoffm. Ic. t. 7. f. 2. (Pratell.).
—— conquisitus. — Alger. t. 30. 5. (Omphal.).
—— consobrinus (Russ.). — [S. 311.]
—— conspersus. — [S. 293.]
—— constrictus. — [S. 274. 46.]
—— contiguus Bull. — Vent. mi. 99. f. 3—5.
—— controversus. — [S. 309.] — (Lact.) Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 2—5. (Spor. Phöb.).
—— —— P.: Vent. t. 6. f. 49. 50. — (Gal.) Loud. f. 15785. — Viv. 56. — Vent. mi. 77. — Fries Sv. t. 29.
—— coprinoides Cd. — Bisch. f. 3303.
—— coprophilus (Psiloc.). — [S. 296.] — Bail S. t. 35.
—— coracinus. — [S. 280.]
—— coriaceus B. — cf. Irpex canescens.
—— —— Bull.: = Lenzites betulina. — Wstd. 145.
—— coriipellis. — [S. 284.]
—— cornucopiae. — cf. dimidiatus. — Viv. 7.

Agaricus cornucopioides. — Purton. 1. t. 12.
—— corrosus. — [S. 300.]
—— corrugis. — [S. 296.]
—— corruscans. — [S. 301.]
—— corticalis Bull. = Ag. (Myc.) hyemalis Osb.
—— corticatus. — [S. 284.]
—— corticola P. — [S. 283.] — Sturm. h. 31 —. t. 2 (Szl.) — ? Bull.: Loud. f. 15899.
—— —— (Myc.) Fr.: Kl. 408.
—— —— v. b., Fr. = Ag. hyemalis Osb.
—— coryphaeus. — [S. 274. 54.] — Vent. mi. 36. f. 1. 2.
—— Cossus. — [S. 307.] — Brit. f. 2.
—— costatus. — [S. 287.]
—— cothurnatus. — [S. 295.
—— cotoneus. — [S. 303.]
—— craspedius. — [S. 284.]
—— crassus. — [S. 300.]
—— craterellus. — Alger. t. 31. 5.
—— craticius. — [S. 302. 564.]
—— cremor. — [S. 309.] — Lact.
—— crenulatus Schum. — [S. 281.] — Fl. dan. XIII. 2268. 1.
—— cretaceus. — [S. 294.] — Berk. Out. t. 10. f. 5. — Fries Sv. t. 39.
—— crinitus Schwz. = Lentinus Lecomtei Fr.
—— crispus Turp. — Canthar. Dutroch., Tul. Sel. I. 100.
—— cristatus (Lep.). — [S. 273.] — Brit. f. 1. — Huss. I. 48. — Loud. f. 15743.
—— —— Bolt.: Hrz. t. 44. B. — Berk. Out. t. 3. f. 7. — Kl. 502.
—— crobolus. — [S. 293.]
—— crocatus. — [S. 282.]
—— croceo-coeruleus. — [S. 301.]
—— croceo-lamellatus. — Letell. 665. (mollis ?).
—— croceo-sanguineus. — Chile. n. 7. f. 4.
—— croceus. — [S. 303.]
—— cruentus. — [S. 282.]
—— crustuliniformis. — Vent. mi. 13. f. 6. 7. — Staude. 1857. t. 2. f. 4. — Berk. t. 9. f. 1. — Vent. mi. 89. f. 5. 6. — Staude t. 4. f. 2.
—— cryptarum. — Letell. 611.
—— crystallinus. — [S. 301.]
—— cucullatus. — Fl. dan. X. 1678. 2.
—— Cucumis P. — [S. 292.] — Loud. f. 15969.
—— cudon. — [S. 286.]
—— cumatilis. — [S. 301.]
—— cuneifolius. — [S. 275.]
—— cupressiformis. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 3.
—— curtipes Schum. = blennius Fl. dan. [S. 277.]
—— curtus. — [S. 300.]
—— curvipes. — [S. 289.]
—— cyanellus. — [S. 287.]
—— cyanescens (Russ.). — [S. 311 *.] — Sturm. h. 33. t. 1. (Strauss.).
—— cyaneus. — [S. 300. 31; 302. 78.]
—— cyanites. — [S. 302.]
—— cyanopus. — [S. 300.]
—— cyanoxanthus (Russ.). — [S. 311.]
—— cyathiformis Bull. — [S. 278.] — Loud. f. 15912. — Hrz. t. 68. — Kl. 217. — Kl. II. 201. — Hoffm. Ic. t. 3. — Huss. II. 1. — Lib. 118. — Schweiz. 25.
—— —— v. aithopus Fr. — Bisch. f. 3271.
—— Cyathula. — [S. 309.] — Lact.
—— cyclophilus Lasch. — Kl. 309.
—— cyphellaeformis. — [S. 285.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 3. p. 511. (Berk.).
—— cypriacus. — [S. 305.]
—— damascenus. — [S. 305.]






Agaricus eriocephalus Bull. — Kl. 205.
—— ermineus. — [S. 273.]
—— erosus. — [S. 281.]
—— erubescens. — [S. 307.] — Letell. 705.
—— erugatus. — [S. 305.]
—— Eryngii DC. — Letell. 693. — Vent. t. 4. f. 26. 27. — Vent. mi. 65. f. 1—3.
—— erythrinus. — [S. 305.]
—— erythrocephalus. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 3. (Lév.).
—— erythropus. — [S. 313.] (Maras.).
—— escharoides Fr. (Naucor.). — [S. 293.] — Kl. 304.
—— esculentus Wulf. — [S. 280.] — Bisch. f. 3270. — Loud. f. 15867. — (Collyb.) Kl. 204.
—— euchrous. — [S. 287.]
—— eumorphus. — [S. 303 *.]
—— euosmus. — Huss. I. 75. (Pleurot.).
—— evernius Fr. — [S. 304.] — Loud. f. 15955.
—— excelsus. — [S. 272. 14.] — Berk. Out. t. 3. f. 3. — Letell. 640. — Vent. mi. 35. f. 1—3.
—— excissus. — [S. 276.]
—— excisus. — [S. 282.]
—— excoriatus Schff. — [S. 273.] — Vent. t. 3. f. 24. 25. — Kops Fl. bat. X. 725. 2. — Loud. f. 15741. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 18. 19. — Letell. 610. — Viv. 49. — Vent. mi. 19. f. 6. 7.
—— exilis. — [S. 288.]
—— expallens. — [S. 278.]
—— exquisitus. — Badham. t. 6. 1. (zu Ag. campester.).
—— exsculptus. — [S. 280.]
—— exsertus. — Viv. 46.
—— exsuccus. — Viv. 56. — Vent. mi. 100. f. 3—5.
—— fabaceus. — Carol. III. 3.
—— fagetorum. — [S. 282.]
—— fagineus Schum. = A. Schumacheri Fl. dan.
—— fallax (Russ.). — [S. 310, must., 311.] — Kl. 1603.
—— fasciatus. — [S. 306.]
—— fascicularis. — [S. 295.] — Huss. II. 15. — Fl. dan. XII. 2075. — Loud. f. 16023. — Bisch. f. 3471. — Viv. 47. — Staude t. 5. f. 5. — Ital. 227. — Kops Fl. bat. XI. 824. 2. — Roq. t. 15. f. 1. — Berk. t. 11. f. 1. — Hrz. t. 33. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. g. (Pollinar. Hoffm.). — Kl. 21. — Kl. II. 3.
—— fascinans. — [S. 309.] — (Lact.).
—— fastibilis. — [S. 290.] — Dsm. 1801. — Staude. 1852. t. 4. f. 3. — Loud. f. 15985. — (Hebel.) Bail S. t. 36. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 6. (Anat. Bonord.). — Kl. 409. 713.
—— fastigiatus. — [S. 290.] — Berk. Out. t. 8. f. 4.
—— fatuus. — [S. 297.]
—— favillaris. — [S. 277.]
—— felleus Fr. (Russ.). — [S. 311.] — Kl. 705.
—— fertilis (Entolom.). — Bail S. t. 37. — Kl. 401.
—— —— v. intybaceus. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 22. 23. (Fructif. Berk.).
—— festivus. — [S. 292.]
—— fibrillosus. — [S. 297.]
—— fibrosus. — [S. 290 ***.]
—— Fibula Bull. — [S. 284.] — Fl. dan. XIII. 2265. 1. — Loud. f. 15903. — Dsm. III. 667. — (et Swartzii) Brit. f. 13.
—— ficoides. — [S. 308. 21.]
—— filopes Bull. — [S. 282.] — Fl. dan. XII. 2022. 2. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 6. (Pollinar. Hoffm.). — (Mycena) R. f. 3.

Agaricus fimbriatus Bolt. (Clit.). — [S. 284.] — Loud. f. 15829.
—— fimetarius. — Hoffm. Ic. t. 9. f. 2. (Coprin.).
—— fimicola Fr. (Panaeol.). — [S. 297.] — Kl. 410.
—— —— P.: R. f. 10.
—— fimiputris. — [S. 297.] — Berk. Out. t. 11. f. 6.
—— firmus. — [S. 290.]
—— flabelliformis Bolt. — Loud. f. 15923. — (Lentin.) Fuck. s. 1034.
—— flabellus. — [S. 304.]
—— flaccidus Sow. (Clitc.). — [S. 278. 283. 306 **.] — Loud. f. 15816? u. 15974. — Kl. 210.
—— —— Schff.: Loud. f. 15986. — Brit. f. 4.
—— flammans. — [S. 289.]
—— flavicans. — [S. 299.]
—— flavidus Schff. (Flamm.). — [S. 291.] — Kl. 503.
—— flavipes Schum. = epipterygius Fl. dan.
—— flavo-albus. — [S. 281.]
—— flavo-brunneus (Trichol.). — [S. 274.] — Kl. 1602. — Letell. 707.
—— flavo-virens A. S. — Hrz. t. 22. — Kl. 3.
—— flavus Lasch. — Kl. 1903.
—— flexipes P. (Telamon.). — [S. 304.] — Kl. 1107.
—— flexuosus. — [S. 309.] (Lact.). — Hrz. t. 43. — Huss. I. 59. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 17. (Fructif. Berk.).
—— —— Schum. = rhodopolius Fl. dan.
—— floccifer B. B. (Flamm.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. 1. p. 374.
—— floccipes. — [S. 280.]
—— floridulus. — [S. 280.]
—— flosculosus. — Hook. Lond. J. I. 1842. t. 14. (Berk.). — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 162. 2. (Coprin.).
—— fluxilis. — [S. 285.]
—— focalis. — [S. 273. 42.]
—— foeniculaceus. — [S. 313.]
—— foenisecii. — [S. 296.] — Huss. I. 39. — Berk. Out. t. 11. f. 5.
—— —— Fl. dan. XII. 2139. 1. — Bisch. f. 3263.
—— foetens Fr. (Russ.). — [S. 311.] — Kl. 1513. — Loud. f. 15782. — Hrz. t. 24. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 20—24. — Viv. 41. — Vent. mi. 45. f. 4. 5; 92: f. 4. — Fries Sv. t. 40.
—— foetidus. — [S. 313.] (Maras.). — Loud. f. 15876. (Collyb.).
—— formosus. — [S. 287.]
—— fornicatus. — [S. 308.]
—— fracidus. — [S. 274. 52.]
—— fragilis (Russ.). — [S. 311.] — Stu. h. 14. t. 53.
—— fragrans Sow. — [S. 279.] — Loud. f. 15910. — (Clit.) Hoffm. Ic. t. 3. — Bail S. t. 38. — Dsm. 1617. — Letell. 658.
—— Friesii (Lepiota). — Kl. 1501.
—— frumentaceus. — [S. 275.]
—— frustulentus. — [S. 294.]
—— fucatus Fr. (Trichol.). — [S. 274. 58.] — Kl. 1105.
—— fulgens. — [S. 301.] — Letell. 646. (bivelus β Fr.).
—— fuliginosus. — [S. 310.] (Lact.) — Roq. t. 20. f. 2. — Hrz. t. 19.
—— fulmineus. — [S. 301.]
—— fulvescens. — [S. 305.]
—— fulvo-albicans. — Roq. t. 21. f. 1.
—— fulvus Schum. = vaginatus Fl. dan.
—— fumosus P. — [S. 277.] — Letell. 669. — Hrz. t. 23. — (Clitoc.) Kl. 302.





Agaricus furcatus Fr. — (Russ.) Bail S. t. 33. — [S. 311.] — Fl. dan. XI. 1909. 1. – Roq. t. 12. f. 2. — Phöb. Gift. t. 4. f. 1. 2. — Viv. 60. (c. var. heterophylla).
—— furfuraceus P. — [S. 293.] – Loud. f. 15996.
—— furnaceus. — Letell. 653.
—— furvus. [S. 27?.]
—— fuscellus. – Kl. 1905.
—— fuscescens Schff. Hrz. t. 37. (sec. Rbh.). Linn. 1830. V. t. 6. f. 9. (Jungh.).
—— fuscipes v. rubiginoso-maculatus Fr. — Fl. dan. XIII. 2265. 2.
—— fusco-purpureus P. — [S. 313.] (Maras.). — Bisch. f. 3252. – Loud. f. 15864. — (Clitoc.) Kl. 509. — Brit. f. 127. 128.
—— fuscus Schum. = stipatus Fl. dan.
—— fusipes Bull. — [S. 279.] — Berk. Out. t. 5. f. 5. — Loud. f. 15857. — Fl. dan. t. 1607. (Fr. Ep.). — Hoffm. Ic. t. 4. — cum Sclerotio: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 1. (Lév.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 32. (Keimg. Hoffm.). — Huss. II. 48.
—— fusus. — [S. 291.]
—— galericulatus (Myc.) Scop. — [S. 282 *.] — Vent. mi. 87. f. 3. — t. 91. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 10. (Keimg. Hoffm.). — Bisch. f. 3242. — Vent. t. 8. f. 76. — Loud. f. 15883. — Kl. 610. – R. f. 5. — Dsm. III. 343.
—— gallinaceus. — [S. 277.]
—— galopus. — [S. 283.] — Berk. Out. t. 6. f. 2.
—— gambosus. — [S. 276.] — Berk. Out. t. 4. f. 5. — Fries Sv. t. 9. (Pomonae Lz. Krbh.).
—— gausapatus. — [S. 275.]
—— Gayanus (Amanit.). — Chile n. 7. f. 9.
—— gentilis. — [S. 304.] — Brit. f. 138.
—— geophyllus Sow. — [S. 291. 295 **.] — Loud. f. 15993. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 48–60. (Anat. Phöb.). — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 8. (Pollinar. Hoffm.). — Kl. 615. — Dsm. III. 458. 459.
—— Georgii Sow. — (Clusii) Huss. I. 83. — (Trichol. graveols.).
—— —— Sow.: Loud. f. 16014.
—— geotropus. — [S. 278.]
—— germanus. — [S. 305.]
—— gibberosus. — [S. 294.]
—— gibbus.
—— —— v. infundibuliformis Fr. — Kl. 10.
—— giganteus (Clit.). — [S. 278.] — Loud. f. 15814. — Huss. I. 79.
—— —— minor. — Letell. 682.
—— gilvo-brunneus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 12. (Jungh.).
—— gilvus P. (Clit.). — [S. 278.] — Letell. 670. — Loud. f. 15815. — Hrz. t. 75.
—— glandicolor. — [S. 304.]
—— glandulosus. — [S. 284.]
—— glaucophyllus. — Kl. 1803.
—— glaucopus Schff. (Cortin.). — [S. 300.] — Huss. II. 30. — Kl. 712. — Loud. f. 15963.
—— glebarum. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 162. 3.
—— gliodermus. — [S. 563.]
—— globosus Schum. — Fl. dan. XII. 2148. 1.
—— globulifer Gr. = ? racemosus P. (Tul. Sel.).
—— gloiocephalus. — Letell. 645.
—— glutinosus. — cf. Gomphidius. — [S. 289 *.]
—— glyciosmus (Lact.). — [S. 310.] — Kl. 1512.
—— gomphus. — Letell. 603 (rutilus).
—— Gordoni B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 7. p. 377.
—— gossypinus. — [S. 297.]

Agaricus gracilentus. — [S. 273.]
—— gracilis. — [S. 297.] — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 2. (Anat. Bonord.). — (Gomphid.) Berk. Out. t. 12. f. 7.
—— gracillimus. — [S. 284.] — Alger. t. 31. 2.
—— grallipes. — [S. 301.]
—— graminicola Ns. — [S. 280 *.] — Bisch. f. 3251.
—— graminum (Maras.). — Berk. Out. t. 14. f. 8. — Lib. 119.
—— grammocephalus. — Berk. Out. t. 1. f. 1. (Fructif.).
—— grammopodius. — [S. 276.] — Huss. II. 41.
—— granulosus. — [S. 273.] — Huss. I. 45. — Fl. dan. X. 1677. 1. u. X. 1795. — Fuck. s. 1142. — Loud. f. 15745. — Hrz. t. 44. A. — Bisch. f. 3161. — Hoffm. Ic. t. 13. f. 1. (Lepiot.). (cf. ochraceus Hrz.).
—— graveolens. — [S. 276: 104; 275 **; 276: 100.]
—— griseo-cyaneus. — [S. 287.]
—— griseo-pallidus. — [S. 284.]
—— griseo-rubellus. — [S. 288.]
—— griseus Fr. (Omphal.). — [S. 284.] — Kl. 1207.
—— grossus. — cum Sclerotio: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 2. (Léveillé).
—— grumatus. — [S. 279.]
—— gypseus. — [S. 281.]
—— gyrans. — [S. 279.]
—— gyroflexus. — [S. 296.]
—— haematites. — [S. 294.]
—— haematocephalus Mt. (Maras.). — Sagra Cuba t. 17. f. 4.
—— haematochelis. — Huss. I. 19. — Roq. t. 17. f. 2.
—— haematophyllus. — Brit. f. 121. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 1. p. 507. (Berk.).
—— haematopus. — [S. 282.]
—— hariolorum. — [S. 280.]
—— haustellaris. — [S. 294.]
—— hebes. — [S. 296.]
—— helomorphus. — [S. 291.]
—— helvelloides. — [S. 304.]
—— helvolus. — [S. 304.]
—— helvus (Lact.). — [S. 309.] — Kl. II. 109.
—— hemitrichus. — [S. 304.]
—— herpeticus. — [S. 301.] — Roq. t. 20. f. 3.
—— heteroclitus Fr. — [S. 289.] — Klotzsch in Dietr. Flor. boruss. t. 386. — Hoffm. Ic. t. 14. f. 2. (Derm. Phol.).
—— heterophyllus Fr. (Russ.). — [S. 311.] — Badham t. 10. 3. — Berk. t. 13. f. 5. — Huss. I. 84. — cf. furcatus.
—— hiascens. — [S. 297.]
—— hiemalis. — cf. hyem.
—— hilaris. — [S. 292.]
—— hinnuleus. — [S. 304.]
—— hircinus. — [S. 302.]
—— hirneolus Fr. (Clit.). — [S. 277.] — R. f. 109.
—— hirtipes Schum. — [S. 288.] — Fl. dan. X. 1730. 2.
—— ? hirtus Wllr. — Kl. 1909.
—— hispidulus. — [S. 286; 273.]
—— hiulcus. — [S. 291.]
—— holosericeus. — [S. 273.]
—— Hookeri. — [S. 290 **.] — Hook. J. 1852. IV. t. 6.
—— hordus. — [S. 275.]
—— horizontalis Bull. — [S. 292.]
—— —— β. crenulatus. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. p. 809. (Schulzer).


Agaricus Hornemanni. — [S. 295.]
—— hortensis. — Viv. 11.
—— Hudsoni P. — S. 314.] — Dsm. 165. — Loud. f. 15879. — (Maras.) Kl. 1403.
—— humilis P. — cf. atrovirens P. - [S. 276.]
—— humosus. — [S. 278.]
—— hybridus Sow. — [S. 291.] — Loud. f. 15972.
—— hydrochrous. - [S. 281 *.]
—— hydrogrammus Schum. = phyllophilus Fl. dan. — (Omph.) Bail S. t. 38. — [S. 283.] — Vent. mi. 96. f. 7.
—— hydrojonides (Hypor.). — Comment. soc. cr. it. 1861. 2. t. 3. f. 3. p. 61. (Cesati).
—— hydrophilus Bull. = stipatus Fl. dan. — [S. 296.]
—— hydrophorus. — [S. 297.]
—— hyemalis Osbeck. — cf. Ag. corticalis. — [S. 283.] Bull. t. 519.
—— —— Lasch.: Kl. 306.
—— hygrophytus. — [S. 296.]
—— hymeninus. — Alger. t. 31. 4.
—— hypnophilus. — Letell. 706. 2. (perpusill.).
—— hypnorum Schrk. — [S. 294.] — Loud. f. 16000. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. e. (Pollin. Hoffm.).
—— hypotheius Fr. — [S. 307.] — Fl. dan. XI. 1914. 2. — Loud. f. 15752. — (Limac.) Kl. 603.
—— hypsipus. — [S. 295.]
—— hysginus. — [S. 309.] — (Lact.) — Vent. mi. 97. — f. 8. 9.
—— hystrix. — [S. 290.]
—— janthinus. — [S. 282.]
—— ichoratus. — [S. 310.] (Lact.).
—— jecorinus. — [S. 309.] (Lact.).
—— Jerdoni B. B. (Naucor.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 2. p. 375.
—— iliopodius. — [S. 304.]
—— illibatus. — [S. 302.]
—— illinitus. — [S. 273. 39.] — Loud. f. 15744. — Hoffm. Ic. t. 13. f. 2. (Lepiot.).
—— illuminus. — [S. 305.]
—— imbricatus (Trichol.). — [S. 275.] — Kl. II. 404. — Berk. Out. t. 4. f. 3.
—— imbutus. — [S. 305.]
—— impatiens Fr. — [S. 297.] — Fl. dan. XI. 1960. 2.
—— impennis. — [S. 304.]
—— imperialis. — [S. 274. 47.]
—— impudicus. — [S. 313.] (Maras.).
—— inamoenus. — [S. 276.]
—— incanus. — [S. 287.]
—— incarnatus Relh. = roseus Fl. dan.
—— incilis. — [S. 278.]
—— incisus. — [S. 304.]
—— inclinatus. — [S. 282.]
—— incomtus. — [S. 279.]
—— inconspicuus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14. (Berk.).
—— incrustatus Schum. = caperatus Fl. dan.
—— incurvus Schum. = urbus Fl. dan. — [S. 303.]
—— Indigo (Lactar.). — Carol. II. 4.
—— inflexus (Maras.). — Chile n. 7. f. 5.
—— infractus. — [S. 300.]
—— Infula. — [S. 288.]
—— infundibuliformis. — [S. 278.] — Berk. Out. t. 5. f. 2. — Carol. V. 3. — Viv. 5. — Vent. mi. 85. f. 1. 2.
—— ingratus Schum. — [S. 280.] — Fl. dan. XIII. 2266. 2.
—— inodermus. — [S. 563.]
—— inodorus Schum. = plexipes Fl. dan.
—— inolens. — [S. 281.]

Agaricus inopus Fr. — [S. 291.] — Loud. f. 15987.
—— inornatus Sow. (Clit.). — Loud. f. 15828. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 8. (Anat. Bonord.).
—— inquilinus. — [S. 292.]
—— insidiosus. — Letell. 631.
—— insititius (Maras.). — [S. 314.] — Berk. Out. t. 14. f. 6.
—— insulsus. — [S. 309.] (Lact.). — Berk. Out. t. 13. f. 2.
—— integer L. (Russ.). — [S. 310. 12; 311.] — Hrz. t. 63. — Phöb. Gift. t. 3; 4: 1. 2. — (Russ.) Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 10. (Anat. Bonord.).
—— —— v. sanguinea B. — Hrz. t. 26.
—— —— v. virescens Schff. — Hrz. t. 54.
—— integrellus P. (Omphal.). — [S. 284.] — Kl. 1110.
—— intentus. — [S. 301.]
—— inunctus. — [S. 295.]
—— inversus. — [S. 278.]
—— involucratus. — Alger. t. 31. 7.
—— involutus (Panus, Ruthea, Paxill.) B. — Kops Fl. bat. X. 754. — Loud. f. 16003. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 27. 28. (Fructif. Berk.). — Berk. Out. t. 12. f. 5. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 91. (Fruct.). — Kl. 20.
—— iocephalus. — Carol. V. 1.
—— ionides. — [S. 276.]
—— ionipterus (Clitpil.). — Comment. soc. cr. it. 1861. 2. t. 3. f. 4. p. 60. (Cesati).
—— ionus. — Krbh. t. 71. f. 5—9.
—— Iris. — [S. 281.] Berk. Out. t. 6. f. 3.
—— irregularis. — [S. 305.]
—— irriguus. — [S. 308.]
—— irroratus Schum. = phalloides Fl. dan.
—— irrufatus. — [S. 277.]
—— isabellinus. — [S. 305.]
—— jubarinus. — [S. 305.]
—— jubatus. — [S. 287.]
—— juglandinus. — [S. 288.]
—— juncicola. — [S. 283.] — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 11. (Anat. Bonord.).
—— junonius. — [S. 289.]
—— Karlii Rbh. (Maras.). — R. f. 506.
—— Kretschmari. — [S. 288 **.]
—— laccatus. — (Clitoc.). — [S. 279.] — Kops Fl. bat. XI. 824. 1. — Berk. Out. t. 5. f. 3.
—— —— Scop.: Loud. f. 15844. — R. f. 305.
—— —— Schff.: Hrz. t. 48. B. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 22—25. (Pollin. Phöb.). — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 11. (Pollin. Hoffm.). — Kl. 11. — Kl. II. 108. — Huss. I. 47.
—— —— v. perpusillus Scop. — R. f. 503.
—— laceratus. — [S. 308: 36.]
—— lacerus Fr. — [S. 290.] — Fl. dan. XI. 1846. 1. — Kl. 315. — Hoffm. Ic. t. 12. f. 1. (Dermin.).
—— Lacmus Schum. = pratensis Fl. dan. — [S. 308: 27.]
—— lacrymabundus (Prat. Hyphol.) Sow. — [S. 296.] — Loud. f. 16021. — Bail S. t. 35. — cf. Ag. velutinus.
—— —— Bull.: Kl. 214. — Hoffm. Ic. t. 15. f. 3.
—— lactescens Sow. = subdulcis Fl. dan.
—— lacteus P. — [S. 281.] — (Russ.). — [S. 310.] — ? Vent. mi. 81. f. 1. 2. — Fl. dan. XI. 1845. 1. u. XII. 2141. 1. — (Mycen.) Bull.: Kl. 607.
—— —— Bull.: Wstd. 586.
—— —— v. pityus. — Kl. 1705.
—— lactifluus. — Kops Fl. bat. XI. 874.
—— laetus (Hygroph.). — Kl. II. 612. — [S. 308.]

Agaricus laevigatus Schum. = epipterygius Fl. dan. - [S. 282.]
—— lamellatus Poll. — Wstd. 1283.
—— lampropus Fr.
—— —— v. fuscescens. — Kl. 1104.
—— lanatus Schum. = peronatus Fl. dan.
—— —— Sow. — [S. 302.]
—— lancipes. — [S. 279.]
—— languidus. — [S. 313.] (Maras.).
—— laniger. — [S. 303. 302*.]
—— lanuginosus Bull. — [S. 290.] — Loud. f. 15991. — (Inoc.) Kl. II. 104.
—— Lappula. — [S. 287.]
—— laqueatus. — [S. 274. 50.]
—— largus. — [S. 300.]
—— Laschii. — [S. 563.]
—— lascivus Fr. (Trichol.). — [S. 276.] — Kl. 1209.
—— lateritius Schff. — (Hyphol.) [S. 293.] — Loud. f. 16022.
—— —— Fr.: Fl. dan. XI. 1846. 2. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 61—63. (Fructif. Phöb.). — Hoffm. Ic. t. 15. f. 13: 17. 18 (veli evolut.). — Huss. I. 60.
—— —— (Galera) Fr. — Kl. 215.
—— latus. — [S. 300. 301: 51.]
—— lazulinus Fr. (Myc.). — [S. 287.] — Kl. 1201.
—— Leightonii. — [S. 285*.] — Ann. Mg. n. h. 1844. XIII. t. 9. f. 1. p. 343 (Berk.).
—— lenticularis. — [S. 272. 19.]
—— lentus. — [S. 291.]
—— leoninus Schff. — [S. 286.] — Bisch. f. 3420. — Berk. Out. t. 7. f. 4.
—— lepideus Fr. — Loud. f. 15915.
—— lepidus (Russ.). — [S. 310.] — Huss. II. 32.
—— Lerchei. — [S. 273. 41.]
—— leucocephalus. — [S. 276.]
—— leucophaeus. — [S. 307.]
—— leucophyllus. — [S. 564.]
—— leucopus Bull. — [S. 564.] — Bisch. f. 3460.
—— leucosporus. — [S. 273***.]
—— leucoxanthus. — [S. 275.]
—— Leveilleanus. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1845. XII. t. 5. (Doz. Molk.).
—— libertatis. — [S. 296.]
—— licinipes. — [S. 304.]
—— ligatus. — [S. 307.]
—— lignatilis Fr. — [S. 284.] — Fl. dan. X. 1797.
—— —— Bull. — cf. Ag. apicreus.
—— limacinus. — [S. 307.]
—— limbatus Lasch. (Mycen.). - Kl. 1203. — R. f. 502.
—— limonius. — [S. 304.]
—— limosus. — [S. 288.]
—— limpidus. — [S. 285.]
—— limulatus. — [S. 292.]
—— Linckii. — [S. 287.]
—— Lindgreenii. — [S. 304.]
—— lineatus. — [S. 281.]
—— Linnaei (Russ.). — [S. 310.]
—— liquidus. — [S. 302.]
—— Liquiritiae. — [S. 292.]
—— lituus. — [S. 283.]
—— livido-ochraceus. — [S. 303**.]
—— lividus. — [S. 286.]
—— livor. — [S. 305.]
—— lixivius. — [S. 276.]
—— lobatus Sow. (invers. v. Fr.). — Huss. II. 43.
—— longicaudus Schum. = tenacellus Fl. dan. — Berk. Out. t. 9. f. 2. — [S. 290.]
—— longinquus. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 163. 5.

Agaricus longipes Bull. — [S. 279.] — Bisch. f. 3423. — Vent. mi. 50. f. 5; 57. f. 3. 4; 71. 87.
—— loricatus. — [S. 275.]
—— loripes. — [S. 279.]
—— Loveianus. — Berk. Out. t. 7. f. 2.
—— lubricus. — [S. 291.]
—— lucifer. — [S. 289.]
—— lucifugus. — [S. 291.] — ? Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 39 - 47. — (Fructif. Phöb.).
—— ludius. — [S. 280.]
—— lugubris. — [S. 292.]
—— lupinus. — [S. 291.]
—— luridus (Trichol.). — [S. 275.] — Loud. f. 15761.
—— —— (Lactar.). — [S. 309. 17.] — Loud. 15790.
—— luscinus. — [S. 277.]
—— lustratus. — [S. 300.]
—— luteo-albus. — [S. 281.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 3. (Anat. Bonord.).
—— luteolus. — Wstd. 310.
—— luteo-nitens. — [S. 295.]
—— luteus (Russ.). — [S. 311.]
—— lutincola Lasch. — Kl. 1707.
—— lyratus. — [S. 301.]
—— macilentus. — [S. 280.]
—— macrocephalus. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 10 - 12. (Fructif. Berk.).
—— macropus P. (Cortin.). — [S. 303.] — Kl. 1001. — Kl. II. 107.
—— —— A. S. = caperatus Fl. dan.
—— macrosporus Mtg. = Lentinus Lecomtei Fr.
—— maculatus Schum. = magnificus Fl. dan. — [S. 279.]
—— —— A. S.: Huss. II. 20.
—— madidus. — [S. 286.]
—— magnificus Fr. — [S. 272. 11.] — Fl. dan. XII. 2146.
—— maialis Fr. — [S. 287.] — Loud. f. 15947.
—— malachius. — [S. 302.] — Kl. 1908.
—— malicorius. — [S. 303.]
—— mammosus. — [S. 288.] — Huss. II. 42. — Bertuch Bilderb. XXXI. 2. — [S. 309.] (Lact.).
—— Mappa. — [S. 272. 4.] — Vent. t. 13. f. 124. 125. — Hrz. t. 5. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. f. (Anat. Bonord.).
—— Mariae Kl. — Linn. 1832. VII. t. 8.
—— maritimus Fr. Obs. = lacerus Fl. dan. — [S. 290.]
—— mastiger B. B. (Psathyra). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 14. f. 6. p. 377.
—— mastoideus Fr. — [S. 273.] — Fl. dan. XII. 2144. — Berk. in Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 1. — Viv. 19.
—— mastrucatus Fr. — [S. 285.] — Loud. f. 15929.
—— maurus Fr. — [S. 283.]
—— maximus. — [S. 278.]
—— medius. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1676. 2.
—— medullatus. — [S. 273. 37.]
—— melaleucus. — [S. 276.]
—— melanops. — Bull. ac. belg. Ser. 2. To. 11. p. 660. f. 5. (Wstd.).
—— melantinus. — [S. 273*.]
—— melinoides. — [S. 292.] — Dsm. 1619. — Kl. 1804. — Berk. Out. t. 9. f. 3.
—— melizeus. — [S. 307.]
—— melleus Vahl. (Armill.). — [S. 274. 48.] — Loud. f. 15747. — Vent. t. 3. f. 20. 21. — t. 13. f. 120. 121. — Kops Fl. bat. X. 775. — Bisch. f. 3326. — Hrz. t. 8. — Berk. Out. t. 4. f. 1. — Staude t. 9. f. 4—5. — Ital. 583. — Krypt. Bad.


249. — Bail S. t. 38. — Bot. Zt. 1859. t. 13. f. 20—25. (2te Fructif. ? de Bary). — Kl. 2. — Dsm. 1247. — Kl. II. 2. — Carol. II. 1. — Badham t. 16. 3. — Viv. 51. — Vent. mi. 26. 51. Fries. Sv. t. 36.
Agaricus melleus Vahl. v. fuscescens. — Kl. II. 606.
—— mephiticus. — [S. 281.]
—— merdarius. — [S. 295.]
—— mesodactylius. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 1. (Berk.).
—— mesomorphus Bull. — Bisch. f. 3261.
—— mesophaeus (Derm.) P. — [S. 289.] — Hoffm. Ic. t. 6.
—— mesotrephus (Hygr.). — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 2. p. 402. (Berk. et Br.).
—— metachrous. — [S. 278.]
—— metapodius. — [S. 308.]
—— metatus H. H. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 12. 14. 15—17. (= vulgaris Fr.). — Kl. II. 301. (item).
—— —— Fr.: [S. 282.]
—— micaceus (Coprin.). — Huss. I. 55. — Kops Fl. bat. X. 820. 3. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 1—8. Basid. Berk.). — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 1—5. (Fructif. Lév.). — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 41. (Keimg. Hoffm.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 65—71. (Spor. Phöb.). — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 2. 5. (Pollinar. Hoffm.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 33. (Keimg. Hoffm.). — Kl. 305. — Viv. 24. — Vent. mi. 29. f. 4. 5. — Ital. 329. — Stu. h. 14. t. 49.
—— Michelianus. — [S. 280.]
—— miculatus. — [S. 275.]
—— miltinus. — [S. 303.]
—— milvinus. — [S. 306.]
—— miniatus (Hygrophor.). — [S. 308.] — Act. Tur. 1805. XIV. t. 1. (Cumino).
—— —— Fr.: Hrz. t. 4. a.
—— minutulus Schff. = disseminatus Fl. dan.
—— mitis P. (Pleurot.). — [S. 285.] — Kl. 707. — Berk. Out. t. 6. f. 9. — Kl. II. 602. — Brit. f. 137.
—— mitissimus (Lactar.). — [S. 310.] — Hoffm. Ic. t. 2. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. d. (Basid. Hoffm.).
—— mniophilus. — [S. 294.]
—— mollis Schff. — [S. 294.] — Brit. f. 18. — Loud. f. 16007. — Berk. Out. t. 9. f. 6. — (Crepid.) Kl. 704. — Carol. III. 2.
—— —— Sow. cf. Ag. canescens. — Huss. I. 74.
—— molochinus. — [S. 280.]
—— molyoides. — [S. 313.]
—— momentaneus. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 9. (Basid. Berk.).
—— montanus (Psiloc.). — Kl. 1510 u. 1710.
—— morosus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 6. (Jungh.).
—— mortuosus. — [S. 279.]
—— Mouceron. — Vent. mi. 11. f. 1—4. — Fl. dan. X. 1672. 2. (cf. Prunulus).
—— —— Bull.: Vent. t. 4. f. 34. 35.
—— mucidus (Armill.). — [S. 274. 51.] — Loud. f. 15746.
—— —— Schrad. cf. Ag. splendens Hrz.
—— mucifluus. — [S. 301.]
—— Mucor B. — Bisch. f. 3254.
—— mucosus Fr. — Vent. mi. 87. f. 7. 8.
—— multicolor. — [S. 299.]
—— multifidus Ns. — Schizophyll. comm. Fr.
—— multiformis. — [S. 300.]
—— multiplex Fr. — [S. 281.]
—— mundatus.
—— —— var.: Rbh. R. f. 13.
Agaricus mundulus Lasch. (Clitpil.). — Kl. 612.
—— —— v. nigrescens. — Kl. 611.
—— muralis Sow. — [S. 284.] — Loud. f. 15905. — (Omphal.). R. f. 504.
—— murcidus. — [S. 296.]
—— muricatus. — [S. 289.]
—— muricinus. — [S. 302.]
—— murinaceus. — [S. 275. 80.] — Loud. f. 15852. (Hygroph.). — [S. 275**. 308.]
—— murinus. — [S. 281.] — Loud. f. 15913.
—— muscarius (cf. Amanita). — [S. 272. 7.] — Kops Fl. bat. VII. 495. — Bisch. f. 5. 6. 3456—3458. — Loud. f. 15736. — Vent. t. 1. f. 5. 6. — Roq. t. 18. 19. 20. f. 1. — Hrz. t. 1. — Hoffm. Ic. t. 1. — Phöb. Gift. t. 2. — Berg Charakterist. 1860. t. 1. f. 10. — Bail S. t. 38. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 17. (Schwingfaden, Hoffm.). — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 1. (Anat. Bonord.). — Kl. 1. — Müller Pflanzenstaat 273. (Copie). — Fries Sv. t. 1. — Huss. I. . — Viv. 29. — Vent. mi. 2. f. 3. 4; t. 3. u. 4. — Krypt. Bad. 250. — Stu. h. 14. t. 51.
—— muscigenus Schum. — [S. 280.] — Fl. dan. XII. 2023. 1.
—— Musseron cf. Ag. Mouceron.
—— mussivus. — [S. 289.]
—— mustelinus Schum. = candicans Fl. dan. — (Russ.) [S. 310.]
—— musteus. — [S. 309.]
—— mutabilis Schff. — (Pholiot.) [S. 289.] — Vent. t. 9. f. 83. 84. — Berk. Out. t. 8. f. 3. — — Kops Fl. bat. XI. 815. 1. — Bisch. f. 3276. — Loud. f. 15981. — Kl. 614. — Badham t. 16. f. 4. 5 (caudicinus). — Huss. II. 27. — Staude t. 5. f. 1—3.
—— —— v. denudatus Fr. — Fl. dan. XII. 2076. 1.
—— mutilus. — [S. 285.]
—— mycenoides. — [S. 289.] — Kl. 1308. (Pholiot.).
—— mycenopsis Fr. — [S. 294.] — Hoffm. Ic. t. 6.
—— Myomyces. — (Trichol.). — Letell. 663. — Fl. dan. X. 1729. — Loud. f. 15765. — Schntzl. Ic. Nachträge t. 2. f. 1. (Hymenium).
—— myosurus. — [S. 280.]
—— myrtillinus. — [S. 303.]
—— nanus. — [S. 286.]
—— napus. — [S. 300.]
—— naucinus. — [S. 273.] — Vent. mi. 59. f. 1. 2.
—— nauseosus (Russ.). — [S. 311.]
—— nebularis B. — [S. 277.] — Dsm. 1616. — Fl. dan. X. 1734. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 15. (Fructif. Berk.). — Roq. t. 15. f. 5. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. d—f. (Basid. Hoffm.). — (Clitoc.). Kl. 501. — Brit. f. 5. — Badham t. 9. 1. — Huss. II. 9. — Viv. 33.
—— necator Bull. — [S. 309. 37.] — (Lact.) — Fl. dan. XI. 1913. — Roq. t. 13. f. 3. 4. — Phöb. Gift. t. 6. f. 1—14. — Hrz. t. 70.
—— Neesii (Plut.). — Bail S. t. 37.
—— —— Barla: Nov. Act. 1860. XXVII. t. 16.
—— nefrens — [S. 288.]
—— nictitans. — [S. 274.] — (Trichol.) Huss. II. 46.
—— nidorosus. — [S. 287.]
—— nidulans P. (Pleurot.). — [S. 285.] — Kl. 316.
—— niger. — Carol. I. 1.
—— nigrescens Lasch. — (Clitop.) Kl. 611. — R. f. 13.
—— nigricans (Russ.). — [S. 310.] — Vent. mi. 89. f. 1—4.
—— nigripes Schrad. — Wstd. 1282.
—— nitellinus. — [S. 279.]



Agaricus nitidus (Russ.). — [S. 311.] — Loud. f. 15778. — Berk. Out. t. 13. f. 7. — (Aman.) [S. 272. 15.] — (Cortin.) [S. 302.]
—— nivalis. — Loud. f. 15735.
—— niveo-flavescens. — Viv. 52.
—— niveus (Coprin.). — Fl. dan. X. 1671. — (Hygr.) [S. 308.] — (Russ.) [S. 311. 26.]
—— —— Jacq.: Wstd. 1283.
—— —— Scop: Vent. mi. 98. f. 2.
—— nolitangere. — [S. 297.]
—— nubilus. — [S. 279.]
—— nuceus Bolt. — [S. 292.]. — Loud. f. 16002.
—— nucisedus. — [S. 296.]
—— nudipes. — [S. 290.]
—— nudus Bull. — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1911. 1. — Berk. Out. t. 4. f. 7. — Hrz. t. 30. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. a. (Pollin. Hffm.). — Dsm. III. 664. — Hoffm. Ic. t. 11. f. 1. (Trichol.).
—— obbatus. — [S. 278.]
—— obliquus. — Kl. 1508.
—— obolus. — [S. 279.]
—— obrusseus. — [S. 308.] — (Hygroph.). — Kl. II. 203.
—— obscuratus. — [S. 310.] (Lact.).
—— obscurus Schum. = udus Fl. dan.
—— obsoletus. [S. 279.]. — (Clitoc.). — R. f. 2.
—— obturatus. — [S. 295.] — Letell. 700.
—— obtusatus. — [S. 297.]
—— obtusus. — [S. 306.] — R. f. 501. (Cortin.).
—— ocellatus. — [S. 280.]
—— ochraceus Bull. — Hrz. t. 4. b. cf. granulatus. — (Russ.) [S. 311.]
—— ochreatus Holms. — [S. 295. cf. 439**.] — Bisch. f. 3286.
—— ochroleucus. — [S. 303.] — (Russ.) [S. 311.] — Vent. mi. 83. f. 5. 6.
—— odorus Bull. (Clit.). — [S. 277.]. — Loud. f. 15823. — Hrz. t. 58. — cf. Ag. anisatus. — Brit. f. 6.
—— oedematopus Scop. — Vent. mi. 45. f. 1. 2. — Vent. t. 6. f. 47. 48. — (Clit.) Schff.: Loud. f. 15832.
—— offuciatus. — [S. 283.]
—— olearius DC. — Viv. 50. — Vent. mi. 18. f. 1. 2. — Ann. sc. n. 1848. IX. t. 20. f. 1—10 (Tulsn.).
—— olivaceus (Russ.). — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 2. (Anat. Bon.).
—— olivaceo-albus Fr. — [S. 307.] — Fl. dan. XI. 1914. 1. — Loud. f. 15751.
—— olivascens. — [S. 301.]
—— olorinus. — [S. 277.]
—— oniscus Fr. (Omphal.). — [S. 283.] — Kl. 1208.
—— onychius. — [S. 276.]
—— opacus With. (Clit.). — Loud. f. 15834. — (Maras.) Carol. III. 6.
—— opicus. — [S. 276.]
—— opimus. — [S. 302.]
—— opiparus. — [S. 277.]
—— Opuntiae. — Alger. t. 32. 1.
—— orbiformis. — [S. 278.]
—— Orcella Bull. — Vent. t. 4. f. 32. 33. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 93 (Fructif.). — [S. 287.] — Badham t. 13. — Huss. I. 78. — Vent. mi. 8. f. 3. 4; 42. — Ital. 485.
—— Oreades Bolt. (Maras.). — [S. 313.] ? Bail S. t. 33. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 16. (Hoffm.). — Kops Fl. bat. XI. 830. — Berk. Out. t. 14. f. 5. — Loud. f. 15862. — Hrz. t. 17 b. — R. f. 301. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 47 (Keimg. Hoffm.). — Staude t. 9. f. 1. — Ital. 487. — Kl. 14. 711: var. — Badham t. 8. 3. — Huss. I. 38. — Viv. 24. — Vent. mi. 73. f. 4. 5. — Fries Sv. t. 31.
Agaricus Oreades Bolt. v. alnetorum Lasch. — Kl. 801.
—— oreinus. — [S. 276.]
—— orellanus. — [S. 303.]
—— orichalceus. — [S. 301.]
—— ornatus. — [S. 284.]
—— ostreatus Jcq. — [S. 285.] — Kops Fl. bat. X. 780. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 34. 35. (Fructif. Berk.). — Vent. t. 4. f. 30. 31. — Loud. f. 15920. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. f. (Pollin. Hoffm.). — Kl. 308. — Kl. II. 106. — Brit. f. 135. — cf. dimidiat. Letell. 695. — Badham t. 11. — Huss. II. 19. — Viv. 42. — Vent. mi. 20. 38.
—— ovatus (Coprin.). — Kops Fl. bat. XI. 875. (cf. Ag. comatus).
—— ovinus. — [S. 308.] — Huss. II. 50.
—— ovoideus Bull. — caesareus Scop. — Vent. t. 1. f. 1. 2. — Viv. 34. — Vent. mi. 25. f. 1—3; 59. f. 3.
—— oxyosmus. — [S. 294.]
—— oxystomus. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mtg.).
—— ozes. — [S. 280.]
—— pachyphyllus. — [S. 279.]
—— paedidus. — [S. 276.]
—— paeonius. — [S. 276.]
—— paleaceus. — [S. 304.]
—— pallidus (Lact.). — [S. 309.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 4 (Anat. Bonord.).
—— palmatus Bull. — [S. 294. 284***.] — Vent. t. 8. f. 70. 71. — Loud. f. 15925. — Vent. mi. 1. f. 3. 4.
—— Palomet. — Letell. 657.
—— paludosus. — [S. 294.]
—— panaeolus. — [S. 276.] — cf. Paxillus.
—— pannosus. — [S. 293.]
—— pannucius. — [S. 308.] (Lact.).
—— Pansa. — [S. 300.]
—— pantherinus DC. (Aman.). — [S. 272. 12.] — Fl. dan. XI. 1911. 2. — Vent. t. 1. f. 7. 8. — Bisch. f. 3462. — Loud. f. 15737. — Kl. 604. — ? cf. fuliginos. et herpetic. Roq. — Letell. 639. — cf. verrucosus. — Viv. 26. — Vent. mi. t. 5; t. 6. f. 1. 2; 9. f. 1; 67; 68; 80; 84; 94. — Staude t. 10. f. 3. 4. — Ital. 289.
—— panuoides (Paxill.). — Berk. Out. t. 12. f. 6.
—— papilionaceus Bull. — [S. 297.] — Bail S. t. 35.
—— —— Kl. 107. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 42. (Keimg. Hoffm.).
—— papillatus Hoffm. = lacteus Fl. dan.
—— papulosus. — [S. 301.]
—— parabolicus. — [S. 282.]
—— paragaudis. — [S. 304.]
—— parasiticus Bull. — Brit. f. 130. — Loud. f. 15872.
—— parilis. — [S. 278.]
—— parkensis. — [S. 288.]
—— paropsis. — [S. 278.]
—— parvannulatus. — [S. 273.]
—— parvulus (Volvar.). — Kl. 1401. — Lév.: [S. 286.] — Carol. I. 3.
—— pascuus (Nolan.). — [S. 288.] — Kl. 1702. — Dsm. 1802.
—— pateriformis. — [S. 305.]
—— patulus. — [S. 276.]
—— pauperculus. — [S. 281.]

Agaricus pausiacus. — [S. 279.]
—— pavonius. — [S. 302.]
—— pectinaceus Bull. — (Russ.) [S. 311.] — Bisch. f. 3446. — (Russ.) Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 24. (Fructif. Lév.).
—— pediades. — [S. 293.]
—— pelianthinus. — [S. 281.] — Berk. Out. t. 6. f. 1.
—— pelicanthinus Fr. — Loud. f. 15849.
—— pelliculosus Fr. (Myc.). — [S. 283.]
—— pellitus. — [S. 286.]
—— pellucidus Bull. — Loud. f. 15898.
—— peltatus. — [S. 282.]
—— penetrans. — [S. 291.]
—— penicillatus. — [S. 302.]
—— pennarius. — [S. 307.]
—— pennatus (Psath.). — [S. 297.] — Kl. 1710.
—— perbrevis.— Hoffm. Ic. t. 14. f. 1. (Derm. In.).
—— percomis. — [S. 300.]
—— perforans Hoffm. (Collyb.). — Kl. 806. — Fuck. s. 1035. — [S. 314.] (Maras.) — Kl. II. 408. R. f. 102. — Schweiz. 24. — Krypt. Bad. 158.
—— pergamenus Swartz. — [S. 309.] — Fl. dan. XIII. 2268. 2. — (Lact.). Cd. Ic. V. t. 10. f. 65. (Fructif.).
—— peronatus Bolt. — (Maras.) [S. 313.] — Fl. dan. XII. 2018. 2. — Bisch. f. 3281. — Loud. f. 15861. — Kl. 13. — Berk. Out. t. 14. f. 4. — Brit. f. 125. 126. — Huss. I. 69.
—— —— v. tomentellus Fr. — Fl. dan. XII. 2018. 1.
—— perpusillus Fr. — [S. 285.] cf. Ag. laccatus. — Fuck. s. 1106. — Letell. 706. 2. (hypnophilus P.).
—— persicinus. — [S. 276.]
—— personatus (Trichol.). — [S. 276. 306**.] — Huss. II. 40. — Loud. f. 15772. — Kl. 209. — Berk. Out. t. 5. f. 1. — Badham t. 8. 1.
—— Persoonii. — [S. 272. 18.] — (Lact.) [S. 309. 22; 310. 49.]
—— pes Caprae. — [S. 276.]
—— pessundatus. — [S. 275.]
—— petaloides Bull. — [S. 285.] — Vent. t. 9. f. 81. 82. — Vent. mi. t. 54. f. 7—9.
—— —— spathulatus Fr. — Bisch. f. 3248.
—— petasatus Fr. — [S. 286.] — Ann. Mg. n. h. 1844. XIII. t. 9. f. 2. p. 343. (Berk.).
—— petasiformis. — Cd. Anl. t. H. f. 77 : 25—32.
—— petiginosus. — [S. 290.]
—— pezizoides. — [S. 294.] — Act. Tur. 1805. XIV. t. 1. (Cumino).
—— phaeosporus — [S. 295.]
—— phalaenarum. — [S. 297.]
—— phaleratus. — [S. 289.]
—— phalligerus. — Chile, no. 7. f. 2.
—— phalloides (Aman.) Fr. — [S. 272. 3.] — Fl. dan. XII. 2143. 2145. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 4. (Fructif. Berk.). — Kops Fl. bat. X. 738; XI. 829. 1. — Phöb. Gift. t. 1. — Berk. Out. t. 3. f. 1. — Bisch. f. 3243. — Loud. f. 15732. — ? Roq. t. 23. f. 1. 2. — Hrz. t. 5. (Mappa). — Fries Sv. t. 2. — Kl. 202. — Kl. II. 603. — ? cf. Ag. citrinus. — Viv. 14. 15. — Staude t. 10. f. 1. 2. — Stu. h. 14. t. 55.
—— Phiala Schum. — Fl. dan. X. 1730. 1.
—— philonotis. — [S. 283.]
—— phlebophorus Dit. — [S. 286.] — Bisch. f. 3253. — Loud. f. 15944. — Stu. h. 1. t. 15.
—— phlyctophorus. — Alger. t. 30. f. 2.
—— phoeniceus. — [S. 273. 41.]
—— Phoenix. — [S. 296.]
—— pholideus Fr. — [S. 302.] — Bisch. f. 3275. — (Inol.) Kl. 1902.

Agaricus phonospermus Bull. — cf. Ag. fertilis.
—— phyllophilus P. — Letell. 605. — Fl. dan. XI. 1847.
—— physaloides. — [S. 296.]
—— picaceus (Coprin.) Fr. — Loud. f. 16040.
—— picinus. — [S. 310.] (Lact.).
—— picreus P. (Dermoc.). — [S. 292]. — Kl. 508.
—— pictus. — [S. 284.]
—— pileolarius Bull. = nebularis Fl. dan. — (Clitoc.) Huss. I. 66.
—— pilipes Sow. — Loud. f. 15895.
—— pilulifer (Coprin.). — Canar. t. 4. f. 6.
—— piluliformis. — [S. 273.]
—— pinguis Fr. — [S. 273. 38.]
—— pinsitus. — [S. 285.] — Dsm. 1803.
—— Piopparello. — Viv. 6. — Vent. mi. 40. f. 2; 48. f. 4. 5.
—— piperatus (Lact.). — [S. 309.] — Kops Fl. bat. XI. 825. 1. — Loud. f. 15810. — Roq. t. 13. f. 1. 2. — Hrz. t. 39. — Pay. bot. cr. p. 6. f. 18. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 17. (Fructif. Lév.). — Kl. 901. — Berk. Out. t. 13. f. 3. — Dsm. III. 668. — Brit. f. 61. — Carol. II. 5. — Vent. mi. 10. f. 7. — Ital. 439. — Fries Sv. t. 27.
—— pisciodorus (Entol.). — Kl. 1509. — Comment. soc. crit. it. 1861. 2. t. 3. f. 2. p. 59. (Ces.).
—— pithyophilus. — [S. 277.] — (Maras.) Carol. II. 10.
—— pithyreus. — [S. 293.]
—— pithyus. — [S. 281.]
—— placidus. — [S. 287.]
—— plancus. — [S. 313.]
—— planus Schum. — Fl. dan. X. 1733.
—— platyphyllus P. (Collyb.). — [S. 279. 464***.] — Kl. 714.
—— platypus Ns. — Bisch. f. 3259.
—— pleopodius Bull. — Bisch. f. 3419. — (Nolan.) Bail S. t. 37.
—— plexipes Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII. 2023. 2.
—— plicatilis (Copr.) Fr. — Carol. V. 10. — Loud. f. 16046. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 30. (Keimg. Hoffm.).
—— plicosus (Mycen.). — [S. 282.] — Kl. 1502. — Kl. II. 105.
—— plumbeus Bull. (Lact.). — [S. 309.] — Loud. f. 15807. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 94. (Fruct.). — Kl. 101.
—— plumbosus. — [S. 305. 301, 57.]
—— plumiger. — [S. 304.]
—— plumosus Bolt. — [S. 290.] — Loud. f. 15990.
—— pluteus B. — Loud. f. 15943. — Kl. 904. — Stu. h. 2. t. 28.
—— plutonius. — Canar. t. 5. f. 2. (Coprin.).
—— pluvius. — [S. 302.]
—— politus P. — [S. 288.] — Kl. 613. — (Eccil.) R. f. 111.
—— polyadelphus (Mycenaria). — [S. 284.] — Kl. 1307.
—— polycephalus. — [S. 296.]
—— polygrammus DC. — [S. 282.] — Loud. f. 15884. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 20. b. (Pollin. Hoffm.). — Kl. 608. — Brit. f. 12.
—— polystictus. — [S. 273*.]
—— pometi. — [S. 285.]
—— Pomonae? cf. Ag. aromatic. Roq. u. gambosus. — Staude t. 9. f. 2. 3.
—— popinalis. — [S. 287.]
—— populiformis. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 2.
—— porphyrius Fr. — [S. 272. 6.] — Fl. dan. XI. 1958. 2. — Bisch. f. 3285. — Loud. f. 15733.



Agaricus reticulatus P. — [S. 293.] — Bisch. f. 3323. — Berk. Out. t. 9. f. 5. — (Cortin.) [S. 303.]
—— retostus. — [S. 281.]
—— rhacodes. — [S. 273. 22.]
—— rhodocylix. — [S. 288.]
—— rhodopolius. — [S. 287.] — Fl. dan. X. 1736. — Loud. f. 15938.
—— Rieckei. — [S. 272. 8.]
—— rigens. — [S. 305.] — Alger. t. 31, 6.
—— rigidus. — [S. 304.]
—— rimosus Bull. — [S. 291.] — Loud. f. 15992. — Berk. Out. t. 8. f. 5. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 33—38. (Phöb.). — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 26. Fruct. Berk.). — Staude t. 5. f. 1. — Ital. 328.
—— rimulincola. — Kl. 1511. — R. f. 202.
—— ringens Fr. — Kl. 803.
—— rivulosus. — [S. 277.]
—— robustus A. S. — [S. 563.] — Kl. 1204. — (Armill.) Kl. II. 4.
—— romaleus. — Letell. 644.
—— roridus Fr. (Mycen.). — [S. 283.] — R. f. 8.
—— rosaceus Schum. = strobilinus Fl. dan. — — (Russ.) [S. 310.]
—— rosellus Fr. (Mycen.). — [S. 281. u. 273: 29.] — Fl. dan. XII. 2025. 2. — Krypt. Bad. 439. — Kl. 1805. — Kl. II. 206. — R. f. 112. — Dsm. III. 460.
—— roseo-albus. — [S. 286.]
—— roseus P. Schum. = rosellus Fl. dan.
—— —— Fl. dan. X. 1673. 1.
—— —— Scop.: [S. 273. 28.]
—— Rotula Scop. (Maras.). — [S. 314.] — Loud. f. 15874. — Fuck. s. 1037. — Kl. 220. — Berk. Out. t. 14. f. 7. — Kl. 804. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 14. (Hoffm.). — Dsm. III. 348. — Brit. f. 62. — Wstd. 1282.
—— ruber Lam. (Russ.). — [S. 310.] — Vent. t. 7. f. 63. 64. — Kl. II. 613. — Vent. mi. 14. f. 4; 93. f. 3. 4. — Loud. f. 15781.
—— —— DC.: Bisch. f. 3436. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 23. (Fructif. Lév.).
—— rubescens Fr. — [S. 272. 10.]
—— —— P.: [S. 307**.] — Kops Fl. bat. X. 765. — Fl. dan. XII. 2140. — Vent. t. 2. f. 9. 10. — (Aman.) Loud. f. 15738. — ? cf. fulvo-albicans Roq. — Badham t. 12. 1. (Amanita). — Huss. I. 23. — Viv. 22. 23. — Vent. mi. 31. f. 3; 78. f. 2. — Staude t. 10. f. 5.
—— —— var. — Fl. dan. XII. 2147.
—— Rubi. — [S. 294*.] — Berk. Out. t. 9. f. 7.
—— rubidus Berk. — [S. 294.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 2. p. 43 (Berk.).
—— rubiginosus Schum. = fuscipes var. Fl. dan. — P.: [S. 294.] — Wstd. 1284.
—— rubricosus. — [S. 305.]
—— rubro-marginatus Fr. — [S. 281.] — Kl. 504.
—— rudis. — [S. 273. 26.]
—— rufo-carneus. — [S. 288*.]
—— rufo-olivaceus. — [S. 301.]
—— rufus Scop. — [S. 309.] — Huss. I. 15. — Kl. 7. — (Lact.) Fr.: Fries Sv. t. 11.
—— rugatus Fl. dan. — Wstd. 586.
—— rugosus. — [S. 282.]
—— Russula Schff. — Letell. 616. — Vent. t. 3. f. 17—19. — Vent. mi. 72. f. 1—3; 91. f. 1.
—— russus. — [S. 300.]
—— rusticus. — [S. 283.]
—— rutaceus Lasch. (Lactar.). — Kl. 606. — R. f. 11.
—— rutilans Schff. — [S. 275.] — Letell. 681. — Vent. mi. 96. f. 1. — Fl. dan. XI. 1910. 2. — Hrz. t. 31. — (Trichol.) Loud. f. 15763. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 9. (Anat. Bonord.). — Kl. 4. 22.
Agaricus rutilus. — Letell. 603 (Gomphus). — Huss. II. 24.
—— sagatus. — [S. 294.]
—— saginus. — [S. 300.]
—— Sainsonii Lév. — Demid. Russ. t. 1. f. 3.
—— salebrosus. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 1. (Berk.).
—— salicinus Schum. = aurivellus Fl. dan. — P.: [S. 286.]
—— salignus P. — [S. 285.] — Letell. 687. — Kops Fl. bat. X. 725. 3. — Fuck. s. 1108. — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 5. d. (Anat. Bonord.). — (Pleurot.) Kl. 1505. — Carol. II. 3.
—— salor. — [S. 302.]
—— sambucinus. — [S. 291.]
—— sandicinus. — [S. 279.]
—— sanguineus (Russul.). — [S. 311.] — Roq. t. 12. f. 1.
—— —— (Cortin.). — [S. 303.] — Bail S. t. 34. Bisch. f. 3461.
—— sanguinolentus (Mycen.). — [S. 282.] — Kl. 1306.
—— saniosus. — [S. 306.]
—— sapidus. — Roq. t. 10. f. 4.
—— sapineus. — [S. 291.]
—— saponaceus Fr. — [S. 275.] — Kl. 104. — (Trichol.) Kl. 1909.
—— sarcitus. — [S. 288.]
—— sarcocephalus. — [S. 296.]
—— sardellus. — [S. 290**.]
—— sardonius (Russ.). — [S. 311.]
—— saturninus. — [S. 305.]
—— saxatilis. — [S. 313*.]
—— scabellus. — [S. 280*. 291.]
—— scaber. — [S. 290.] — Loud. f. 15989. — ? Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 56. f. 26—32. Fructif. Phöb.).
—— scabiosus. — [S. 286.]
—— scabrosus. — [S. 288.]
—— scalaris. — [S. 294.]
—— scalpturatus. — [S. 275.]
—— scambus. — [S. 291.]
—— scandens. — [S. 305.]
—— scaurus. — [S. 301.]
—— sceptrum. — (Coprinus) Linn. 1830. V. t. 6. f. 10. (Jungh.).
—— Schumacheri Fr. — [S. 276.] — Fl. dan. XIII. 2267. 1.
—— sciophanus Fr. — [S. 308.] — Fl. dan. XI. 1845. 2.
—— scleropus. — Gaudich. voy. 1826. t. 2.
—— scobinaceus. — [S. 295.]
—— scobinellus. — [S. 272. 20.]
—— scolecinus. — [S. 292.]
—— scorodonius Fr. — (Maras.) [S. 313.] — Hrz. t. 28. A. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 14. (Hoffm.). Loud. f. 15865. — Bisch. f. 3315. 3417. — Kl. 16. — Kl. II. 609. — R. f. 105. — Fries Sv. 32.
—— scorpioides. — [S. 293.]
—— scorteus. — [S. 313.] (Maras.).
—— scrobiculatus Scop. — (Lactar.) [S. 308.] — Kl. 203.
—— scutulatus. — [S. 304.]
—— scyphiformis Fr. (Omphal.). — [S. 284.] — R. f. 303.
—— scyphoides (Omphal.). — [S. 283.] — Kl. 1604. — R. f. 304. — Carol. IV. 1.
—— sebaceus. — [S. 300.]
—— segestrinus. — [S. 293.]



Agaricus sejunctus (Trichol.). — [S. 274. 55.] Loud. f. 15768.
—— Sementino. — Viv. 19.
—— semicremus (Russ.). — [S. 310.]
—— semiglobatus B. — [S. 295.] — Loud. f. 16016. — Huss. I. 39.
—— semilanceatus. — [S. 296.]
—— seminudus. — [S. 273. 36.]
—— semiorbicularis. — [S. 293.] — Berk. Out. t. 9. f. 2. — ? Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 9. f. 19. (Lév.).
—— semiovatus Sow. — Loud. f. 16032. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 30. (Fructif. Berk.).
—— —— Schum. = semiputris Fl. dan. — Lindl. v. K. p. 33. f. 2. (Fructif.).
—— semiputris Bull. — Fl. dan. XI. 1959. 1, 2.
—— semitalis. — [S. 279.]
—— semivestitus B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 11. f. 5. p. 377.
—— separatus. — [S. 297.] — Kops Fl. bat. XI. 820. 1. — Berk. Out. t. 11. f. 7. — Kl. 406.
—— septicus (Pleurot.). — [S. 285.] — Kl. 1305. — Letell. 706. 1 (chioneus).
—— sepulcralis. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 15. (Berk.).
—— sericellus Fr. — [S. 287.] — Bisch. f. 3280. — Kl. 1206.
—— sericeus — [S. 287.] — Kl. 1801. — Hoffm. Ic. t. 11. f. 2. (Entolom.).
—— serifluus (Lactar.). — Berk. Out. t. 13. f. 1.
—— serotinus P. — [S. 285.] — Kl. 1002.
—— serrarius. — [S. 301.]
—— serrulatus. — [S. 287.]
—— sertatus. — Viv. 11.
—— sessilis Bull. — Wstd. 1283.
—— setipes. — [S. 284.]
—— sideroides (Naucor.). — [S. 292.] — Bail S. t. 36.
—— silaceus. — [S. 293.]
—— simiputris. — cf. semiputris.
—— sinapizans. — [S. 290.]
—— sindonicus. — [S. 291.]
—— sinopicus. [S. 278.]
—— sinuatus Schum. = phalloides v. Fl. dan. — [S. 286.]
—— sinuosus. — [S. 289.]
—— siparius. — [S. 293.]
—— sistratus. — [S. 273.]
—— sitaneus. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 12 (Anat. Bonord.).
—— Smithii. [S. 310. 49.]
—— sociatus Schum. = ephemerus Fl. dan.
—— solitarius. — [S. 272. 13.] — Vent. mi. 60. f. 1. 2.
—— sordidus — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1843. 2. — (Trichol.) Kl. 1503.
—— spadiceo-griseus Schff. — [S. 297.] = stipatus Fl. dan. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 43. (Keimg. Hoffm.).
—— spadiceus. — [S. 296.] — (Cortin.) [S. 300.] — (Hygroph.) [S. 308.] — Schff: Carol. V. 6.
—— sparteus. — [S. 293.]
—— spathulatus. — [S. 285.]
—— speciosus. — [S. 285.] — Fl. dan. X. 1737. — Berk. Out. t. 7. f. 3. — (Volvar.) Bail S. t. 37. — Kl. 1601.
—— spectabilis. — [S. 289.]
—— Speculum. — [S. 287.]
—— speireus. — [S. 282.]
—— sphagnicola. — [S. 283. 313 **.]
—— Sphagnorum. — Carol. V. 5.

Agaricus sphaleromorphus Schum. = squamosus v., Fl. dan. — [S. 288.]
—— sphinctrinus. — [S. 297.]
—— spiculiferus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 14. (Berk.).
—— spilomeus Fr. — [S. 303.] — Loud. f. 15960.
—— spinipes Sow. — Loud. f. 15901.
—— spintriger. — [S. 295.]
—— spiralis (Coprin.). — Canar. t. 4. f. 5.
—— spissus. — [S. 272. 9.]
—— splachnoides. — [S. 314.] (Maras.). — Fl. dan. X. 1678. 1.
—— splendens P. — Hrz. t. 35.
—— spodoleucus. — [S. 285.] — R. f. 205. (Maras.).
—— spodophyllus. — [S. 294.] — Vent. mi. 54. f. 5. 6.
—— spoliatus. — [S. 290.]
—— spongiosus Schum. = butyraceus Fl. dan. — Lasch: [S. 284.] — (Maras.) Carol. III. 7.
—— spumosus (Flammula). — [S. 291.] — Kl. II. 601.
—— squamosus P. Fr. — [S. 295.] — Fl. dan. XII. 2077. 1, 2. — Berk. Out. t. 10. f. 6.
—— —— Schum. = adiposus Fl. dan.
—— Squamula B. = epiphyllus Fl. dan. — Wstd. 586.
—— squamulosus P. — [S. 278.] — Kl. 311.
—— squarrosus Müll. — [S. 289.] — Huss. I. 8. — Dsm. 1122.
—— —— Fr.: Kops Fl. bat. X. 743.
—— —— P.: Loud. f. 15978. — Hrz. t. 20. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 92. (Fruct.). — Bisch. f. 3468. — Kl. 301. — (Pholiot.) Kl. II. 401. — Brit. f. 17. — Vent. mi. 55. f. 3; 63. f. 5. 6.
—— stagninus. — [S. 294.]
—— stanneus. — [S. 282.]
—— stellatus Fr. [S. 284.] — Loud. f. 15902.
—— stemmatus. — [S. 305.]
—— Stephensii v. Hudsonii. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 3. p. 404. (Berk. B.).
—— stercorarius Schum. — [S. 295.] — Fl. dan. XII. 2141. 2.
—— sterilis. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 8. (Jungh.).
—— sticticus. — [S. 292.]
—— stillatitius. — [S. 302.]
—— stiparophyllus. — [S. 275.]
—— stipatus. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 23. (Anat. Lamell. Hoffm.).
—— —— v. caespitosus. — Fl. dan. X. 1673. 2.
—— stipitarius (Collyb.). — Dsm. 1618; — u. III. 275. — Kl. 1507. — Berk. Out. t. 5. f. 6. (graminealis) Brit. f. 132; 341.
—— stipularis. — [S. 283.]
—— stipulicola. — Kl. 1402. (Maras.).
—— stolonifer. — [S. 280.]
—— Storea. — [S. 296.]
—— stramineus. — [S. 274. 43.]
—— strangulatus. — [S. 272. 13.]
—— striatulus. — [S. 285.] — Dsm. III. 273. — Carol. IV. 2.
—— striatus. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 13. (Fructif. Berk.).
—— stridulus. — [S. 279.]
—— strigiceps. — [S. 291.]
—— strobiliformis Vitt. — Vent. mi. 48. f. 1—3. Vent. t. 2. f. 11. 12. — Berk. Out. t. 3. f. 2.
—— strobilinus Fr. — [S. 281.] — Fl. dan. XII. 2025. 1.
—— —— P.: Loud. f. 15889.
—— strophosus. — [S. 289.]
—— strumosus. — [S. 279.]

Agaricus stylobates P. — [S. 283.] — Dsm. III. 666. — Fl. dan. XII. 2025. 3. — Bisch. f. 3264. — Berk. Out. t. 6. f. 5. — Sturm h. 2. t. 29.
—— stypticus (cf. Panus). — Voges. 580. — Loud. f. 15927. — Dsm. 164. — Pringsh. Jhrb. II. t. 32. f. 45. (Keimg. Hoffm.). — Kl. 18; Cent. VIII. suppl. — Brit. f. 136. — Huss. II. 8. — Lib. 120.
—— suaveolens Schum. — [S. 278.] — Fl. dan. XI. 1912. 1. — Kl. 505.
—— suavissimus (Lentin.) Fr. — ?Vent. mi. 34. f. 1. 2.
—— subalutaceus. — [S. 277.]
—— subatratus. — Bot. Zt. 1858. t. 5. f. 1. (Anat. Bonord.).
—— subcavus Schum. — [S. 274. 49.] — Fl. dan. XI. 1843. 1.
—— subcernuus Schum. = squamosus Fl. dan.
—— subdulcis (Lact.). — [S. 310.] — Fl. dan. X. 1674. — Loud. f. 15801. — Hrz. t. 53. — Kl. 8. — Viv. 57. (c. v. castaneo-rufo et camphorato) = Vent. mi. 58. f. 3. 4.
—— subferrugineus. — [S. 305.]
—— sublanatus Sow. — Huss. II. 22. — Loud. f. 15956.
—— sublateritius. — [S. 295.] — Vent. mi. 57. f. 1. 2.
—— subliquescens Schum. — [S. 296.] — Fl. dan. X. 1732. 2.
—— subluteus. — [S. 289.]
—— subnotatus. — [S. 303.]
—— subpalmatus. — [S. 284.]
—— subpulverulentus (Trichol.). — Huss. II. 39.
—— subpurpurascens. — [S. 300.]
—— subradiatus. — [S. 308.]
—— subtilis. [S. 297.]
—— subtortus. — [S. 300. 301, 56.]
—— subulatus Schum. = phyllophilus Fl. dan.
—— subumbonatus. — [S. 310.] (Lact.).
—— succineus. — [S. 280.]
—— sudorus. — [S. 282.]
—— sudus. — [S. 275.]
—— suillus. — [S. 302.]
—— sulcatus. — [S. 290*.]
—— sulphureus Bull. — [S. 275.] — Fl. dan. XI. 1910. 1. — Roq. t. 16. f. 6. — Berk. Out. t. 4. f. 4. — Loud. f. 15846. — Kl. 207. — Cortin. [S. 289*.] — Letell. 671. — Vent. mi. 53. f. 8. 9.
—— superbus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 11. (Jungh.). — Lasch: Kl. 710.
—— supinus. — [S. 282.]
—— sylvaticus. — [S. 291.] — ?Vent. mi. 86. f. 1. 2.
—— tabacinus. — [S. 292.]
—— tabidus. — [S. 310.] (Lact.).
—— tabularis. — [S. 303.]
—— Tagetes B. M. — Ann. sc. n. 1860. XIV. t. 11. f. 3. p. 182 (Mont.).
—— tageticolor. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 1.
—— talus. — [S. 300.]
—— tegularis Schum. — [S. 296.] — Fl. dan. XI. 1958. 1.
—— telinolens. — Act. Turin. 11. (1801). t. 2. (Bellardi).
—— temulentus. — [S. 293.]
—— tenacellus P. — [S. 280.] — Fl. dan. XII. 2021. 2. — cf. Ag. conigenus HH.
—— tenax Fr. S. — [S. 293.] — Kl. II. 605.
—— tenellus. — [S. 282.]
—— tener. — [S. 293.] — Loud. f. 15999. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 4. f. 25. (Fructif. Berk.). — Kl. 312.

Agaricus tener Schum. = lacteus Fl. dan.
—— tenerrimus. — [S. 283.] — Berk. Out. t. 6. f. 6.
—— Tentaculum Sow. — Loud. f. 16030.
—— tenuipes (Aman.). — Alger. t. 30, 4.
—— tenuis. — [S. 282.]
—— tephroleucus. — [S. 307.]
—— terginus. — [S. 313.] (Maras.).
—— terreus. [S. 275. 287*.] Kl. 511. — Dsm. III. 342. — Vent. mi. 39. f. 3. 4.
—— terrigenus. — [S. 289.]
—— tessulatus. — [S. 284.]
—— testaceus. — [S. 290.]
—— thejodes Saut. — Kl. 1106.
—— thejogalus Bull. — [S. 309.] (Lact.). — Fl. dan. XI. 1912. 2.
—— tigrinus Bull. — Vent. mi. 65. f. 5—7; 84. f. 5. 6. — Vent. t. 5. f. 45. 46. — Loud. f. 15914. — Kl. 313.
—— Tintinnabulum B. = disseminatus Fl. dan. — [S. 282.]
—— tithymalinus Scop. (Lact.). — [S. 310.] — Loud. f. 15803.
—— titubans Bull. — Loud. f. 16036. — cf. Bolbitius t.
—— tofaceus. — [S. 302.]
—— togularis. — [S. 288.]
—— tomentosus. — [S. 308. 310, 41.] (Lact.) — Linn. 1830. V. t. 6. f. 7. (Jungh.). — Krbh.: [S. 272. 5.]
—— torminosus (Lactar.). — [S. 308.] — Kops Fl. bat. XI. 825. 3. — Vent. mi. 53. f. 3—5; 72. f. 4. — Staude t. 6. f. 5. 6. — Vent. t. 6. f. 53. 54. — Dsm. 1249. — Hrz. t. 11. — Loud. f. 15787. — Phöb. Gift. t. 5. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 21. g—k. (Pollin. Hoffm.). — Kl. 5. — R. f. 1. — Fries Sv. t. 28.
—— —— ?cf. Ag. necator Roq.
—— tornatus. — [S. 277.]
—— torosus. — [S. 288.]
—— torpens. — [S. 296.]
—— torquatus. — [S. 314.] (Maras.).
—— tortilis. — Roq. t. 16. f. 7. 8. — Loud. f. 15817.
—— tortuosus. — [S. 305.]
—— torvus. — [S. 304. 302*.]
—— trachelinus. — [S. 283.]
—— traganus Fr. — [S. 302.] — Vent. t. 9. f. 77. 78. — Vent. mi. 80. f. 3; 88.
—— trechisporus. — [S. 295**.] — Ann. Mg. n. h. 1838. t. 5. f. 53—56. (Fructif. Berk.). — Berk. Out. t. 8. f. 6.
—— tremulus Schff. (Pleurot.). — [S. 285.] — Loud. f. 15933. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 5. (Hoffm.) — cf. Kl. 1605, Nota.
—— trepidus. — [S. 297.]
—— Tricholoma. — [S. 291.]
—— trichopus. — Gaudich. voy. 1826. t. 1.
—— tricolor. — [S. 284.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 1. (Cumino). — (Cortin.) Canar. t. 5 f. 3.
—— tricuspis Scop. = capillaris Fl. dan.
—— triformis. — [S. 304.]
—— tristis P. — [S. 275.] — (Lact.) [S. 309. 34.] — Kl. (507).
—— triumphans. — [S. 300.]
—— trivialis. — [S. 309.] (Lact.).
—— trullaeformis. — [S. 278.]
—— truncatus. — [S. 290.]
—— Tuba. — [S. 278.]
—— Tubae Paul. — Vent. mi. 79. f. 5. 6.
—— tubaeformis Schwz. = Lentinus friabilis Fr.
—— —— Schff.: Ann. sc. n. 1821. I. 23.
—— tuberculatus. — [S. 289.]

Agaricus tuberosus Fr. — [S. 280.] — Brit. f. 129. — Fl. dan. XII. 2022. 1. — Fuck. s. 1122.
—— —— Bull.: Loud. f. 15868. — (Collyb.) R. f. 9. — Kl. 1202; Cent. XV. suppl.
—— —— Schum. = dryophilus var., Fl. dan.
—— tumescens. — Viv. 31.
—— tumidus. — [S. 275.] — Vent. mi. 95. f. 1. 2.
—— turbidus. — [S. 287.]
—— turbinatus Bull. — [S. 300.] — Loud. f. 15965.
—— —— Schum. = pratensis Fl. dan. — Vent. mi. 37. f. 4—6; 87. f. 4. 5.
—— turgidus Grev. (Clit.). — Loud. f. 15821. — (Cortin.) [S. 302.]
—— turmalis. — [S. 300.]
—— turpis (Lact.). — [S. 309.] — Kops Fl. bat. XI. 835.
—— turritus. — [S. 276.]
—— turundus. — [S. 308.]
—— tylicolor. — [S. 281.]
—— Typhae K. — R. f. 306.
—— tyrianthinus. — [S. 277.]
—— udus P. — [S. 296. — Fl. dan. XII. 2020. 1. — Kl. 1003. — (Psiloc.) Kl. II. 601.
—— ulmarius Bull. — [S. 284.] — Loud. f. 15924. (Pleurot.) Bail S. t. 37. — Kl. 1906. — Fries Sv. 37.
—— umbellifer (Omphal.). — [S. 281. — Kl. 1309.
—— —— Bolt. = epiphyllus Fl. dan. — R. f. 203. — Bot. Zt. 1860. t. 14. f. 6. (Hoffm.).
—— —— Bolt.: Wstd. 586. — Krypt. Bad. 160.
—— —— — ericetor. — Brit. f. 11. (pyxid.).
—— umbilicatus Bull. = candicans Fl. dan. — [S. 283.]
—— umbratilis. — [S. 284.]
—— umbrinellus. [S. 286.
—— umbrinus. — [S. 272. 7. — (Cortin.) [S. 300, 32; 304, 127.] — (Lact.) [S. 309.]
—— umbrosus. — [S. 286.]
—— uncinatus. — Vent. mi. 73. f. 1. 2.
—— undatus. — [S. 287.] — Brit. f. 9. — R. f. 403. — [S. 313.] (Maras.).
—— undulatus. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 14. (Jungh.).
—— undulosus J. — Dsm. III. 345.
—— unguentatus. — [S. 274. 57.]
—— unguicularis. — [S. 285.]
—— unguinosus. — [S. 308.]
—— unicolor. — [S. 289.]
—— uraceus. — [S. 305.]
—— uranius. — [S. 282.]
—— urbicus. — [S. 304.]
—— urbus. — [S. 276.] — Fl. dan. XI. 1844. 1.
—— urceolatus. — Viv. 11; 27: v. spadic.
—— urens (Maras.) Bull. — [S. 312.] — Kl. II. 103. — peronatus v. tomentos. Fl. dan.
—— —— Schum. = pergamenus Fl. dan. — Berk. Out. t. 14. f. 3. — R. f. 101.
—— ustalis. — [S. 274.]
—— uvidus. — [S. 309.]
—— vaccinus Schff. (Trichol.). — [S. 275.] — Bisch. f. 3279. — Loud. f. 15764.
—— vaginatus Bull. — [S. 272. 1.] — Fl. dan. XII. 2142. 2. — Kops. Fl. bat. X. 784. — Hrz. t. 14. — Vent. t. 2. f. 15. 16. — Loud. f. 15734. — Berk. Out. t. 3. f. 4. — Cord. Anl. t. H. f. 77: 12—15. — Cord. Ic. V. t. 10. f. 97. (Fructif.). — Kl. 601. — Huss. II. 34. — Viv. 59. — Vent. mi. 10. f. 1—4; 11. f. 5. 6; 58. f. 1. 2.
—— Vahlii. — [S. 288.]
—— Vaillantii. — [S. 313.] (Maras.). — Carol. II. 9.
—— valesiacus. — Kl. 1802.
—— validus. — [S. 272. 8.]
—— vapidus. — [S. 272. 19.]

Agaricus vaporarius. — [S. 273. 28.] — Bot. Zt. 1858. t. 6. f. 6. (Anat. Bonord.).
—— —— Krbh.: Vent. mi. 2. f. 1. 2.
—— variabilis P. — [S. 294.] — Huss. I. 50. — Loud. f. 15931. — Berk. t. 10. f. 1. — Loud. f. 16009. — Lib. 221. — Wstd. 1283.
—— variecolor (Phlegmac.). — Kl. 1701. — (Cortin.) [S. 300.]
—— variegatus. — [S. 275.]
—— varius Schff. — [S. 300. 301, 49.] — Loud. f. 15964. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 24. (Anat. Lamell. Hoffm.).
—— vatricosus. — [S. 291.]
—— vellereus Fr. (Lact.). — [S. 309.] — Loud. f. 15811. — Phöb. Gift. t. 4. f. 3—12. — Bail S. t. 33. — Kl. 9. — Brit. f. 122. — Huss. I. 63.
—— velutinus. — [S. 296.] — Kops Fl. bat. X. 769. — Berk. Out. t. 11. f. 2. — Berk. J. p. 241. f. 60. a. (Fructif.). — Borcz. fg. ingr. t. 1. f. 2. (Hygroph.).
—— velutipes Curt. — [S. 279.] — Huss. I. 56. — Kl. 314. — Wstd. 1087. — Fuck. s. 1124. — Fl. dan. XIII. 2269. 2. — Kops Fl. bat. X. 799. — Loud. f. 15856. — Hoffm. Ic. t. 4. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 31. (Keimg. Hoffm.) — Ann. Mg. n. h. I. 1838. t. 4. f. 16. (Fructif. Berk.). — Dsm. 1804. — Vent. mi. 13. f. 3; 15. f. 4; 81. f. 3—5. — Ital. 37. 87.
—— venetus. — [S. 303.]
—— ventosus. — [S. 283.]
—— venustus. — Alger. t. 30. 3.
—— verecundus. — [S. 288.]
—— vermicularis. — [S. 278.]
—— vernus Bull. — Vent. t. 2. f. 13. 14. — Loud. f. 15731.
—— verrucosus. — transiens in pantherin. Letell. 677.
—— versipellis. — [S. 289.]
—— vervacti. — [S. 293.]
—— vescus (Russ.). — [S. 311. carn. — rub.] — Huss. I. 89.
—— vespertinus. — [S. 301.]
—— veternosus (Russ.). — [S. 311.] — Vent. t. 7. f. 59. 60.
—— vibecinus. — [S. 278.]
—— vibratilis. — [S. 302.]
—— vietus. (Lact.). — [S. 309. 15 u. 34.] — Kl. 1907. — Cord. Ic. V. t. 10. f. 96. (Fructif.). — Kützg. Phil. Bot. 1851. t. 9. f. 1. (Anat.).
—— —— Fr. = acris Fl. dan.
—— vilis. — [S. 287.]
—— villosus. — [S. 289.]
—— vinaceus. — [S. 288*.]
—— vinosus Cd. (Pratell.). — Sturm. h. 19 —. t. 4. (Cd.).
—— violaceo-ater. — Letell. 701.
—— violaceo-cinereus P. — Kl. 701. — (Cortin.) Kl. II. 1.
—— violaceus. — [S. 302.] — Huss. I. 12. — Kops Fl. bat. XI. 844. — Vent. t. 8. f. 74. 75. — Roq. t. 17. f. 1. — Hrz. t. 16. — Loud. f. 15958. — Vent. mi. 83. f. 1. 2; 87. f. 1. 2.
—— violascens. — [S. 308.] (Lact.).
—— virescens Schff. — (Russ.) [S. 310.] — Vent. mi. 55. f. 1. 2. — Vent. t. 7. f. 57. 58.
—— —— P.: Bisch. f. 3325. — (Russ.) Berk. Out. t. 13. f. 6. — Huss. II. 11.
—— virgatus. — [S. 275.]
—— virgineus. — [S. 308.] — Dsm. 1622. 1623. — Fl. dan. XI. 1907. 1.
—— —— Wulf.: Vent. t. 5. f. 36. 37. — Hrz.

Amblyosporium Botrytis. — Fres. t. 12. f. 17—22. p. 99.
Amoeba. — Act. Turin. 1825. 29. t. 1. (Losana). Myxomycetes p. pte.
Ampelomyces quisqualis. — Kl. 1669. 1669 b. (Cent. XIX.). — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 69. f. 4. — huc Oid. Tuckeri.
Amphiblistrum. — [S. 337. 491.]
Amphichorda. — [S. 464.]
Amphiconium. — [S. 524.]
—— petraeum Ns. — Wstd. 699. — Chroolepus aureus.
Amphisphaeria cf. Sphaeria.
Amphisporium. — [S. 460. 515 : 23.]
—— versicolor Ns. — Loud. f. 16550.
Amphitrichum. — [S. 493 ***. 521.]
—— olivaceum. — Cd. Anl. t. B. f. 11 : 1. — Kl. 1678.
Amphiura. — [S. 419 *.]
Angelina. — cf. Hysterium. — [S. 358.]
Angiopoma. — [S. 415.]
—— campanulatum. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. (Lév.). — Cd. Anl. t. F. f. 58 : 5—7. — Pay. b. cr. p. 78. f. 362 u. 364.
Angioridium. — [S. 451.]
—— sinuosum. — Cd. Anl. t. C. f. 28 : 1—4. — Bisch. f. 3623. — Lindl. v. K. p. 29. f. 8. — Kl. II. 761.
Anixia. — [S. 445.]
—— fuscescens. — Sphaerosoma f.
—— truncigena. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 2. (Licea sulphurea).
—— villosa. — [S. 445.]
Anodotrichum carneum. — Sturm. h. 25 —. t. 10. (Preuss.).
Anospira. — [S. 455 *.]
Antennaria. — [S. 407 *. 445.] — cf. Antennularia, Racodium, Torula.
—— cellaris. — Wstd. 195.
—— cytisophila. — [S. 445.]
—— elaeophila. — Dsm. III. 100. — Ital. 790.
—— laevigata. — Cd. Anl. t. F. f. 53 : 1—3. — Pay. b. cr. p. 98. f. 454.
—— pannosa. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 23. f. 1. (Berk.).
—— pinophila. — [S. 505 **.] — Torula fuliginosa Let. — Ital. 791. — Sturm h. 6. t. 10.
—— pityophila. — cf. pinophila. — Ital. 791.
—— Robinsonii. — Hook. Lond. J. II. 1843. t. 23. f. 2. (Berk.). — Berk. J. p. 275. f. 63. c.
—— scoriadea M. — cf. Capnodium mucronat.
—— semiovata. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 18. p. 469. (Bk. B.).
—— Tela. — Kl. 1358.
Antennataria. — [S. 505 **.]
Antennatula. — [S. 407 *.]
Antennina. — [S. 407 *. 445.]
Antennularia. — cf. Racodium.
—— cellaris Rchb. — Bisch. f. 3700.
—— pinophila Rchb. — Bisch. f. 3688.
Anthina. — [S. 465.] — cf. Pterula.
—— aeruginosa. — Fuck. rh. 168.
—— canofusca. — [S. 465.]
—— dichotoma Fr. — Bisch. f. 3779.
—— filaris. — [S. 465.]
—— flammea P. — [S. 465.] — Brit. f. 206. — Bisch. f. 3772. — Berk. Out. t. 21. f. 3.
—— flavo-virens. — [S. 465.]
—— fulva. — [S. 465.]
—— ornithopodioides. — [S. 465.]
—— pallida. — Hedw. I. t. 6. f. 1—11. — Kl. 1773.
Anthina purpurea Fr. — Kl. 270. — Hedw. I. t. 6. f. 12—14.
—— subulata. — Cd. Anl. t. G. f. 71 : 8. 9.
—— umbrina Fr. — Fuck. rh. 167. — cf. Isaria.
Antromyces Copridis. — Fries. t. 4. f. 40—45.
Apiosporium. — [S. 404.]
—— Mali. — Kl. II. 720. — Fuck. s. 493.
—— polymorphum. — Cd. Anl. t. F. f. 54 : 6. 7. — cf. Ap. Salicis.
—— Salicis. — [S. 404.] — Bail S. t. 16.
Aporia. — cf. Hysterium. (Dub. Hyst. 51.).
—— sclerotioides. — Dub. Hyst. t. 2. f. 25.
Apotemnoum. — [S. 484.]
—— maculans. — Bon. t. 2. f. 56. — Sturm h. 13. t. 39.
Apyrenium. — [S. 470.]
—— lignatile Fr. — [S. 470.] — Sturm. h. 34. t. 8. (Strauss).
Arachnion. — [S. 443.]
—— album. — Carol. IV. 75. — Cd. Anl. t. D. f. 41 : 1—6.
Arcyria. — [S. 457.]
—— alutacea Schum. = nutans Fl. dan.
—— anomala de B. = serpula Wigd.
—— carnea Schum. = fusca Fl. dan.
—— cinerea. — [S. 457.] — Fl. dan. XI. 1975. i.
—— —— Fr. : Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 1—5. (de Bary).
—— —— P. : Fuck. s. 270. — Pringsh. Jbrb. III. 1861. t. 3. f. 10—12. (Wigd.). — Purton. I. t. 35. — R. f. 569. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 10—12. (Wigd.).
—— circinans. — [S. 475 : Lach.]
—— cylindrica Schum. — Fl. dan. XII. 2090. 3.
—— decipiens. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 10. f. 3. (Berk.).
—— flava. — Cd. Anl. t. C. f. 31 : 3—4. — Lindl. v. K. p. 29. f. 1.
—— flexuosa. — [S. 457.]
—— fusca Fr. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2090. 2. — Fuck. s. 273.
—— globosa. — [S. 456 : Nass.]
—— incarnata P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2090. 1. — Fuck. s. 272. — Bisch. f. 3663. — Schntzl. t. 14. f. 34. 35. — Kl. 822. (Cent. XVII.). — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 6. (de Bary). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 16. (Keimg. Hoffm.). — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 8. 9. Fructif. Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 8. 9. (Wigd.). — Sturm h. 3. t. 44.
—— leucocephala. — Wstd. 482.
—— nutans. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2017. 1. — Kl. 421.
—— —— DC. : Fuck. s. 269. — R. f. 368. (Trichia Bull.). — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 13—15. (Fructif. Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 13—15. (Wigd.).
—— ochroleuca Fr. — [S. 457.] — Bisch. f. 3692. — Kl. 1546. — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 16. (Capillit. Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 16. (Wigd.). — cf. silacea.
—— punicea P. — [S. 457.] — Voges. 1486. — Wstd. 81. — Cd. Anl. t. C. f. 31 : 1. 2. — Loud. f. 16523. — Kl. 932. — Fuck. s. 271. — Dsm. 1010. — Kl. II. 671. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 15. (Capillit.). — Ztschr. wiss. Zool. 1859. X. t. 8. f. 7—9. (de Bary). — Pringsh. Jhrb. III. 1861. t. 3. f. 6. 7. (Fructif. Wigd.). — Carol. II. 80. — Jungh. pr. t. 2. f. 10. — Ital. 497. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 6. 7. (Wigd.).
—— —— v. vermicularis Fr. — Fl. dan. XII. 2017. 2.

A. Conglomeratus Schw. Syn. Am. bor. p. 178. — Angelina Fries S.V.Sc.

Ascospora Smilacina Dd. & Montg. Fl. Alger. p. 591.
Sub Septoria! — Sylloge pag. 275. —

Ascotricha chartarum. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 8. (Berk.).
Aseimotrichum. — [S. 472**. 503**.]
—— ossium. — Cd. Anl. t. B. f. 12.: 2. — Sturm h. 12. t. 22.
Aseroë. — [S. 435.]
—— actinobola. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 14—18.
—— ceylanica. — [S. 431 †.] — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 18.
—— Junghuhnii S—1.: Schlechtendal de Ascrois genere diss. 1847. c. ic.
—— pentactina Endl. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 12. 13. — Cd. Anl. t. E. f. 49: 3. — Pay. b. cr. p. 118. f. 562. — Lindl. v. K. p. 34. f. 23. — Bail S. t. 24.
Aseroë rubra Lab. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 9—11. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 191. t. 5. A. (Berk.).
—— —— Berk. = actinobola Cd. (S—1.).
—— viridis B. H. — [S. 434 †.] Cd. Ic. VI. t. 4. f. 19. 20. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 5. B.
Aserophallus cruciatus L. M. — Cd. Ic. VI. t. III. f. 49. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 14. f. 1. (Mt.). — Pay. b. cr. p. 118. f. 555.
Aspergillus. — [S. 489.]
—— spec. bei Pityriasis versicolor. Vierordt's Arch. f. physiolog. Heilk. XII. H. 3. p. 496. Ic. (Gudden).
—— in ovis: Presburg. Verh. Verein f. Naturk. 1857. t. 2. (Kolaczek).
—— in abdomine Charadrii: Bull. ac. belg. 1848. XV. 1. p. 491. (Spring.).
—— alternatus. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 11. (Berk.).
—— aurantiacus. — Brit. f. 272. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 22. (Berk.).
—— candidus. — [S. 489.] — Letell. 642. 2. (Monilia).
—— clavatus. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 3. (Dsm.).
—— Curtisii. — Carol. IV. 83.
—— dubius. — Berk. J. p. 298. f. 68. b.
—— ferrugineus. — Fuck. rh. 157.
—— flavus. — [S. 489.] — Bon. t. 9. f. 192.
—— —— Lk.: Bisch. f. 3722.
—— fumigatus. — Fres. t. 10. f. 1—11. p. 81.
—— glaucus. — [S. 489.] — Cd. Ic. V. t. 2. f. 24. — Fuck. s. 184. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 7. 8. — Berk. I. p. 298. f. 68. a. — Pay. b. cr. p. 69. f. 299. — Bisch. f. 3810. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. a. — Bot. Zt. 1854. t. 11. (de Bary). — ? Micr. Journ. 1857. V. t. 7. f. 1—6. (Grove). — Kl. 1571. — Schntzl. t. 12. f. 26. 27. (Mucor Mucedo?) — Brit. f. 208. — Sturm. h. 11. t. 7. — Fres. t. 10. f. 12—16. p. 82 (asc.).
—— griseus. — [S. 489.] — Bon. t. 9. f. 188.
—— incrassatus. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 559. (Spring.).
—— laneus Lk. — ? Phymatotrich. lan.
—— macrosporus. — Bon. t. 9. f. 193.
—— maximus Lk. — Letell. 642. 1. — Bisch. f. 3723.
—— mollis. — [S. 489.]
—— nigrescens. — Robin. v. par. t. 5. f. 2.
—— ovalispermus Lk. — Cd. Ic. II. f. 77.
—— penicillatus Grev. — Sturm. h. 11. f. 6. — Loud. f. 16585. — Müller, Pflanzenstaat. 1860. 265, 7. (Copie).
—— roseus. — Letell. 642. 4. (Acladium).
—— sulphureus. — Dsm. III. 554.
—— virens. — [S. 489.] — Letell. 642. 3. (Monil.).

Asterina. — [S. 370**; 406: Limb.; 564.]
—— Aesculi. — Dsm. III. 425.
—— ? angulata. — Dsm. III. 424.
—— Darwinii. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 164. 2.
—— Epilobii. — Dsm. III. 426.
—— Hederae. — Dsm. III. 774.
—— orbicularis. — Carol. II. 69.
—— pelliculosa. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 164. 1.
—— Pyracanthae. — Dsm. III. 428.
—— spuria. — Carol. IV. 69.
—— stictica. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 164. 4.
—— ? umbonata. — Dsm. III. 427.
—— vagans. — Dsm. III. 422. 423; 775. — cf. Asteroma.
Asteroma. — [S. 407. 421.] — cf. Actinonema, Piggotia, Sphaeria.
—— Aceris D. — Dsm. 743.
—— achaenarum. — Dsm. 1694.
—— Achilleae. — [S. 422.]
—— Angelicae. — [S. 425.]
—— atratum. — [S. 425.] — Kl. II. 153. — Wstd. 681.
—— Betulae Dsm. — Wstd. 168. — Kl. II. 581.
—— —— Rob.: Dsm. 746.
—— Cacaliae. — Dsm. 1698.
—— Calvadosii. — Dsm. 1689.
—— Capreae. — Dsm. 1690.
—— Castaneae D. — Dsm. 744.
—— Cerasi. — Dsm. III. 418.
—— circinans v. Phillyreae. — Dsm. 1688.
—— comptum. — Dsm. 1685.
—— Corni D. — Dsm. 741.
—— Crataegi Fr. = Actinonema Cr. Fr. Su.
—— —— Berk.: Dsm. 498. — [S. 424.] — Brit. f. 42.
—— delicatulum Dsm. — Dsm. 1693. III. 770. 771. — R. f. 363.
—— dendritica Fr. — [S. 425.] — Dsm. 1691. — Fuck. s. 356. — Fuck. rh. 462.
—— elegans. — Dsm. III. 415.
—— Epilobii Fr. — [S. 425.] — Fuck. s. 353. — Fuck. rh. 459.
—— Fraxini D. — Dsm. 486.
—— fugax. — Dsm. III. 420.
—— Fumago. — [S. 425.]
—— ? gallicola. — Dsm. III. 772.
—— geographica D. — [S. 425.] — Dsm. 495.
—— —— Fr.: Fuck. s. 354. — Voges. 1179. (Dothid.). — Wstd. 265. — Fuck. rh. 463.
—— graphoides. — Dsm. III. 416.
—— Himantia. — [S. 425.] — Dsm. 742.
—— —— Fr.: Fuck. s. 358. — Fuck. rh. 460.
—— incomptum. — Dsm. III. 419.
—— inflatum. — Dsm. 1686.
—— Juncaginearum Rbh. — Kl. II. 582.
—— Labes. — Brit. f. 346. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 6. (Berk.).
—— Lonicerae D. — Dsm. 497.
—— Mali D. — Wstd. 267. — Dsm. 499.
—— Malorum. — Brit. f. 332.
—— Mespili. — Dsm. 1684.
—— nervisequia. — [S. 425.]
—— obscurum. — Dsm. 1692.
—— Padi. — [S. 424.] — Lib. 60. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 4. (Berk.).
—— Paeoniae W. — Wstd. 1050.
—— Phyteumae. — Bail S. t. 16.
—— Polygonati DC. — Voges. 658. — Dsm. 740.
—— Populi. — Dsm. 1682. — Wstd. 1122.

Asterina Léveill. Champig. Exotiques pag. 59.

— Epilobii Desmaz. 24e not. p. 13. No 23.

— reticulatum Chev. Fl. Par. p. 447. Tab. 11. f. 27.

Asteroma Prunellae Purt. — [S. 125*.] — Dsm. 496. — Wstd. 169.
—— ? Pyri. — Dsm. III. 421.
—— radiosum Fr. — Kl. 385. — (Actinonema Rosae Fr. Su.). Kl. II. 568.
—— reticulatum. — [S. 125.] — Dsm. 1687. — cf. Combosira). — Fuck. s. 357. — Dsm. 739. — Brit. f. 41. — Wstd. 636. — R. f. 519. — Fuck. rh. 461. 465.
—— ? Robergei D. — Wstd. 150. — Dsm. 500.
—— Rosae. — [S. 421.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 5. (Berk.). — Dsm. III. 773. — Wstd. 116. — Brit. f. 314. — Lib. 61.
—— Salicis Rob. — Dsm. 745. — Wstd. 928.
—— stellare. — Dsm. III. 417.
—— stellatum. — Wstd. 116.
—— subradians. — [S. 425.]
—— Ulmi. — Dsm. 1699. — Wstd. 720. — Loud. f. 16199.
—— vagans D. — [S. 425.] — Dsm. 486. — Dsm. III. 422. 423.
—— —— v. Lilacis. — Dsm. 1695.
—— —— v. Tiliae. — Dsm. 1696.
—— —— v. Frangulae. — Dsm. 1697.
—— venulosum Fr. — Fuck. s. 355.
—— Veronicae D. — Dsm. 180.
—— Veronicarum. — Kl. II. 739. — Fuck. rh. 461.
—— Vincae. — Brit. f. 193.
—— Virgiliae. — Dsm. 1683.
—— Xylostei. — [S. 425.]
Asterophora. — [S. 446. 497**.] (cf. Nyctalis et Asterotrichum.) — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.) (cf. Bot. Zt. 1862. p. 287.).
—— agaricicola. — [S. 497. 1!] — Fuck. rh. 159.
—— agaricoides Fr. — [S. 446**.] — Bisch. f. 3690. — Kl. II. 235. — Brit. f. 199.
—— lycoperdoides. — [S. 446.] — Cd. Ic. VI. f. 5. — Bon. t. 11. f. 224. — Sturm h. 2. t. 26.
—— —— Fr.: Nyctalidis asterophorae Fr. forma: de Bary; Bot. Zt. 1859. p. 389.
—— nauseosa. — Borcz. fg. ingr. 1857. t. 6.
—— Pezizae. — Cd. Ic. VI. f. 6. — (= Stephanoma strigosum Wllr.) — Fuck. rh. 160. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 2.
—— physaroides Fr. — Bisch. f. 3691. — Bon. t. 11. f. 225. — = Nyctalidis asterophorae Fr. forma: de Bary, Bot. Zt. 1859. p. 388. t. 13. f. 1—3.
—— trichioides. — [S. 446.]
Asterosporium. — [S. 508.] — Fres. t. 5. f. 10—13.
—— Hoffmanni. — [S. 508.] — Fuck. s. 132. —
—— ——́ Kz.: Krypt. Bad. 325. — Micr. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. (Currey). — Kl. 778. (Stilb. macr.). — Kl. II. 594 (Stilbospora ast. Rbh.). — Voges. 669. — Wstd. 576. — Fuck. rh. 81. — R. f. 584.
Asterothecium strigosum Wllr. = Asterophora Pezizae Cd.
Asterotrichum. — [S. 460. 484.]
—— Ditmari. Bon. — cf. Asterophora agaricicola Cd. [S. 497. 1!]
Athelia. — [S. 334. 496**. 521.] — cf. Thelephora.
—— citrina. — Letell. 630. 4.
—— coerulea. — Wstd. 767.
—— epiphylla. — zu Cortic. arachnoid. (Berk.).
—— laevis. — Letell. 630. (Himantia Fr.).
—— Typhae. — Ital. 442. (Theleph.).
Atractium. — [S. 469**.]
—— aurantiacum. — Bon. t. 11. f. 226.

Asteroma flammeum. — Carol. V. 86. (minus).
—— pallidum. — Bon. t. 10. f. 219.
—— rigidum Bon. — R. f. 581. (c. ic.).
Atractobolus. — [S. 439*. cocci sp.; 524.]
—— ubiquitarius Tode. — Loud. f. 16347. — Cord. Anl. t. D. f. 44: 1—7. (ova insector., Tul.). — cf. Pez. annularis.
Auerswaldia. — cf. Sphaeria lagen.
Aulacographum Dur. — cf. Aylographum Dub. Hyst. 37.).
Auricularia. (cf. Thelephora). — [S. 333.]
—— aurantiaca Schum. = Theleph. hirsuta Fl. dan.
—— caryophyllea Sow. — Wstd. 587. 765.
—— corrugata Sow. — Wstd. 693.
—— cucullata. — [S. 333*.]
—— ferruginea Bull. — Wstd. 1289.
—— Judae Whlb. — Wstd. 760.
—— lobata Fr. — [S. 333.] (cf. Exidia lob. Som.). — Berk. Out. t. 18. f. 1.
—— mesenterica P. — [S. 333.] — Dsm. 848. — Kl. 45. — Fuck. s. 915. — Huss. II. 6. — Wstd. 693. — Ital. 147.
—— minuta. — [S. 333*.]
—— ochroleuca Horn. = Theleph. ochr. Fl. dan.
—— ornata. — Gaudich. voy. 1826. t. 2.
—— pallida Schum. = Thel. ochroleuca Fl. dan.
—— papyrina Bull. = Thel. ochroleuca.
—— petaloides. — Vent. mi. 97. f. 7.
—— phosphorea Sow. — Wstd. 767.
—— pulverulenta. — Merul. destr. (Tul.).
—— reflexa. — Wstd. 766.
—— —— v. amethystea. — Wstd. 431. 1290: variegata.
—— reticulata. — [S. 325**.]
—— Sambuci P. — Wstd. 760.
—— tremelloides Bull. — Wstd. 693.
Aylographum Lib. — [S. 406*.] = Aulacographum Dub. Hyst. 37.
—— Epilobii. — Lib. 273.
—— Festucae. — Lib. 373.
—— filicinum. — Lib. 275.
—— Hederae. — Lib. 272. — Wstd. 178. (Kl. II. 528. Hysterium micrographum Not.) = Ayl. vagum Dsm.: Dub. Hyst. 38.
—— hieroglyphicum. — Dsm. III. 558.
—— juncinum. — Lib. 274. — Dub. Hyst. t. 2. f. 20.
—— Luzulae. — Lib. 372.
—— maculare B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 21. p. 451.
—— Pinorum D. — Dsm. 294. — R. f. 266. — Ital. 346.
—— vagum D. — Kl. II. 55. — Wstd. 178. — Dsm. 1029. (cf. Hederae) u. III. 559.
Azosma helminthospor. — [S. 499.] — Cd. Anl. t. B. f. 10: 2. — Sturm h. 12. t. 18.
—— Punctum. — Dsm. III. 757.
Azygites. — [S. 488.]

Bacillaria. — [S. 382**.]
Bactridium. — [S. 474.]
—— album Bon. — R. f. 473. (cf. Mastigospor. alb. Rs.).
—— candidum. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 5. — Pay. b. cr. p. 73. f. 327. — Bon. t. 2. f. 47, Mitte.
—— carneum. — Bon. t. 2. f. 47, unten.
—— flavum. — [S. 474.] — Brit. f. 326. — Bon. t. 2. f. 47, oben.
—— —— Kz.: R. f. 372.
—— Helvellae. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 3. (Brk. Br.).

Badhamia. — cf. Physarum. Linn. Trans. IV. 24. (Berk.). — Berk. Out. t. 1. f. 6.
—— hyalina. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 3. (Berk.).
—— nitens. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 1. p. 154. (Berk.).
—— pallida. — Linn. Trans. 1851. XXI. t. 19. f. 2. (Berk.).
Balanium. — [S. 504*.]
Balsamia. — [S. 438.]
—— fragiformis. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 3.
—— platyspora. — Tul. F. hyp. t. 15. f. 2.
—— vulgaris Vitt. — Vitt. t. 1, 2. — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 99. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 12—15. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 4; t. 15. f. 1; t. 19. f. 6. — Bail S. t. 13. — Kl. 1963. — Kl. II. 246.
Basidiolum fimbriatum. — Bot. Zt. 1861. p. 173. t. 7. f. 30—39. (Cienk.).
Battarea. — [S. 440.]
—— Gaudichaudii. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 4. — Cd. Anl. t. E. f. 50: 4—6. — Schntzl. t. 14. f. 50. 51.
—— phalloides. — Cd. Anl. t. E. f. 50: 1—3. — Berk. J. p. 8. f. 5. a. b. (Anat.). — Hook. J. 1843. II. t. 22. f. 1. (Anat. Berk.). — Loud. f. 16338. — Bisch. f. 3463.
Belonidium aeruginosum. — Alger. t. 28. 8.
Bercleasmium Cd. — cf. Sporidesmium concinnum, Cd. Ic. VI. p. 19.
Bertia. — [S. 395.] — cf. Sphaeria.
Bilimbiospora Doliolum P. Awd. — R. f. 261.
Bispora dicoccum. — Kl. 1688.
—— Menzelii. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 6: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 69. f. 301.
—— monilioides. — Fuck. rh. 74. — Fres. t. 6. f. 46—54. — Fuck. s. 136. — Voges. 1350.
—— —— v. condensata Cd. — Kl. 1077.
Blastotrichum. — [S. 493*.]
—— confervoides. — [S. 493*.] — Pay. b. cr. p. 73. f. 325.
—— puccinioides. — Sturm. h. 25—. t. 11. (Preuss.).
Blennoria. — cf. Trullula. — [S. 475.]
—— Abietis. — Kl. 1875. — Tharand. Jahrb. 1853. p. 114. c. ic. (Stein).
—— Buxi Fr. — Voges. 882. — Dsm. 239. — Wstd. 751.
Bloxamia truncata. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 468. t. 16. f. 17. (B. B.). — Berk. In. p. 327. f. 74. b. — R. f. 168.
Bolacotrichia grisea. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 97. t. 5. f. 4. (B. B.).
Bolbitius (cf. Agaricus).
—— flavidus. — [S. 299.]
—— fragilis. — [S. 299.]
—— luteolus. — [S. 299.]
—— mitriformis. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 186. t. VI. B.
—— pusillus. — Borcz. fg. ingr. t. 1. f. 1.
—— tener. — Berk. Out. t. 12. f. 2.
—— titubans Fr. — [S. 299.] — Bisch. f. 3250. — Bail S. t. 34.
—— vitellinus. — [S. 299.]
Boletus. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.). — Rostk. ap. Sturm h. 21—24; t. 1—48. — [Su. 315.]
—— abietinus. — Purton. I. t. 13.
—— aeneus. — [S. 317, 30.] — Roq. t. 3. (u. 1. f. 1.?). — Rost. apud Sturm t. 37, = edulis Fr.
—— aestivalis. — [S. 317.] — Huss. II. 25. — Fries Sv. t. 43.
—— albidus. — Roq. t. 8. f. 2.
Boletus alutarius Fr. — [S. 318.] — Krbh. t. 74. f. 8. 9. (ex Berk.).
—— —— Rostk.: [S. 318: 46.]
—— appendiculatus. — [S. 317.]
—— artemidorus Lz. — Hrz. t. 13.
—— asprellus. — [S. 318.]
—— aurantiacus (cf. scaber). — Roq. t. 9. f. 2. 3. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 82. (Fruct.).
—— aurantius. — [S. 318. 45.]
—— auriformis Bolt. — Wstd. 766.
—— badius. — [S. 316.] — Kops Fl. bat. XI. 804. — Bail S. t. 31.
—— bovinus L. — [S. 316.] — Huss. I. 34. — Hrz. t. 76. — Kl. 37. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 85. (Fruct.).
—— —— Rostk.: = mitis. — [S. 316.] — Ital. 332.
—— brachyporus. — [S. 316: 17.] — Letell. 606. — Rostk. t. 11. = B. Sistotrema Fr. Su.
—— buxeus. — [S. 317: 31. b.] — Rostk. t. 30. = B. Obsonium Fr. Su.
—— calopus. — [S. 316: 19; 317.] — Hrz. t. 69. — Vent. mi. 67. f. 1—4; 74. f. 1. 2.
—— carnosus. — [S. 316. 9: rut. v.] — Rostk. t. 14 = rutilus Fr. Su.
—— carpineus Sow. = Polypor. adustus Fr.
—— castaneus Bull. — [S. 318.] — Huss. II. 17. Fl. dan. X. 1792.
—— —— v. badius Fr. — Kl. 108.
—— cellulosus Fl. dan. = Polyp. vulgaris Fr.
—— chioneus. — [S. 318. 45.]
—— chrysenteron. — [S. 316.] — Roq. t. 8. f. 3. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 27. (Fructif. Lév.).
—— cinnamomeus. — [S. 316. 13. b.]
—— collinitus. — [S. 316.]
—— concentricus Schum. = Polypor. adustus Fl. dan.
—— concretus. — Alger. t. 32. 3.
—— coriaceus. — Wstd. 97.
—— crinitus Spr.: = Polypor. hydnoides Fr.
—— crocipodius. — Letell. 666.
—— cyanescens Bull. — [S. 318.] — Letell. 654. — Kops Fl. bat. X. 770. — cf. Bol. sphaerocephalus Barla. — Hrz. t. 71. — Roq. t. 8. f. 1. — Loud. f. 16110.
—— dentatus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 25 = subtomentos. Fr. Su.
—— dictyopus. — [S. 317. 37.] — Rostk. t. 33 = sordarius Fr. Su.
—— dimidiatus. — Thunb. Fl. jap. t. 39.
—— dulcis. — Letell. 614.
—— edulis Bull. — [S. 317.] — Badham. t. 3. — Kops Fl. bat. X. 739. — Berk. Out. t. 15. f. 6. — Vent. t. 10. f. 87—90. — Bisch. f. 3255. 3150. — Roq. t. 4. f. 2; t. 5. — Hrz. t. 40. 41. — Fries Sv. t. 13. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 2. f. 14. — Kl. 618. — Kl. II. 302. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 26. (Fructif. Lév.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 92—94. (Spor. Phöb.). — Rostk. t. 36 = reticulatus Fr. Su.
—— —— ? cf. Bol. esculentus Pay.
—— —— Rostk.: [S. 317. 32*.] — Huss. I. 81. — Viv. 25. — Vent. mi. 14. f. 1—3; t. 22. — Staude t. 3. f. 3.
—— elegans. [S. 316.] — Huss. II. 12.
—— elephantinus. — Huss. II. 2.
—— eriophorus. — [S. 316: 20. 21.] — Rostk. t. 20 = subtomentosus Fr. Su.
—— erythropus P. — [S. 317.] — cf. lurid. — Bisch. f. 3143. (? luridi var.). — Phöb. Gift. t. 8. — Hrz. t. 56. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 9. (Fructif. Lév.).

Baggea Auersw. nov. Gen. (Hysteriaceae) Hedwigia No 1. 1866.
Bull. Soc. Bot. XIII. p. 170. —

Battarea Phalloides Cd. — Roemer Fl. Eur.
Fasc. 9. —

Bloxamia truncata B. Br. (Pyrenomycet.?) not. brit. 783.
— Tetraploa Berk + Br. in Sched. ...
Genus affin. Dichosporii Myxogast. ex Berk.



Boletus esculentus P. — Loud. f. 16108. — Pay. b. cr. p. 117. f. 546.
—— felleus Bull. — [S. 318.] — Kops Fl. bat. X, 740. 2.
—— ferrugineus B. = piperatus Fl. dan.
—— firmus Spr. — Wstd. 1287.
—— flabelliformis Scop. = Polypor. lucidus Fr.
—— Flabellum. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 18. f. 1.
—— flavidus. — [S. 313. 3.] — Vent. mi. 97. f. 1—3. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 86. (Fructif.). — Kl. 1113. — Rostk.: [S. 316: 2; zu collinitus, Fr. 1861.]
—— flavus. — [S. 316*.]
—— floccopus. — cf. strobiloides. — [S. 317.]
—— —— Rostk.: [S. 318. 44.] versipellis Fr. Su.
—— fuligineus. — [S. 317; 318: 44 u. 45.]
—— fulvidus. — [S. 318.]
—— fumosus P. — Wstd. 997.
—— fuscus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 12 = subtomentos. Fr. Su.
—— granulatus. — [S. 316.] — Letell. 604. — Schntzl. t. 16. f. 26. 27. — Vent. mi. 31. f. 1. 2; 69. f. 4. 5; 78. f. 1. — Ital. 290.
—— guttatus. — [S. 316. 13.]
—— holopus. — [S. 318. 45.] — Rostk. t. 48 = scaber v. chionaeus Fr. Su.
—— hydnatinus Bosc. — Berl. Mag. II. p. 2. t. 4. f. 2. 3.
—— imberbis. — cf. Tramet. gibbosa.
—— imbricatus. — Wstd. 146.
—— impolitus Fr. — [S. 317*.] — Krbh. t. 71. f. 10. 11. (ex Berk.); = sapidus Hrz. — Vent. mi. 99. f. 1. 2. — Fries Sv. t. 42.
—— incarnatus Schum. = Polypor. abietinus Fl. dan.
—— infundibuliformis. — Wstd. 429.
—— irideus. — [S. 317. 30.] — Rostk. t. 15 = aeneus Fr. Su.
—— lacteus. — Ann. sc. n. 1848. XIX. t. 9. (Lév.).
—— lanatus. — [S. 316. 20.] — Rost. t. 21 = subtomentosus Fr. Su.
—— laricinus. — [S. 316.] — Huss. I. 25.
—— lilaceus. — [S. 316**.]
—— lividus Bull. — [S. 316: 15***.] — Kl. 227.
—— lupinus. — [S. 317.]
—— luridiformis. — [S. 317. 36.]
—— luridus Schff. — [S. 317.] — Badham. t. 7, 2. Huss. II. 26; 35. — Fl. dan. XI. 1962. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 39. (Fructif. Berk.). Phöb. Gift. t. 7; t. 8: 1. 2. — Loud. f. 16107. — Kl. 1406. — Berk. Out. t. 15. f. 5. — ? cf. Bol. perniciosus Roq. — Letell. 678.
—— —— erythropus Schff. — Letell. 612. (erythrop.).
—— —— β.: Huss. I. 7. — Viv. 40. — Fries Sv. t. 12.
—— luteus L. — [S. 315.] — Vent. mi. 97. f. 5. 6. — Loud. f. 16103. — Bisch. f. 3459. — Hrz. t. 6. — Kl. II. 615.
—— macroporus. — [S. 316. 13. b.] — Rostk. t. 13 = guttatus Fr. Su.
—— marmoreus. — Roq. t. 6.
—— medulla panis. — Wstd. 1287.
—— mesentericus Schff. = Polyp. giganteus Fl. dan.
—— Meyeri. — [S. 317.]
—— mitis. — [S. 316.]
—— nigrescens. — [S. 318. 45.]
—— obliquatus Bull. = Polyp. lucidus Fr.
—— Obsonium. — [S. 317.]
—— olivaceus. — [S. 317.]


Boletus Ostrea. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 15. f. 2.
—— pachypus. — [S. 317*. 27.] — Letell. 641. — Huss. I. 22.
—— pannosus. — [S. 316. 20.] — Rostk. t. 22 = subtomentos. Fr. Su.
—— parasiticus. — [S. 316.] — Berk. Out. t. 15. f. 4.
—— pascuus P. — Krbh. t. 76. — Sturm. h. 19. — t. 1. (Cd.).
—— pelleporus Bull. = Polypor. adustus Fr.
—— perennis. — Wstd. 429.
—— perniciosus. — Roq. t. 7. f. 1—3.
—— picrodes. — [S. 317. 26.] — Kl. 1713. — Rostk. t. 24 = pachypus Fr. Su.
—— piperatus Bull. — [S. 316.] — Fl. dan. XI. 1850. 2. — Bisch. f. 3129. — Loud. f. 16105. — Roq. t. 7. f. 4. — Sturm h. 14. t. 60.
—— Placenta Schum. = Polypor. zonatus Fl. dan.
—— porphyrosporus. — [S. 317. 311*.]
—— Preauxii. — Canar. t. 4. f. 1.
—— pruinatus. — [S. 316.]
—— pruinosus Fr. — cf. B. rubropruinosus Barla.
—— pubescens Schum. = Polypor. p. Fl. dan.
—— pulverulentus Opat. — [S. 316. 22.] — Kl. 226. — zu radicans Fr. Su. 316.
—— purpurascens. — [S. 316: 18.] — Rostk. t. 8 = pruinatus Fr. Su.
—— purpureus. — [S. 317.] — Fries Sv. t. 41.
—— radicans. [S. 316.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 84. (Fructif.). — Rostk. t. 20 = ? appendicul.
—— —— Rostk.: [S. 317. 23.]; Fr. Ep. 416.
—— regius Kz. — [S. 317.] — Vent. t. 10. f. 99. 100.
—— reticulatus. — [S. 317.]
—— Ribis Schum. = Polypor. R., Fl. dan.
—— rimosus. — Vent. t. 10. f. 93. 94.
—— romanus. — Badham. t. 15, 2.
—— rubeolaris Bull. = luridus Fl. dan.
—— rubescens. — [S. 316.]
—— rubiginosus. — [S. 317.]
—— rubro-pruinosus. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 18. (= pruinosus Fr.).
—— rufus. — [S. 318. 41.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 83. (Fructif.).
—— rutilus. — [S. 316.]
—— salicinus Sow. — Wstd. 997.
—— sanguifluus. — Vent. mi. 98. f. 3—5.
—— sanguineus. — [S. 316.]
—— —— rhodoxanthus Krbh. = purpureus Fr. (Rbh.).
—— sapidus. — [S. 317. 32.] — Hrz. t. 51. (= impolitus Fr. Su. 317.).
—— Satanas. — Vent. mi. 40. f. 1; 78. f. 3. 4. — Kl. 1712. — ? cf. B. luridus Phöb., marmoreus Roq. — Rostk. t. 31 = luridus Fr. Su.
—— —— Rostk.: [S. 317. 36.]
—— scaber Fr. — [S. 318.] — Badham. t. 7, 1. — Huss. I. 57. — Kops Fl. bat. X. 740. 1. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 40. 41. (Spor. Berk.). — Loud. f. 16109. — Vent. t. 10. f. 91. 92. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 5—12. — Hrz. t. 2. — Fr. Sv. t. 14. — Roq. t. 9. f. 1. 2. u. t. 4. f. 1.
—— —— Bull.: Kl. 514. — Vent. mi. 30. f. 3. 4; 46; 47; 98. — Staude t. 3. f. 2.
—— —— aurantiacus Bull. — Hrz. t. 25.
—— scobinaceus. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino).
—— sericeus. — Krombh. t. 76.
—— Sistotrema. — [S. 316. 17. u. 16.] — Rostk. t. 19 = rubescens Fr. Su.
—— sordarius. — [S. 317.]

Boletus spadiceus. — [S. 316.] — Sturm h. 23. t. 29. (hier.).
—— sphaerocephalus. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 17. (Barla) = cyaneus Bull.
—— spumeus Sow. — Fl. dan. X. 1791.
—— squalidus. — [S. 316.]
—— squamulosus. — [S. 317. 31.] — Rostk. t. 17 = vaccinus Fr. Su.
—— Sterbeeckii. — [S. 317**.] — Bull. ac. belg. 1812. IX. 2. t. 2.
—— strobilaceus. — [S. 317.] — Vent. mi. 50. f. 3. 4.
—— strobiloides Krbh. = floccopus Vahl.? = strobilaceus Fr. Ep.
—— suberosus B. = Polypor. adustus Fr.; Fl. dan. — [S. 320. 53.]
—— subtomentosus L. — [S. 316: 20, 19.] — Sturm h. 22. t. 20. (erio.). — Bisch. f. 3327. — Hrz. t. 31. — Loud. f. 16106. — Kl. 39. — Huss. I. 5. — Viv. 27. — Rostk. t. 23 = chrysent. Fr. Su.
—— sulfureus. — [S. 316.]
—— suspectus Krbh. — cf. impolitus.
—— —— tessellatus. — [S. 317. 26.] — Rostk. t. 32 = olivaceus Fr. Fu.
—— tuberosus Schum. = luridus Fl. dan.
—— unicolor Bull. = Daedalea un. Fl. dan. — Wstd. 1285.
—— vaccinus. — [S. 317.]
—— variegatus Sw. — [S. 313; 13.] — Hrz. t. 15. — Kl. 38.
—— versicolor. — [S. 316. 19.] — Wstd. 146. — Rostk. t. 10 = chrysenteron Fr. Su.
—— versipellis. — [S. 318.]
—— vinosus. — Vent. mi. 71. f. 4. 5.
—— viscidus. — [S. 317.]
Bombardia (cf. Sphaeria).
—— fasciculata (cf. Sphaeria f.). — Kl. 1559. — [S. 389.] — Krypt. Bad. 52.
Bostrichonema alpestre Ces. — Ital. 149.
Botryochaete faginea. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 95.
Botryocladium delectatum Preuss. — Sturm. h. 36. t. 5.
Botryosphaeria. — cf. Sphaeria.
Botryosporium. — [S. 490**. 507.]
—— diffusum. — Bon. t. 7. f. 158. — Sturm h. 11. t. 5.
—— elegans. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 6—9.
—— hamatum. — Bon. t. 7. f. 157.
—— pulchrum. — Pay. b. cr. p. 101. f. 475. — Kl. 1366. (Cent. XV.).
Botrytis. — [S. 490. 492.] — cf. Peronospora, Spicularia, Polyactis, Stachylidium, Trichosporium.. — Flora 1847. no. 1. f. 11. (Fresen.).
—— —— auf Pollen: C. Müller, Pflanzenwelt. 1857. p. 63. (Karsten). — C. Müller, Pflanzenstaat. 1860. p. 265. 3. (Copie).
—— acinorum. — Fres. t. 2. f. 15—22.
—— aclada. Fres. t. 2. f. 23—24.
—— aeruginosa Schum. — Fl. dan. XIII. 2278. 3.
—— agaricina Lk. (Verticill.). — Loud. f. 16579. — Sturm h. 4. t. 51.
—— aggerifera. — Letell. 662. 3. (Bassiana?).
—— allochroa Lk. — Bisch. f. 3751.
—— arborescens. — Journ. hortic. soc. 1846. I. t. 4. f. 24. (Berk.).
—— Arenariae. — Journ. hortic. soc. 1846. I. t. 4. f. 22. p. 31. (Berk.). — Wstd. 1298.
—— Bassiana Bals. — [S. 490. 3.] — Robin v. par. t. 6. f. 5—7. — Berlin. entomol. Ztschr. 1858. t. 2. f. 7; t. 3. f. 12; t. 6. f. 29. 30. (Lebert.). — Kl. 1082. — Kl. II. 177. — Journ. hortic. soc. 1846. I. p. 32. (Berk.). — Ital. 792.
Botrytis bicolor Lk. — [S. 490.] — Bisch. f. 3752. — Bon. t. 6. f. 142.
—— brunneola. — Kl. II. 771.
—— cana K. — cf. Polyactis c. — Wstd. 438. [S. 490.]
—— capitata. — ? Letell. 697. 4.
—— carnea Schum. — [S. 491.] — Fl. dan. XIII. 2278. 1. — Fuck. rh. 146.
—— cinerea P. — [S. 491. 493.] — Fl. dan. XIII. 2278. 2. — dazu Polyactis sclerotiophila Kl. ex Cesat. — Kl. 72. — Dsm. 225. — Fuck. rh. 148.
—— cinereo-virens. — Bon. t. 6. f. 144.
—— cinnabarina. — [S. 491.]
—— citrina. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 12. (Berk.).
—— crustosa Fr. = Peronosp. macrospora Casp. — Brit. f. 333. — Letell. 697. 1.
—— curta. — Brit. f. 209. — Lindl. v. K. p. 33. f. 21. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 13. (Berk.). — Berk. In. p. 245. f. 61. d. — Berk. Out. t. 1. f. 7. b.
—— densa. — [S. 493.] — Sturm h. 4. t. 52.
—— destructor. — Brit. f. 345. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 13. f. 23. (Berk.).
—— didyma. — [S. 492.]
—— diffusa A. — Loud. f. 16578.
—— effusa. — Brit. f. 53; 335.
—— —— Dsm.: Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 1. f. 1.
—— —— Grev.: Dsm. 1091.
—— elegans. — [S. 490.] — Bon. t. 6. f. 141. — Schacht, Zuckerrübe. 1863. f. 11. 12.
—— elongata. — [S. 491.]
—— epigaea Lk. — cf. Polyatis ep. — Fuck. rh. 147.
—— erythropus c. Sclerotio: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 5. (Lév.). — Pay. b. cr. p. 6. f. 16.
—— fallax Dsm. = Peronosp. Solani. — Wstd. 1198.
—— farinosa Fr. — Brit. f. 335. — Kl. 264. — = Peronosp. effusa Rbh. — Wstd. 439.
—— farinulenta. — Letell. 662. 4.
—— fulva. — cf. Polyactis.
—— furcata. — Fres. t. 2. f. 8—11.
—— ganglioniformis Bk. — cf. Peronospora. — (S. 493. 3.) — Journ. hortic. soc. 1846. I. t. 4. f. 25. (Berk.).
—— geminata. — Bot. Zt. 1847. t. 4. f. 9. = Peronosp. ganglion.?
—— geophila. — cf. Polyactis geoph.
—— gigantea. — Letell. 709. 1.
—— grisea Fr. — [S. 491. 493.] — Bisch. f. 3731. — Letell. 709. 4.
—— Haplaria. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 1.
—— infestans. — Wstd. 1198. — Regel's Gartenflora. 1854. t. 87. f. 5—10. — Kl. 1879. — cf. Peronosp. Solani.
—— interrupta. — Fres. t. 2. f. 12—14. — ? Kl. II. 771.
—— Jonesii. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 12. p. 462. (B. B.).
—— isabellina. — Kl. 1570.
—— lateritia. — [S. 491.] — Brit. f. 98.
—— laxa. — [S. 491.] — Letell. 697. 3.
—— leucospora. — [S. 490.]
—— macrocarpa. — Ung. Ex. t. 2. f. 13. B. — cf. Monosporium macr.
—— macrospora. — [S. 491**. 3.] — Wstd. 1297. — Sturm h. 4. t. 50.
—— murina Lk. — cf. Sporotrichum murin. — Sturm h. 3. t. 36.

Peronospora infestans Casp. in Duchart. Elem. Botanique
fig. 862 et Icon. Sylland. n° 490 A. =



Botrytis nivea. — Ung. Ex. t. 2. f. 14. — Schntzl. t. 12. f. 29.
—— nutans. — Pay. b. cr. p. 60. f. 247.
—— ochracea. — Letell. 709. 2.
—— olivacea. — Letell. 662. 2.
—— olivaceo-lutea. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 1. f. 2. (Dsm.).
—— ovulifera. — [S. 491.]
—— pallida. — Carol. V. 91.
—— parasitica Cd. (cf. Peronosp. p.). — Cd. Ic. V. t. 2. f. 18. — Bisch. f. 3743. — Kützing Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 10. — Berk. In. p. 82. f. 23. — Kl. 183. — Wstd. 410. — Dsm. 1093 — Bon. t. 5. f. 124. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 8. (Keimg. Hoffm.). — cf. nivea. — Dsm. III. 159. — (Lactucae) Brit. f. 331. — Letell. 697. 2. — Journ. hortic. soc. 1846. I. t. 4. f. 26. (Berk.).
—— plebeja. — Fres. t. 2. f. 1—7.
—— Polyactis Lk. — Wstd. 196. — Dsm. 68.
—— polysperma. — Kützing Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 11.
—— polyspora. — Schntzl. t. 12. f. 24. 25. — Sturm h. 3. t. 35.
—— pulla. — [S. 491.]
—— Pulvinulus. — Kl. 1881.
—— reptans. — Bon. t. 6. f. 146.
—— rhodospora. — Bon. t. 6. f. 129.
—— rufa. — [S. 491.]
—— simplex monilis A. S. — zu Erysiphe Graminis (Tul. Sel. I. 212.).
—— Solani (cf. infestans; — Peronosp. S.) — Kl. 1879.
—— sonchicola. — Kl. 1775.
—— spongiosa? — cf. Scorias sp.
—— tenera. — [S. 491.]
—— tenuissima. — [S. 493. 2.]
—— terrestris. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 14. f. 24. (Berk.).
—— Tilletei D. — Dsm. 226
—— umbellata. — [S. 490.]
—— umbrina. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 9. (Bonord.).
—— vastatrix Lib. — Wstd. 1198. (ed. 1857.).
—— velutina. — Bon. t. 6. f. 143.
—— vera. — [S. 490.] — Letell. 709. 3. (Spicularia gemina P.).
—— verticilloides. — Flora. 1847. no. 1. f. 10. (Fres.).
—— Viciae. — Journ. hortic. soc. 1846. I. t. 4. f. 23. (Berk.).
—— violacea. — Wstd. 1199.
—— virella. — [S. 491.]
—— viticola. — Carol. V. 90.
—— vulgaris Fr. — [S. 490.] — Wstd. 196. — Bisch. f. 3740. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 91. f. d. — Pringsh. Jahrb. II. t. 30. f. 26. (Hoffm.).
Bovista. — [S. 442.]
—— ammophila. — Ann. sc. n. 1848. IX. t. 9. f. 5. 6. (Lév.).
—— caelata. (cf. Lycoperd.). — Berg, Charakterist. 1860. t. 1. f. 3.
—— craniifera. — [S. 442: calv.].
—— favosa Rostk. — Sturm h. 18. t. 3.
—— furfuracea P. — Wstd. 1261.
—— gigantea Grev. — Huss. I. 26. — Loud. f. 16512. — Sturm h. 18. t. 10.
—— miniata Dillen. — Wstd. 741.
—— nigrescens P. — [S. 442.] — Loud. f. 16511. — Kl. 1410. — Berk. Out. t. 20. f. 5. — Carol. V. 81. — Sturm h. 18. t. 15.
—— officinarum Dill. — Sturm h. 18. t. 1.
—— plumbea P. — [S. 442.] — Cd. Ic. V. t. 6. f. 47. — Ann. Mg. n. h. 1840. IV. t. 5. f. 15—18. (Fructif. Berk.). — Cd. Anl. t. C. f. 36: 3—6; t. H. f. 78: 10. 11. — Berk. Out. t. 20. f. 6. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. (Fructif. Berk.). — Pay. b. cr. p. 7. f. 20. (Anat.). — Kl. 27. — Kl. II. 143. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 20. (Keimg. Hoffm.). — Wstd. 1261. — Sturm h. 18. t. 16.
Bovista pusilla Rostk. — Sturm h. 18. t. 4.
—— suberosa. — [S. 443 **.] — Sturm h. 18. t. 2.
—— tunicata. — [S. 442.]
Brachycarphium = Brachyclad. Thomasin. (Berk.).
Brachycladium. — [S. 504.]
—— penicillatum. — [S. 501.] — Dsm. III. 413. — Wstd. 591. zu Sphaeria Papaveris (ex Tul. Sel. 43). — R. f. 380 (Dendryph. Fr.). — Pay. b. cr. p. 74. f. 334. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 92. f. f—h. — Kl. 1367. (Dendryph. pen.).
—— Thomasinum. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 11. f. 2. (Berk.).
Bremia Lactucae. — cf. Peronospora ganglionif.
Briarea. — [S. 489 †.]
—— aurea. — Fuck. rh. 141.
—— elegans. — Cd. Anl. t. C. f. 21: 5. 6. — Pay. b. cr. p. 69. f. 298. — Sturm h. 11. t. 6. (Penicill. sparsum Lk.).
—— orbicula. — Cd. Ic. III. f. 34.
Broomeia. — [S. 440.]
—— congregata. — Pay. b. cr. p. 112. f. 514. — Hook. Lond. J. 1844. III. p. 193. t. VI. A.
Bryochista. — [S. 478.]
Bryocladium. — [S. 406. 503*.]
Bryomyces. — [S. 506.]
—— elegans. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 55. (Miquel). — Kops Fl. bat. VIII. 619.
—— Orthotrichi. — Cd. Anl. t. H. f. 78: 1—2.
Bulgaria. — [S. 357.]
—— Agaves Rbh. — Kl. 1223.
—— globosa. — [S. 357.]
—— inquinans. — [S. 358.] Wstd. 191. — Kops Fl. bat. XI. 814. 4. — Berk. t. 22. f. 7. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 20—23. — Bisch. f. 3359. — Fuck. s. 788. — Dsm. 569. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 1—7. (Tulsn.). — Loud. f. 16280. — Bail S. t. 20. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 31. (Hoffm.). — Kl. 115; Cent. VIII, suppl. — Kl. II. 599. — Voges. 197. (Pez. nigr.). — Carol. V. 43. — Huss. I. 32. — Ital. 235.
—— nigrita. — [S. 358.]
—— pellucens Fr. — [S. 358.] — Fl. dan. XII. 2031. 2.
—— pulla. — [S. 358.]
—— rufa. — Carol. IV. 23.
—— sarcoides. — [S. 358.] — Brit. f. 273. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 68. (Asci). — Berk. t. 18. f. 6. —
—— —— With.: Sturm h. 31—. t. 14 15. (Szl.). — Loud. f. 16281. — Fuck. s. 787.
—— —— P.: Kl. 723. — Kl. II. 418. — Spermatia: = Coryne sarcoid.
Bullaria Umbell. — [S. 505. 2.] — Wstd. 857.
Bulliardia. — [S. 437*.]
—— inquinans. — Linn. 1830. V. t. 6. f. 15 (Jungh.).
Byssocaulon. — [S. 465.]
Byssocladium. — [S. 521. 524.]
—— cerevisiae. — Kl. II. 764.
—— dendriticum Ag. = Myxotrich. chart. Fl. dan.
—— fenestrale Lk. — Wstd. 866. — Kl. 454. — Dsm. 102. — Voges. 1100.
—— fenestrarum. — Wstd. 866.



Cantharellus aurantiacus Fr. — [S. 311.] — ?Ital. 330. — Kops Fl. bat. X. 719. — Kl. 23. — Fuck. s. 1052. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 3. (Hoffm.). — Kl. II. 618. — Berk. Out. t. 11. f. 1. — Vent. mi. 79. f. 1. 2; 97. f. 11.
—— —— v. lactea. — Kl. 319.
—— —— Jungh.: Guepinia [S. 331 *.]
—— Brownii. — [S. 312 **.]
—— bryophilus. — [S. 312.] — Fuck. s. 1044. — Dsm. 652.
—— cibarius. — [S. 311.] — Carol. II. 7. — Kops Fl. bat. IX. t. 660. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 36. (Fruct. Berk.). — Hrz. t. 18. — Cd. Anl. t. H. f. 77: 5—11. — Roq. t. 10. f. 1. 2. Vent. t. 7. f. 65—67. — Bisch. f. 3414. — Fuck. s. 1053. — Loud. f. 16053. — Fries. Sv. t. 7. — Bail S. t. 33. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 2. f. 11. — Kl. 24. — Kl. II. 111. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 21. (Fruct. Lév.). — Kützing, Phil. Bot. 1851. t. 4. f. 1. (Fruct.). — Purton. II. t. 10. — Badham t. 9, 2. — Huss. I. 4. — Viv. 41. — Wstd. 310. — Vent. mi. 39. f. 1. 2. Staude t. 2. f. 1. — Krypt. Bad. 559.
—— cinereus. — [S. 312.] — Kl. 1807. — Fuck. s. 1047.
—— cinnabarinus. — Carol. II. 8.
—— cochleatus. — Sturm h. 33—. t. 4. (Strauss).
—— Coemansii R. — R. f. 209. — = Cyphella ampla Lév. (Tul. Sel. 135).
—— confluens. — [S. 312 *.]
—— coriaceus. — [S. 315 *.]
—— Cornucopiae. — Wstd. 192.
—— cornucopioides Fr. — Huss. II. 37. — Dsm. 161. — Loud. f. 16055. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 37. 38. (Fruct. Berk.). — Sturm h. 31—. t. 5. (Schntzl.). — Wstd. 192.
—— crispus. — [S. 312.] — Carol. V. 13. — Fl. dan. X. 1739. 1. — Kl. 25. — Fuck. s. 1046. —
—— —— Horn: Merul. tortilis Fl. dan. — Huss. II. 16.
—— Crucibulum. — [S. 312.]
—— cucullatus Jungh.: Guepinia [S. 331 *.]
—— cupularis. — [S. 312.] (Arrhenia).
—— deliciosus. — Letell. 633.
—— Dutrochetii Mont. = C. Crucibulum Fr. — zu Ag. panuoides ? (Berk.).
—— fascicularis. — Sturm h. 33—. t. 3. (Strauss).
—— fasciculatus. — [S. 312 *.]
—— flabelliformis. — Carol. III. 5.
—— floccosus. — [S. 312 *.]
—— galeatus Fr. — Fl. dan. XII. 2027. 1.
—— glaucus. — [S. 312.] — Kl. 1605. — Kl. II. 110.
—— incarnatus. — [S. 312 *.]
—— infundibuliformis. — [S. 312.] — Kl. 1211. — Fuck. s. 1048. — R. f. 307. — Wstd. 1086. — Kl. II. 121. — Vent. mi. 79. f. 3. 4.
—— —— v. concolor. — Kl. 1912.
—— laevis Fr. — Fuck. s. 1043.
—— leucophaeus N. — Dsm. 163.
—— lobatus. — [S. 312.]
—— lutescens Fr. — Huss. II. 21. — Wstd. 1390. — Loud. f. 16058. — Fuck. s. 1049. — Kl. 812. — R. f. 114. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 83. (Spor. Phöb.).
—— muscigenus Fr. — [S. 312.] — Dsm. 1050. — Bisch. f. 3247. — (cf. Kl. 1605, Nota). — Sturm h. 31—. t. 3. (Szl.). — Kl. 242. — Fuck. s. 1045. — R. f. 115. — Wstd. 764.
—— nigripes Duby. — Dsm. III. 663. (aurantiac. Fr. partim).
—— olivaceus. [S. 312 *.]

Cantharellus papyraceus. — Alger. t. 31, 3.
—— partitus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. XV. (Berk.).
—— Petersii. — Carol. V. 12.
—— Ravenelii. — Carol. III. 4.
—— replexus. — [S. 312.]
—— retirugus. — [S. 312.] — Kl. 411. — Berk. Out. t. 14. f. 2. — R. f. 113.
—— sinuosus Fr. — (Craterellus) Dsm. 162. — Brit. f. 280. 290. — Letell. 684.
—— spathulatus. — Tijdschr. v. natur. Geschied. 1840. VII. t. 8. f. 4. p. 289. (Jungh.).
—— tubaeformis. — [S. 312.] — Brit. f. 140. — Fl. dan. XII. 2080. 1. — Fuck. s. 1050. — Bisch. f. 3412. — Kl. 109. — Krbh. t. 4. f. 8—10. = infundiblf. Fr. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 2. (Hoffm.).
—— umbonatus. — [S. 312.] — Lib. 319. — Kl. 1911. (Merul.).
—— undulatus Fr. — Fl. dan. XIII. 2270. 3. — Loud. f. 16056.
—— villosus P. — Sturm h. 2. t. 30.

Capillaria. — [S. 496 **. 521.]
—— grammica P. — Dsm. 1302.

Capitularia myelospora. — Kl. II. 283.
—— pityrea. — Wstd. 65.
—— Polygoni. — Kl. 1995. — R. f. 185. — Fuck. s. 99.

Capnodium. — cf. Fumago.
—— australe. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 259. f. 9. (B. D.).
—— caroliniense. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 7. (B. D.).
—— Citri. — Dsm. III. 99. — Ital. 348. — Berk. In. p. 275. f. 63. b.
—— elongatum. — Carol. IV. 84. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 5. (B. D.).
—— expansum. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 8. (B. D.).
—— Footii. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258 u. 260. f. 10. (B. D.).
—— Fuligo. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 2 (B. D.).
—— mucronatum M. — Ann. sc. n. 1860. XIV. t. 10 f. A. p. 175 (Antennaria scoriadea Mont.).
—— pelliculosum. — Carol. II. 83.
—— Persoonii. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 258. f. 6. (B. D.).
—— salicinum Mt. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 4. (B. D.). — R. f. 68.
—— Schweinitzii. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. f. 3. (B. D.).
—— sphaeroideum Lacr. — R. f. 352. — Dsm. III. 769.
—— Thwaitesii. — Berk. In. p. 275. f. 63. a.

Carcerina. — [S. 451.]
—— spumarioides Fr. — [S. 451.] — R. f. 432. — (cf. Diderma).
—— valvata. — [S. 451.]

Caries. — [S. 516.]

Carlia Oxalidis Rbh. — Kl. II. 567. — Fuck. s. 331.


Catachyum. — [S. 439. 460.]

Catinula. — [S. 471.]
—— turgida. — Dsm. 1818. — Wstd. 1279.

Caulogaster. — [S. 487 *. 524.]
—— chordostyloides. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 9—11. Bon. t. 10. f. 204. — (ov. insector., Tul.). — Sturm h. 12. t. 31.

Caulogiossum. — [S. 440.]
—— aegyptiacum. — Cd. Ic. VI. f. 44.
—— transversarium. — Carol. V. 79. (Sphaeria

—Mucronatum Montg. 9e Cent. N° 14. Pl. 10.




Chionyphe Carteri Berk Jl of Lin. Soc. 1864. Vol. VIII. p. 139. Pl. _ and in Bull. Soc. Bot. Fr. XIII. p. 9.

Chrysomyxa Abietis Ung. (maladie, &c) Bot. Zeit. 1865 No 51 et 52

Cladosp. Typharum Desm. 1e Edit. No 304. —


Cladotr. Polysp. Cord. Ic. IV. p. 27 Tab. VI. f. 83.
Polytrinchium Fries Sum. V. Scand. p. 504. —

Clathrus triscapus Fr. — Chile n. 10. f. 9. — Bisch. f. 3640. — cf. Laternea.
—— virescens Huds. — Wstd. 518.
Claustria. — [S. 451.]
Clavaria. — cf. Hericium.
—— Mycelium. — Pay. b. cr. p. 55. f. 238.
—— abietina P. — [S. 338.] — Dsm. 651. — Fl. dan XII. 2030. 2. — Fuck. s. 904. — Kl. 13. — genuina et virescens: R. f. 313. — Kl. II. 314.
—— acuta Sow. — Loud. f. 16176.
—— afflata. — [S. 338. 14.]
—— albidula Lasch. — Kl. 1219.
—— alutacea Lasch. — Krypt. Bad. 437. — Kl. 1519. — Kl. II. 121.
—— amethystea. — [S. 338.] — Roq. t. 1. f. 2.
—— amethystina Bull. — Vent. t. 12. f. 113. — Berk. Out. t. 18. f. 2 — ? Badham t. 16. 1. — Vent. mi. 45. f. 3.
—— angustata P. — Fl. dan. X. t. 1783.
—— anomala. — [S. 338.]
—— apiculata. — [S. 338.] — Kl. 1819.
—— Ardenia Sow. — [S. 339.] — Loud. f. 16171.
—— argillacea P. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1852. 2. — Kops Fl. bat. XI. 814. 3. — cf. Cl. ericetor. — Kl. 1218. — Kl. II. 315. — Krypt. Bad. 155.
—— aurantiaca P. — Wstd. 988.
—— aurea Schff. — [S. 338.] — Vent. t 12. f. 112. — Kl. II. 123. — Wstd. 762.
—— Botrytis P. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 111. — Fuck. s. 908. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 15—17. — Hrz. t. 67. — Loud. f. 16159. — Bisch. f. 3390. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 75. (Fruct.). — Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 14. (Fruct.). — Carol. II. 41. — Viv. 54. — Staude t. 1. f. 6. — Fries Sv. t. 35.
—— bulbosa Schum. — Fl. dan. XIII. 2272. 2.
—— byssiseda. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1967. 1.
—— canaliculata. — [S. 339.]
—— ceranoides P. — Loud. f. 16173.
—— chondroides. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 3.
—— cinerea Bull. — [S. 338.] — Kl. 639. — Letell. 708. 1. (fuliginea P.).
—— —— Badham t. 15. 5.
—— cirrhata. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 5.
—— compressa. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 16. p. 384. (Berk.). — cf. Acrospermum, Purton.
—— condensata. — [S. 338.]
—— contorta Holm. — [S. 338.] — Fl. dan. XI. 1852. 1. — Dsm. 75. — Kl. 1125. — Kl II. 505.
—— coralloides. — [S. 338.] — Kl. II. 619. — Roq. t. 1. f. 1.
—— —— Voges. 196. (Calocera vis.) — ? Badham t. 16. 2. — Wstd. 692. 762
—— cornea B. — Bisch. f. 3385. — Kl. 639. — cf. Calocera: Voges. 682.
—— corniculata Sch. — Bisch. f. 3387. — Loud. f. 16168. — Schnzl. t. 16. f. 36.
—— cornuta S. — cf. Calocera flammea
—— crispula. — [S. 338.] — Fl. dan. XIII. 2272. 1. — Bisch. f. 3472.
—— cristata. — [S. 338.] — Sturm h. 31 —. t. 11. (Szl.). — Kl. 134. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 15. (Fruct. Lév.). — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 46. (Fruct. Berk.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 123—127. (Fruct. Phöb.). — Carol. II. 42. — Vent. mi. 73. f 3; 82. f. 1.
—— —— v. curta. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 2. b. (Jungh.). = Theleph. crist.
Clavaria cristata v. flexuosa. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 2. a. (Jungh.). = Theleph. crist.
—— —— v. ornithopodioides. — Letell. 708. 2.
—— damaecornis Schrk. — Wstd. 692.
—— delicata. — [S. 338.]
—— dendroides. — [S. 339*.] — Jungh. pr. t. 6. f. 20.
—— diaphana Schum. = Pistillaria d. Fl. dan
—— eburnea P. = fragilis Fl. dan. XI.
—— —— a P. = Cl. fragilis a gracilis Fr. Ep.
—— elegans Bolt. — Wstd. 692.
—— epichnoa. — [S. 338.]
—— ericetorum P. — [S. 338. 35.] — Hrz. t. 7a. — argillacea Rbh.; Fl. dan. — Voges. 493.
—— erythropus P. = Typhula er. Fl. dan.
—— falcata. — [S. 339.]
—— fascicul. P. — cf. Calocera f. Bon.
—— —— v. aurantiaca Wllr. — Wstd. 988.
—— fastigiata. — [S. 338.] — Wstd 762. — Kops Fl. bat. XI. 814. 1. — Kl. 516. — Kl. II. 318. — pratensis B.
—— filiformis Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 1.
—— fistulosa. — [S. 339.] — cf. juncea.
—— flaccida. — [S. 338.] — Kl 132. — Kl. II. 317. — R. f. 314.
—— flammea. — cf. Calocera f.
—— flava. — [S. 338, 17. 337.] — Viv. 54. — Hrz. t. 7. b. — Loud. f. 16160. — Bail S. t. 27. — Kl. 135. — Wstd. 762. — Vent. mi. 70. f. 4.
—— flavescens Schff. — Wstd. 762.
—— flavipes P. — [S. 338. 35.] — Fl. dan. XI. 1966. 1.
—— flexuosa Lasch. — Kl. 1220.
—— formosa. — [S. 338.] — Kl. II. 122.
—— fragilis. — [S. 338.] — Fl. dan. X. 1783. — = angustata P.: Fl. dan. XI. p. 11. sub fig. 1966. 2. — Loud. f. 16175. — Kl. 240. — Kl. 1610. — Vent. mi. 66. f. 4—6.
—— fuliginea. — Dsm. III. 660; grisea Krbh. t. 53. f. 9. 10; rugosa Fr. partim (Dsm.). — Letell. 708. 1. (cinerea Fr.).
—— fumosa. — [S. 338.]
—— fusiformis Sow. — [S. 338.] — Loud. f. 16172. — Sow. 234. — Kl. II. 233.
—— gigantea. — [S. 337**.]
—— gracilis. — [S. 338, 37. 338.] — Carol. V. 34.
—— granulosa. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11. (Balbis).
—— grisea Krbh. — fuliginea P.
—— —— P.: Krypt. Bad. 56.
—— gyrans Bolt. = Typhula g. Fl. dan.
—— helvola P. — Wstd. 988.
—— herbarum v. fungic. A. S. — [S. 401. 3.] Voges. 671. (Sclerogl. lanc.).
—— Hypoxylon. — Wstd. 167.
—— inaequalis. — [S. 338.] — Carol. IV. 17. — Kops Fl. bat. XI. 814. 2. — R. f. 415. — Huss. I. 18.
—— —— v. helvola Fr. — Wstd. 988.
—— —— v. aurantiaca. — Kl. 640. — Wstd. 988.
—— incarnata. — [S. 339.]
—— juncea. — [S. 339.] — Voges. 1188. (fistulosa Bull.). — Dsm. 709. — cf Sclerot. compl.
—— —— v. gracilis Dsm. — cf. Typhula phacorhiza. — R. f. 239.
—— Klotzschii. — Kl. 240. (Cent. XVII.).
—— Krombholzii. — [S. 338.]
—— Kunzei. — [S. 338.]
—— laciniata Bull. = Theleph. crist. Fl. dan. — Wstd. 430.
—— —— Schff.: Wstd. 692.



Clavaria Ligula Schff. — Krypt. Bad. 156. — Kl. 133. — R. f. 128.
—— luticola. — Kl. 1609.
—— macropus. — [S. 338.]
—— macrorhiza. — [S. 339.]
—— merismatoides. — [S. 339 *.]
—— miniata. — Purton. I. t. 18.
—— minor. — cum Sclerotio: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 2. (Lév.).
—— Mucerdae Schum. = Stilbum M. Fl. dan.
—— mucida P. — [S. 339.] — Carol. II. 43. — Kl. 1121.
—— muscigena Schum. = Cl. crispula Fl. dan.
—— muscoides L. — [S. 338.] — Kl. 1123. — Kl. II. 125.
—— —— Müll. cf. fastigiata Bull.
—— —— Bull. = Cl. crispula Fl. dan.
—— nigrita. — [S. 338. 38.] — Wstd. 761.
—— obtusa. — Voges. 683.
—— ochraceo-virens. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 3. (Jungh.).
—— ophioglossoides L. — Wstd. 761.
—— ornithopodioides. — [S. 339 *.]
—— paludicola. — Lib. 322.
—— parasitica. — Wstd. 69.
—— penicillata Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 2.
—— Petersii. — Carol. V. 33.
—— phalloides. — Wstd. 231.
—— phosphorea Sow. — Wstd. 1251.
—— pilipes. — [S. 339.]
—— pistillaris L. — [S. 338.] — Vent. t. 12. f. 114. 115. — Bisch. f. 3383. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 18—20. — Schntzl. t. 16. f. 15. — Loud. f. 16170. — Dsm. 1019. — Kl. 241. — R. f. 127. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 76. (Fructif.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 128—134. (Fruct. Phöb.). — Huss. I. 62. — Vent. mi. 33. — Sturm h. 14. t. 58.
—— platyceras. — Viv. 54.
—— pratensis P. — Lib. 23. — Dsm. 351. — Kl. 516. — cf. fastigiata. — Wstd. 1083.
—— pruinella Ces. — R. f. 414.
—— purpurea. — [S. 338.]
—— pyxidata P. — [S. 338.] — Kl. 1008.
—— radicosa. — Wstd. 69.
—— Resinosorum. — Wstd. 339.
—— rhodochroa. — Canar. t. 4. f. 3.
—— rosea. — [S. 338.]
—— rufa. — [S. 338.]
—— rufo-violacea. — Nov. Act. 1860. XXVII. t. 19. (Barla).
—— rugosa Bull. — [S. 338.] — Badham. t. 15, 4. — Loud. f. 16169. — Berk. Out. t. 18. f. 3. — Dsm. 74. — Kl. 1122. (Cent. XVII.). — Fuck. s. 905. — R. f. 129. — Brit. f. 149.
—— —— v. grisea: Brit. f. 150. — Wstd. 692.
—— serpentina Müll. — Wstd. 863.
—— setipes Grev. — (Typhula gyrans folior.) Brit. f. 151. – Loud. f. 16181.
—— spinulosa. — [S. 339 *. 338.] — Kl. II. 124.
—— spiralis. — Jungh. pr. t. 5. f. 19.
—— striata P. — Bisch. f. 3386.
—— stricta. — [S. 338.] — Berk. Out. t. 18. f. 5. — Kops Fl. bat. X. 785. — Kl. 1124. (Caloc.). — Kl. II. 316.
—— subtilis. — [S. 338.] — Schnzl. t. 16. f. 37.
—— suecica. — [S. 338.]
—— Surculus. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 6. f. 5.
—— Swartzii. — [S. 338. 32.]
—— tenax. — [S. 339 *.]
Clavaria tenuipes. — Ann. Mg. n. h. 1848. II. t. 9. f. 2. (Berk.).
—— thermalis. — zu Agaric. tubaeform. (Tul.).
—— trichomorpha. — Kl. 1409.
—— umbrina. — Berk. Out. t. 18. f. 4.
—— uncialis Grev. — [S. 339.] — Brit. f. 297. — Loud. f. 16180.
—— vermicularis. — [S. 338.]
—— villosa Schum. = Typhul. v. Fl. dan.
—— virgata. — [S. 338.]
—— viridis Schrad. — Wstd. 863.
—— viscosa. — cf. Calocera. — Kl. 131.
Claviceps. — cf. Cordyceps et Cordyliceps, Sphaeria.
—— in lepidopteris. Cramer, uitlandische Kapellen. 1782. T. VI. p. 133. cr. t. 267. A. B.
—— Euphorbiae. — Fuck. s. 896. (est Typhula).
—— microcephala. — Ann sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 1—11. (Tul.). — Kühn, Krkh. t. 5. f. 24—30. — Kl. II. 430.
—— nigricans. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 15—22 (Tul.).
—— purpurea. — Sclerotium et spermogonia: Ann. sc. n. 1853. XX. t. 1 u. 2; t. 3. f. 1—20. (Tul.). — Kühn, Krkh. t. 5. f. 1—22. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 8. — Kl. II. 431. — Fl. dan. X. t. 1781. f. 1. (Sphaer.). — Wstd. 1201.
—— pusilla Ces. — Kl. II. 38. — Comm. soc. cr. it. 1861. 2. t. 4. f. 3. (Ces.).
Clavus secalis. — cf. Sclerotium Clavus.
Clethria. — cf. Clathrus. — [S. 435 *.]
Clinterium. — [S. 402. 418.]
—— Guepini ? — R. f. 265. — Wstd. 1235.
—— obturatum. — [S. 418.]
Cliostomum. — [S. 524.]
Clisosporium. — [S. 401 *. 408.]
—— herbarum. — [S. 408.]
—— lignorum. — [S. 408. 522 *.]
Clithris. — [S. 364.]
—— degenerans. — [S. 368.]
—— pulveracea. — Bail S. t. 19.
Clonostachys. — [S. 490. 6.]
—— Araucaria. — Pay. b. cr. p. 104. f. 477. — cf. Stachylid. Arauc.
Closteriosporium S. — cf. Sporidesmium atrum Cd.
Cnazonaria. — [S. 521 **.]
—— setipes. — Sturm h. 7. t. 25.
Coccobolus. — [S. 407 †.]
Coccocystis. — [S. 477 **.] — Cd. Ic. III. t. 3. f. 49.
Coccomyces Dub. Hyst. 49. — cf. Hysterium. — Phacid. coronat., trigon.
Coccopleum. — [S. 477 **.]
Coccospora. — [S. 481.]
Coccosporium. — [S. 502.]
—— maculiforme. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 5. — Sturm h. 12. t. 25.
—— Unedonis. — Comm. soc. crit. it. 1861. I. t. 2. f. 5. p. 37. (Notar.).
Coccotrichum dichotomum. — Sturm h. 29 —. t. 38 (Preuss.).
Coccularia. — [S. 408, 1. 522 *.]
—— rigida. — Sturm h. 9. t. 60.
Coelosporium. — [S. 501.]
—— ramosum. — [S. 501.]
—— simplex. — [S. 501.]
Coleosporium. — [S. 512. 669.] — cf. Uredo.
—— aureum Bon. — R. f. 187. — ? Caeoma Compransor S—l. — Bon. Con. t. 1. f. 13.
—— Cacaliae DC. — R. f. 484.

— Pini Cord. Icon. IV. p. 38. Tab. VIII. fig. 105.



Corticium lividum. — [S. 335.]
—— maculaeforme. — [S. 335.]
—— Martianum. — Carol. V. 30.
—— nigrescens (Schrd.) Fr. — R. f. 21.
—— nudum. — [S. 335.]
—— Oakesii. — Carol. III. 32.
—— ochraceum. — [S. 335.]
—— ochroleucum. — [S. 333.] — Carol. III. 33.
—— Petersii. — Carol. V. 28.
—— Platani. — Kl. II. 215.
—— polygonium. — [S. 335.]
—— populinum. — [S. 334.]
—— prasinum. — Carol. V. 29.
—— puberum. — [S. 335.] — Kl. II. 216. a.
—— —— effusum. — Kl. II. 216. b.
—— puteanum. — [S. 335.]
—— quercinum. — [S. 334.] — Bisch. f. 3407. — Fuck. s. 913. — Kl. II. 214.
—— radiosum. — [S. 334.] — Kl. 1515.
—— roseum. — [S. 334.] — Kl. 1516. — Ital. 488.
—— salicinum Fr. — [S. 334.] — Fuck. s. 914.
—— Sambuci P. — [S. 335.] — Dsm. 824. — cf. calceum. — Wstd. 588.
—— sanguineum. — [S. 334.]
—— sarcoides. — [S. 334.]
—— seriale. — [S. 335.]
—— simulans. — Carol. V. 25.
—— stabulare. — [S. 335.]
—— sulfureum. — [S. 334**. 335.]
—— Typhae. — Ital. 442. (Athelia).
—— uvidum. — [S. 335.]
—— velutinum. — [S. 334.]
—— versiforme. — [S. 334.]
—— violaceo-lividum. — [S. 335.]
—— viscosum. — [S. 335.]
—— viticola. — Carol. III. 34.
Cortinarius. — cf. Agaricus.
Coryne. — [S. 341.]
—— sarcoides. — Bon. t. 11. f. 233. — cf. Tremella sarc. With.
—— turbinata. — Cd. Anl. t. G. f. 70: 1—4.
—— unicolor. — Bail S. t. 22.
Corynelia. — [S. 401. 382**.]
Coryneum. — [S. 474.]
—— brachyurum. — Kl. 1872.
—— caudatum Pr. — Kl. 1283.
—— depressum S. K. — [S. 474.] — Bisch. f. 3836. — Fuck. s. 232. — Bon. t. 12. f. 238.
—— disciforme. — Cd. Anl. t. G. f. 69. 14—16. — R. f. 278. — Wstd. 1072. — Pay. b. cr. p. 76. f. 356. — Bisch. f. 3893. — Bon. t. 12. f. 239. — Voges. 573.
—— Kunzei. — Kl. 1360. — Fuck. s. 235. — Kl. II. 779. — Brit. f. 312. — Fuck. rh. 228.
—— macrosporium Berk. — [S. 474.] — R. f. 75. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 19 b. (Fructif., Curr.).
—— marginatum P. — [S. 402***. 474.] — Bisch. f. 3864.
—— oligosporum. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 73.
—— pulvinatum. — [S. 474.] — Bon. t. 12. f. 240. — Fuck. s. 231. — Kl. 1441. — Wstd. 183.
—— umbonatum. — [S. 474.] — Dsm. 176. (Exosp. Til. ex Tul.). — Cd. Anl. t. G. f. 69: 11—13. — Bisch. f. 3859. — Fuck. s. 233.
Corynites. — Linn. Trans. IV. 21. (Berk.).
—— Ravenelii. — Linn. Trans. 1853. XXI. t. 19. f. 4.
Cosmarospora. — cf. Cosmospora.
Cosmospora coccinea R. — R. f. 459. — Hedw. II. 1862. t. 10. (soll heissen: f. 2: 1—5). — Sphaeria Granatum Wllr.
Couturea. — [S. 407.]
—— Castagnei. — Dsm. 1020. — Ital. 786.
—— Elaeanema. — Castagne, Marseille. t. 1.
Craterellus. — [S. 330.] — Bail S. t. 28. — cf. Cantharellus.
—— clavatus. — [S. 330.] — Bisch. f. 3299. — Staude t. 2. f. 2.
—— cochleatus. — [S. 330.]
—— Comperi Lév. — Démid. Russ. t. 4. f. 2.
—— Cornucopiae. — Pay. b. cr. p. 107. f. 490.
—— cornucopioides. — [S. 330.] — Cd. Ic. V. t. 10. f. 80. (Fructif.). — Berk. Out. t. 19. f. 6. — Cd. Anl. t. H. f. 78: 26—29. — Fuck. s. 933. — R. f. 207 b. (Cent. IV. suppl.). — Bisch. f. 3304. — Kl. 626. — R. f. 207. — Kl. II. 11. — Voges. 393. — Carol. II. 27. — Ital. 232. — Krypt. Bad. 58.
—— lutescens. — [S. 330.] — Kl. II. 208. — Schweiz. 21.
—— pistillaris. — [S. 330.]
—— pusillus. — [S. 330.] — Kl. 1808. — Fuck. s. 931.
—— sinuosus. — [S. 330.] — Kl. 625. — R. f. 208. — Fuck. s. 932. — Kl. II. 119.
—— unicolor. — Carol. II. 26.
Craterium. — [S. 454.]
—— deoperculatum. — [S. 454.]
—— flavum. — [S. 454.]
—— leucocephalum. — [S. 454.] — Bisch. f. 3665. — Loud. f. 16517. — Wstd. 482. — Sturm h. 1. t. 11.
—— minutum. — [S. 454.]
—— mutabile Fr. — [S. 454.] — Fl. dan. XII. 2087. 2. — Alger. t. 22, bis. 3.
—— nutans. — [S. 454.]
—— pedunculatum. — [S. 454.] — Bisch. f. 3666. — Kl. II. 139. — Fuck. s. 283.
—— pendulum. — [S. 454.]
—— pruinosum Cd. — Cd. Ic. VI. f. 33.
—— pyriforme. — [S. 454.] — Cd. Anl. t. C. f. 29: 29, 30. — Sturm h. 1. t. 10.
—— —— Dtm.: Bisch. f. 3667. — Pay. b. cr. p. 122. f. 578.
—— turbinatum. — [S. 454.] — Fl. dan. XII. 2093. 3.
—— vulgare. — Wstd. 482. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 27. 28. — Sturm h. 1. t. 9.
Crateromyces. — [S. 488*. 524.]
—— candidus. — Cd. Anl. t. 6. f. 23: 7—9. — Bisch. f. 3795. — Schntzl. t. 12, f. 42. 43. — Bon. t. 10. f. 207. — (ov. insector., Tul.). — Sturm h. 12. t. 30.
—— duplex. — Bon. t. 10. f. 210.
Creopus. — Bail S. t. 17.
Cribraria. — [S. 456.]
—— argillacea. — [S. 456.]
—— aurantiaca Schrad. — [S. 456.] — Fl. dan. XII. 2085. 1. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 35. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 5—7. — Pay. b. cr. p. 122. f. 583. — Bisch. f. 3678.
—— didermoides Schum. = Dictydium d. Fl. dan.
—— fulva. — [S. 456.]
—— intermedia. — [S. 456.]
—— intricata. — [S. 456.] — Berk. In. p. 335. f. 75. b. — Carol. II. 79.
—— macrocarpa. — [S. 456.]
—— micropus Schrad. — Loud. f. 16521.
—— Onygena ? — R. f. 268.
—— purpurea Schm. — [S. 456.] — Kl. 930.

Couturea Eleanorana Cast. Catal. Pl. Mar. p. 192. Pl. 1.
C. Castagnei Desmaz. 12ᵉ Not. pag. 69. –

Craterium pyriforme Ditm. Brong. Essai. Tab. 3. f. 3.

Croūcrear Gramineum Fries S.V.Sc. p. 418. –

Cucurbitaria Dutr Sfer. Ital. p. 60. 86.

Cyathus farctus. — [S. 438. 2.]
—— Gayanus. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 18 —22; t. 5. f. 1. 2. (Tul.).
—— intermedius. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 4—7. (Tul.).
—— laevis H. = C. Olla. — Wstd. 282.
—— Lesieurii.
—— —— major. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5. f. 5—10. (Tul.).
—— —— minor. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5. f. 11—13. (Tul.).
—— limbatus. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 12 — 17. (Tul.).
—— microsporus. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 6. f. 6—8. (Tul.).
—— Montagnei. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 9 —11. (Tul.).
—— nitidus. — Wstd. 282.
—— novae Zeelandiae. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 6. f. 1—5. (Tul.).
—— Olla. — Voges. 182. — vernicosus Tul., — laevis Hoffm. — Wstd. 282. — Kops Fl. bat. X. 760. 2. — Schnzl. t. 14. f. 36—41. — Kl. II. 247. — Fuck. s. 319. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 5. f. 14—23. (Tul.). — Dsm. 404. — Berk. Out. t. 21. f. 1. — Nidularia vern. Bull., camp. With.
—— Pöppigii. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 4. f. 23; t. 5. f. 3. 4. (Tul.).
—— scutellaris. — [S. 438.]
—— striatus. — [S. 438.] — Dsm. 403. — Cd. Anl. t. D. f. 42: 1—9. — Linn. 1842. XVI. t. 6. 7. (Schmitz.). — Loud. f. 16342. — Berk. Out. t. 2. f. 3. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 3. t. 4. f. 1—3; t. 8. f. 1—12. (Tul.). — Pay. b. cr. p. 8. f. 31; p. 109. f. 495—502. (evolut.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 21. (Keimg. Hoffm.). — Kl. II. 135. — Fuck. s. 320. — Brit. f. 259. — Wstd. 121. — Ital. 237. — Krypt. Bad. 50.
—— subiculosus. — Bull ac. belg. 1841. VIII. 2. t. 2. (Kx.).
—— vernicosus. — cf. C. Olla P. — Wstd. 282. — Ital. 886.
Cycloconium Oleaginum. — Castagne Marseill. t. 6.
Cycloderma. — [S. 410.]
—— indicum Kl. — Linn. 1832. VII. t. 9. B. — Cd. Anl. t. C. f. 39: 1—4. — Pay. b. cr. p. 9. f. 43; p. 115. f. 534.
Cyclomyces. — [S. 324.]
—— fuscus. — Linn. 1830. V. t. 11. f. 3. Fr.). — Cd. Anl. t. H. f. 76: 18—20. — Bisch. f. 3409. — Bail S. t. 30.
—— Greenei. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 11. — Pay. b. cr. p. 117. f. 543.
Cylichnium. — [S. 459.]
Cylindrium candidum. — Bon. t. 1. f. 4.
—— carneum. — Fuck. rh. 56.
—— elongatum. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 1. Bon.). — Fuck. rh. 55.
—— septatum. — Bon. t. 1. f. 16.
Cylindrocolla Urticae Bon. cf. Dacryomyc. Urt. Fr.
Cylindrodendrum album. — Bon. t. 5. f. 127.
Cylindrophora alba. — Bon. t. 6. f. 131.
—— tenera. — Bon. t. 5. f. 110.
Cylindrospora concentrica. — Ung. Ex. t. 2. f. 9.
—— major. — Ung. Ex. t. 2. f. 11. — Kl. 1890.
—— Phaseoli. — Kl. II. 327.
Cylindrosporium. — [S. 505**.]
—— concentricum Grev. — Loud. f. 16616.
Cylindrosporium Ficaria. — Brit. f. 212.
—— longipes. — Sturm h. 29—. t. 35. (Preuss.).
—— majus. — Bon. t. 1. f. 22. — Fuck. rh. 75.
Cylindrotrichum album. — Bon. t. 4. f. 99.
—— repens. — Bon. t. 4. f. 97.
Cymatoderma. — [S. 332*.]
—— elegans. — Tijdsk. v. n. Geschied. 1840. VII. t. 8. f. 7. p. 290. (Jungh.). — ?Theleph. dendritica P.
Cynophallus. — [S. 434.] (cf. Phallus).
—— canariensis. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 8.
—— caninus. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 1—7. — Bail S. t. 26. — cf. Mutinus.
Cyphella. — [S. 336.]
—— candida. — Jungh. pr. t. 5. f. 16.
—— Capula. — [S. 336.]
—— —— v. cernua. — Kl. 1612.
—— Curreyi B. B. — R. f. 416.
—— Digitalis. — Cd. Anl. t. G. f. 73: 23. — Bisch. f. 3349. — Bail S. t. 28.
—— faginea. — Lib. 331.
—— fissilis. — [S. 336.]
—— fulva. Carol. IV. 16.
—— galeata. — [S. 336.]
—— Gayana. — Chile n. 8. f. 3.
—— Hoffmanni Tul. — Pez. anomala P.
—— infundibuliformis. — [S. 336.]
—— lacera Fr. — [S. 336. 4.] — Bisch. f. 3351.
—— laeta. — [S. 336.]
—— Musarum. — Jungh. pr. t. 5. f. 15.
—— muscicola Fr. — [S. 336.] — Kl. 824. — cf. Cy. Neckerae.
—— —— v. inaequilatera. — Fl. dan. XII. 2083. 2.
—— muscigena. — [S. 336.]
—— Neckerae. — [S. 336.] — Bon. t. 10. f. 212.
—— pendula Fr. — Polyporus cupulaef. B. C.
—— Taxi. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 10. Fructif. Lév.). — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 6. Lév.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 24—26. — Pay. b. cr. p. 107. f. 485. — ? zu Pez. albo-viol. (Tul.).
—— —— Schw.: Galla insectis producta, Carol. II. 40.
Cystophora. — [S. 501***.]
Cystopus. — [S. 512.] cf. Uredo.
—— Alismatis. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 6. p. 194. (Bon.).
—— Bliti Lév. — R. f. 598.
—— candidus. — [S. 512.] — Bon. t. 2. f. 41. — R. f. 482. (oospor.). — de Bary Br. t. 2. f. 3—7. Fuck. s. 4. — Ann. sc. n. 1860. XIII. t. 13. f. 16—18. (Zoospor. de Bar.). — Journ. hortic. soc. 1848. III. p. 266. u. 270. (Berk.). — Fuck. rh. 44. — Ital. 598.
—— —— f. Cruciferarum: Sinapis. — Kl. II. 368.
—— —— f. Lepidii. — Carol. IV. 93.
—— cubicus. — [S. 512.] — Kl. 1595. — Ann. sc. n. 1860. XIII. t. 13. f. 10—15. (Bar.). — R. f. 480. — Fuck. rh. 45. 46.
—— —— f. Cirsii oleracei. — Kl. II. 692.
—— Lepigoni de B. — R. f. 483. — Fuck. rh. 42.
—— Portulacae. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 1—5. (Tul.). — R. f. 481. — Kl. II. 799. — Fuck. rh. 43.
—— quadratus. — [S. 512.]
—— sphaericus Bon. — R. f. 186.
—— spinulosus. — Fuck. rh. 47.
—— —— de B. — R. f. 479.
Cystotricha Striola. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 12. f. 10. p. 458. (B. B.).
Cytispora. — [S. 344. 410***. 413.] cf. Sphaeria.
—— Abietis. — Schnzl. t. 15. f. 6—10.

Cystop. Cand. De Bary Ann. Sc. Nat. Tom. XX. 1863. fig.
Pl. 1, 2. —

C. cubicum De Bar. loc. cit. Pl. 2. Fig. 14–21.

C. Portulacae De Bar. loc. cit. Pl. 3.

Cytispora Aesculi. — Wstd. 721.
—— atronitens. — Wstd. 362.
—— atrovirens. — [S. 413.]
—— Aucupariae. — Lib. 168. (Sphaeria caespitosa Td.).
—— Aurora. — Ital. 542.
—— betulina Ehrb. — Kl. 764. — Fuck. s. 426.
—— brunneola. — [S. 413.]
—— Buxi D. — Dsm. 1499.
—— carbonacea Fr. (Synariza). — [S. 413.] — Kl. 371. — R. f. 358.
—— carphosperma Fr. — [S. 413.] — Bisch. f. 3569. — Kl. 372. — Voges. 1340. — Wstd. 519. 1249.
—— —— v. Pyri Mali Lasch. — Kl. 765.
—— chilensis. — Chile n. 9. f. 12.
—— chrysosperma. — [S. 413.] — Schnzl. t. 15. f. 4. 5. — Fuck. s. 423. — Dsm. 181. — Kl. 168; Cent. X. Suppl. — Voges. 881. — Brit. f. 190. — Lib. 169. — Wstd. 323.
—— Corni. — Wstd. 1129.
—— Dahliae. — Lotos 1857. VII. t. 2.
—— elegans. — [S. 408.] — Kl. 1868.
—— endophylla. — [S. 413.]
—— enteroleuca. — [S. 413.]
—— epimyces. — [S. 408.]
—— ferruginea D. — [S. 413.] — Dsm. 988. — Lib. 265. — Wstd. 218.
—— foliicola. — Voges. 1176. — Lib. 61. — Wstd. 20. (Ceuthosp. phacid. v. immacul. Dsm.).
—— fugax. — [S. 413.] — Kl. 1351. — Fuck. s. 424. — R. f. 460. — Dsm. 182. — Wstd. 19.
—— globifera. — [S. 414.]
—— grisea. — Kl. 1442.
—— guttifera. — [S. 414.]
—— incarnata Fr. — [S. 413.] — Dsm. 190. — Kl. 981. — Wstd. 520.
—— —— v. Rosae. — Kl. 982.
—— Laurocerasi Fr. — Fuck. s. 437.
—— leiphaemia Awd. — Sphaeria Fr. — Kl. 1326.
—— leucomyxa. — Kl. 1352. — Fuck. s. 425. — R. f. 357.
—— leucosperma Fr. — [S. 413.] — Dsm. 489. — Kl. 169; Cent. X. Suppl. — Fuck. s. 422.
—— —— brunneola. — Voges. 1085.
—— macilenta Rob. — Dsm. 1498 (cf. Discellis Bk.). — Wstd. 629.
—— melanospora Fr. — [S. 413.] — Fuck. s. 428.
—— microsperma. — Bon. t. 2. f. 61.
—— microspora. — Kl. II. 166.
—— Micula. — cf. Sphaeria.
—— Mougeótii. — Voges. 1272.
—— nivea Fr. — Fuck. s. 431.
—— ocellata Fr. — Fuck. s. 432.
—— Oleae. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 8. (Notar.).
—— orbicularis. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 6. (Berk.).
—— Oxyacanthae. — Kl. II. 754.
—— Persicae. — Carol. I. 71.
—— Peylii. — Lotos 1857. VII. t. 1. f. 6.
—— Pinastri Fr. — [S. 413.] — Dsm. 1497. — Kl. 1869. — Lib. 266. — Wstd. 521. (v. Taxi).
—— Pini Fr. — Fuck. s. 433. — Dsm. 1500.
—— pinicola. — Wstd. 933.
—— pisiformis. — [S. 413.]
—— Platani Fr. — Fuck. s. 434.
—— populina P. — Fuck. s. 429.
—— pulveracea. — [S. 414*.]
—— Pyri. — Fuck. Nass. f. 19. — Fuck. s. 435.
—— rhoina. — [S. 414.]
—— Rosae Fr. — Kl. 1061. — Fuck. s. 421.

Cytispora Rosarum Grev. — Loud. f. 16463. — Bail S. t. 14.
—— rubescens Fr. — [S. 413.] — Bisch. f. 3568. — Kl. 984. — Kl. II. 438. — Voges. 1084.
—— Salicis Rbh. — Kl. 763. — Fuck. s. 420. — Kl. II. 439.
—— Scheidweileri. — Wstd. 1131.
—— sphaerosperma. — Wstd. 1250.
—— tumida. — Lib. 170. (Sphaeria). — Wstd. 1130.
—— Ulmi (Synariza) Awd. — Kl. 1061.
—— xanthosperma Fr. — Kl. 983.
Cyttaria. — [S. 398.]
—— Berteroi. — Linn. Trans. XIX. t. 4. B. Berk.).
—— Darwinii. — Linn. Trans. XIX. t. 4. p. 42. Berk.).
—— Gunnii. — Berk. In. p. 289. f. 67. a.
—— Hookeri. — Crypt. Bot. antarct. voy. Ereb. 1854. t. 162. 1.

Dacrina. — [S. 466.]
—— atra. — [S. 466.]
—— fusco-virens. — [S. 466.]
—— lutescens. — Bon. t. 5. f. 122.
—— minuta. — [S. 466.]
Dacryobolus. — [S. 404.]
Dacryomyces (Dacrymyces). — [S. 342. 470.] cf. Tremella. — Bisch. f. 3149. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 16. (Fructif. Lév.).
—— acuum Lasch. — Kl. 571.
—— caesius S. — [S. 359, 7. 471.] — Act. Tur. 1841. III. Dec. 2. f. 1. (Notar.).
—— contortus. — Kl. 1984.
—— deliquescens Dub. — [S. 359*.] — Ann sc. n. 1853. XIX. t. 12. 13. (Tul.). — Berk. In. p. 350. f. 77. c. (Keimg.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 6. (Keimg. Hoffm.). — Wstd. 139.
—— Euphorbiae Lasch. — Kl. 1078.
—— hyalinus. — Lib. 333.
—— lacrymalis. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 24—26. — Wstd. 686.
—— Lythri D. — Dsm. 1045.
—— moriformis Fr. — Loud. f. 16300. — Carol. I. 84.
—— Poae. — Lib. 135.
—— roseus. — [S. 359*.]
—— rubro-fuscus. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 1.
—— stillatus Ns. — [S. 359. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 2. — Berk. Out. t. 18. f. 8. — Loud. f. 16301. — Sturm h. 31—. t. 10 (Szl.). — Bon. t. 12. f. 242. — Bail S. t. 22. — Kl. 348. — Kl. II. 276. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1860. X. t. p. 810. (Schulzer). — Dsm. 1545. — Voges. 1191. — Brit. f. 164. — Carol. IV. 81. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 3. — Wstd. 139.
—— —— v. lutescens: Wstd. 686.
—— Syringae. — [S. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 3.
—— tortus. — [S. 359*, no. 6. 471.] — Ital. 598.
—— Urticae. — [S. 359, 9. 471.] — Dsm. 402. — Kl. 148. — Fuck. s. 249.
—— —— Fr.: Fusarium tremell. Gr. — Kl. II. 73. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 3. (Berk.). — cf. Calloria fusarioid. — Lib. 31. — Wstd. 185.
—— violaceus. — [S. 471.] — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 12. f. 3. (Tul.).
—— virescens Fr. — [S. 471.] — Fl. dan. XI. 1857. 1.
Dactylium. — [S. 491. 504.]
—— candidum Ns. — [S. 491.] — Bisch. f. 3817. — Bon. t. 6. f. 139. — Letell. 685. 1.


— Bulla : actinonema Robergii Daum. ex Frém 1.4.30.424.

Depazea Agrimoniae. — Kl. 1356.
—— alpina. — [S. 423.]
—— Aquilegiae. — Kl. 1651.
—— areolata F. — Fuck. s. 383. — Fuck. rh. 436.
—— Asperulae. — Kl. 1867.
—— Atriplicis Lsch. — Fuck. s. 369. — Fuck. rh. 442.
—— Bidentis Lsch. — Kl. 871.
—— bifrons v. Aegopodii. — Wstd. 95.
—— —— v. Cytisi. — Wstd. 424.
—— —— v. chelidonicola. — Wstd. 425.
—— brassicaecola Fr. — Kl. 1142. — Wstd. 294.
—— Bupleuri. — Fuck. rh. 446.
—— buxicola. — Voges. 974. — Kl. II. 265. — Fuck. s. 370. — Dothid. depazd. Dsm. — Fuck. rh. 429.
—— Callae Lsch. — Kl. 368. — (Spilosphaer.) Kl. II. 554.
—— calthaecola. — Kl. 1650.
—— castaneaecola DC. — Fuck. s. 378.
—— Clematidis. — Kl. 1647.
—— concava. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 3. (Bk.).
—— convolvulicola DC. — Fuck. s. 368.
—— cornicola DC. — Wstd. 29. — Kl. 367.
—— cruenta. — Voges. 976. — Wstd. 649. — cf. Phyllosticta cr.
—— Dianthi. — Kl. 434. (cf. Sphaeria). — Fuck. s. 365. — R. f. 360. — Wstd. 293. 646. — Fuck. rh. 440.
—— —— v. Saponariae. — Dsm. 290. (cf. Spilosphaeria Sap.).
—— fagicola Fr. — Fuck. s. 376.
—— ficariaecola Lsch. — Kl. 570. — Fuck. rh. 448.
—— fragariaecola Wllr. — Kl. 869. — Kl. II. 152. — Fuck. s. 364. — Krypt. Bad. 148.
—— frondicola. — [S. 423.] — cf. Leptothyrium Tremulae. — Wstd. 1384.
—— geicola Fr. — Kl. 564. — Fuck. rh. 449.
—— gentianaecola v. Convolvuli. — Wstd. 295.
—— grossulariaecola Fr. — Kl. 1074.
—— hederaecola. — Kl. II. 151. — Fuck. s. 380. — Septoria h. Dsm. — Wstd. 28. 1383. — Schweiz. 11. — Krypt. Bad. 553. 554 (Ampelops.).
—— hepaticaecola. — Kl. 1654. — (Spilosph. h.) Kl. II. 555.
—— Hieracii Lsch. — Kl. 872.
—— Hydrocotyles Rbh. — Kl. 1143.
—— ilicicola. — Voges. 975.
—— Impatientis. — Fuck. rh. 445.
—— increscens. — Heer. Fl. tert. helv. t. 1. f. 7.
—— juglandicola Fr. — Wstd. 37. — R. f. 153. — cf. Leptothyrium Juglandis.
—— juglandina. — Kl. 1649. — Fuck. s. 375. — Fuck. rh. 432.
—— —— f. acerina Awd. — Kl. 987.
—— kalmicola. — Carol. III. 71.
—— lichenoides v. hederaecola. — Wstd. 28. 1383.
—— ligustrina F. — Fuck. s. 374.
—— Linnaeae Ehrb. — Kl. 363. — Kl. II. 149.
—— Lychnidis Fr.
—— —— f. Saponariae. — Kl. 755.
—— lyciicola Lsch. — Kl. 1252.
—— Lysimachiae Rbh. — Kl. 989.
—— Majanthemi Rbh. — Kl. 752. — Kl. II. 51.
—— Mappa Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 3.
—— Meliloti Lasch. — Kl. 370.
—— myrticola Rbh. — Kl. 1146.
—— Nerii Rbh. — Kl. 1145. — Kl. II. 743.
—— nicotianaecola Rbh. — Kl. 1141.
—— Oenotherae Lsch. — Kl. 369. — Fuck. rh. 447.

Depazea Pallor. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 2. (Berk.).
—— palustris. — Kl. II. 266.
—— paridicola Rbh. — Kl. 868.
—— Petroselini. — Wstd. 135.
—— phillyreaecola. — Kl. 1646.
—— picta Heer. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 8. (R. Ludwig).
—— polygonicola Lasch. — Kl. 566.
—— populicola. — [S. 423.]
—— populina F. — Fuck. s. 372. — Fuck. rh. 430.
—— punctiformis. — [S. 423.]
—— purpurascens. — Kl. II. 557. — v. Fragariae: Wstd. 175; Corni: Wstd. 29.
—— —— v. Scrophul. = Septoria Scroph. Wstd. — Wstd. 1385.
—— Pyri. — Hdw. I. t. 3. f. 2. p. — Kl. 673; — 1755. — Kl. II. 451. — Fuck. s. 379.
—— pyricola D. — Wstd. 130. — Dsm. 178.
—— pyrina. — Fuck. rh. 434.
—— Pyrolae Ehrb. — [S. 423.] — Kl. 1140. — Fuck. s. 371.
—— quercicola Wllr. — Fuck. s. 377. — Fuck. rh. 433.
—— rhamnicola Lsch. — Kl. 567. — Fuck. rh. 439.
—— ribicola. — Kl. 1652. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 1. (Bk.). — Fuck. s. 381. — Brit. f. 316. — Fuck. rh. 435.
—— Robertiani Chev. — Wstd. 537.
—— Rubi. — Wstd. 938.
—— Sagittariae Rbh. — Kl. 751.
—— salicicola Fr. — [S. 423.] — Kl. 366. — Kl. II. 566. — Septoria Capreae Wstd. — Fuck. rh. 438.
—— Saponariae. — Kl. 1653.
—— Scabiosae. — ? Wstd. 30.
—— scabiosaecola D. — Dsm. 179. — Wstd. 30.
—— Senecionis Fr. — Fuck. s. 367.
—— smilacicola. — Kl. 1144. — Carol. V. 77.
—— sorbicola. — R. f. 548.
—— speirea Cd. — [S. 479.] — Kl. 1051. — Microsticta vagans Dsm. — Perisporium sp.
—— Spinaciae Fr. — Kl. 754. — Fuck. s. 366. — Fuck. rh. 441.
—— stachydicola Lsch. — Kl. 565.
—— stemmatea Fr. — Kl. 433. — Kl. II. 742.
—— syringaecola Lsch. — Kl. 569. — Fuck. s. 385. — Kl. II. 452. — Fuck. rh. 437.
—— tremulaecola DC. — Kl. 365. — Fuck. s. 373. — Kl. II. 52. — Fuck. rh. 431.
—— Trientalis Lsch. — Kl. 364.
—— Vaccinii. — [S. 422.] — Kl. II. 150.
—— vagans Fr. — [S. 423.] — Kl. 754 u. 1866.
—— —— f. Armoraciae. — Kl. 867. — Kl. II. 453.
—— —— f. Atriplicis. — Wstd. 960.
—— —— f. Brassicae. — Wstd. 294.
—— —— f. Dianthi. — ? Wstd. 293.
—— —— f. glechomaticola. — Kl. 870.
—— —— f. Lamii. — Fuck. s. 384. a. — Fuck. rh. 443.
—— —— f. scutellariaecola. — Kl. 1057.
—— —— f. Urticae. — Fuck. s. 384. b. — Fuck. rh. 444.
—— —— f. Vincae. — Wstd. 31.
—— Vincetoxici Schub. — Wstd. 1146.

Dermatea. — [S. 362.] cf. Peziza, Cenangium, Tubercularia.
—— carpinea. — [S. 362.] — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 17. 18. (Tul.). — Tubercular. fascic. Td. — Kl. II. 518. — Fuck. s. 775. — Wstd. 1274.
—— Cerasi. — [S. 362.] — Kl. II. 517. — R. f. 232.

233. — Krypt. Bad. 435. — (Cenang.) Kl. 1539. — Fuck. s. 773.
Dermatea fascicularis. — [S. 362.] — Kl. II. 620. (cf. Peziza).
—— fissa. — [S. 362.]
—— furfuracea.— [S. 362.] — Kl. II. 621. — Ital. 443.
—— Padi. — [S. 362.] — Kl. II. 711.
—— Prunastri Fr. — [S. 362.] — R. f. 125. — (Cenang.) Fuck. s. 772.
—— purpurea. — [S. 362.]
—— rubiginosa. — [S. 362.]
—— tegularis. — [S. 362 †.]
—— tiliacea. — [S. 362.]
—— tumida. — [S. 362.]
—— Urceolus. — [S. 362.]
Dermea. — Bail S. t. 19.
Dermosporium. — [S. 476.]
Desmazierella acicola. — Lib. 24. — Ann. sc. n. 1829. XVII. t. 6. B. (Libert).
—— granulata. — Wstd. 50.
Desmotrichum simplex. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 8. (Lév.).
Diachea. — [S. 455.]
—— elegans. — [S. 455.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 38. — R. f. 434. — Cd. Anl. t. C. f. 32: 7—11. — Pay. b. cr. p. 122. f. 582. — Kl. 1229. — Fuck. s. 281. — Kl. II. 36. — Dsm. III. 261. — Carol. I. 80 (leucostyla Schw.). — Wstd. 1260.
—— fulgens. — [S. 455.]
—— leucostyla. — cf. elegans.
Diamphora. — [S. 488.]
—— bicolor. — Cd. Anl. t. C. f. 24: 17—19. — Bon. t. 10. f. 211.
—— Martii. — Bisch. f. 3739.
Diaphanium. — [S. 480.]
Diatrype. — [S. 384.] cf. Sphaeria.
—— aneirina. — [S. 385.]
—— aristata. — [S. 385.]
—— aspera. — [S. 385.]
—— bispora. — Carol. IV. 45.
—— bullata E., Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 47. — Fuck. s. 684. — R. f. 536.
—— Callicarpae. — Carol. IV. 41.
—— capnostoma. — Carol. IV. 42.
—— ceratosperma. — [S. 385.]
—— conspersa.
—— —— v. Juniperi. — [S. 385.]
—— corniculata. — Carol. IV. 43.
—— decipiens. — [S. 385.]
—— decorticata. — [S. 385.]
—— disciformis Fr. — [S. 385. 419**.] — R. f. 137. — Fuck. s. 681, a. — Krypt. Bad. 430. — Ital. 340.
—— euphorea. — [S. 385.]
—— favacea.— [S. 385.]— Kl. 1558.— Fuck. s. 680.
—— ferruginea Fr. — [S. 385.] — Fuck. s. 672. — Wstd. 915.
—— flavovirens H. Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 48. — Fuck. s. 679, a.
—— gastrina. — Carol. V. 58.
—— Grandinia. — Carol. IV. 40.
—— haustellata. — Carol. III. 53.
—— hypophloea. — Carol. IV. 38.
—— Hystrix. — [S. 385.]
—— insitiva. — [S. 385.] — Kl. II. 147.
—— lanciformis Fr. — [S. 385.] — Kl. 1323. — R. f. 248. — (Sphaer.) Kl. 1558, a.
—— lata. — [S. 385.] — Kl. 1565. — Fuck. s. 675.
—— leioplaca. — [S. 385.]
—— lenta. — [S. 384.]
—— ligniota. — [S. 385.]
Diatrype microplaca. — Carol. IV. 39.
—— milliaria. — [S. 385.]
—— multiceps. — [S. 385.]
—— obesa. — Carol. IV. 47.
—— occultata. — [S. 385.]
—— parallela. — [S. 385.]
—— podoides. — [S. 385.]
—— prorumpens. — [S. 385.]
—— pyrrhocystis (versatiles). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 10. (B. B.). — R. f. 136.
—— quadricocca. — [S. 385.]
—— quercina Fr. — [S. 385.] — Fuck. s. 677. — R. f. 319.
—— rhytistoma. — [S. 385.]
—— scabrosa. — [S. 385.]
—— Stigma Hffm. — [S. 385.] — Kl. 49. — Fuck. s. 682. — Kl. II. 529. (Stromatosph. S. Gr.) — Ital. 591.
—— strumella Fr. — [S. 385.] — Kl. II. 49. — Fuck. s. 676.
—— subcutan. — [S. 385.]
—— subferruginea. — Carol. IV. 44.
—— undulata (lignosae). — [S. 385.] — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 9. (B. B.) — Fuck. s. 683.
—— velutina. — Fuck. s. 674.
—— verrucaeformis. — [S. 385.] — Kl. II. 728. — Fuck. s. 671. — R. f. 135. — Carol. IV. 46.
—— verrucella. — [S. 385.]
—— versatilis. — [S. 385.]
—— virescens. — Carol. IV. 48.
—— vitellina. — Chile n. 10. f. 4.
Diatrypella. — cf. Sphaeria.
Dicaeoma. — [S. 514.]
—— Betonicae Ns. — Wstd. 680.
—— betulinum. — Bon. t. 2. f. 54.
Dichaena. — cf. Hysterium.
—— faginea. — [S. 402.] — Carol. II. 66. — Wstd. 924.
—— fissa. — [S. 402.] — Kl. II. 724.
—— quercina. — [S. 402.] — Kl. II. 449.
—— rugosa. — [S. 402.] — Kl. 1472. — Kl. II. 450. — cf. Psilospora faginea.
—— Sambuci. — [S. 403.]
—— strobilina Fr. — [S. 403.] — Kl. 544 (Sphaeria).
—— strumosa. — Carol. II. 67.
—— sulcata. — [S. 403.]
Dichlaena Lentisci. — Alger. t. 22 bis, 2.
Dichonema aeruginosum. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 2: 3 (Bl. Ns.).
—— erectum. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7.
—— sericeum. — [S. 333 ***.]
Dichosporium. — [S. 452. 460.]
—— aggregatum Ns. — Loud. f. 16542.
—— album. — [S. 452.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 31. — Cd. Anl. t. C. f. f. 27: 7—9.
Dicladium graminicolum. — Kl. 1677.
Dicoccum. — [S. 484.]
—— dryophilum Cd. — Stigmella dryina Lév. — R. f. 351. — Ital. 298.
—— minutissimum. — Cd. Anl. t. B. f. 4: 1—3. — Sturm h. 9. t. 55.
—— Rosae. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 2 (Bon.).
Dictydium. — [S. 456.]
—— cernuum Ns. — Loud. f. 16522.
—— didermoides Fr. — Fl. dan. XII. 2085. 2.
—— microcarpum. — [S. 456.]
—— micropus. — [S. 456.]
—— splendens. — [S. 456.]
—— trichoides. — Kl. 1820.
—— umbilicatum. — [S. 456.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 36. — Cd. Anl. t. C. f. 31: 8—11. — Bisch. f. 3672. — Krypt. Bad. 422. — Pay. b. cr. p.



Dipl. pustulosa Lévil. Champ. Mus. No. 439. –

Dinemasporium Grev. Excipula Cord. Ic. iii. 29.

Diplod. Tecta Berk. and Broom. Not. Fung. Brit. No. 411.

Dip. arachnoidea – Lasiosphaeria Cr. Duts. Schim. p. 56.

Diplod. Comorr. Berk. and Broo. Not. Fung. Brit. No. 412.
D. conigena Desm. 13e not. p. 69. –

D. Diatripa Lévil. Champ. Musée No. 446. An. S. Nat. 1846. t. v

Dip. Evony. West. Crypt. p. 146. – D. Phyllophila Lév. in Litt.

Dircella platyspora Berk. and Br. Not. of Brit. Fung. No. 428.

Dip. Fibricol. Berk. arct. voy. Frank. p. 9. T. III. f. 12.

Dip. herbarum Fr. – Sporocadus herb. – Cord. Ic. iii. t. iv. f. 69.

Dipl. Melana Lév. Champ. Mus. No. 442. –

– Sinarbi et var. Carty Catal. Supp. Muscil. p. 66. –



Dothidea Rosae. — [S. 386. 402***.] — Carol. I. 68. — ?Wstd. 116.
—— rubra. — [S. 387.] — Loud. f. 16170. — (Polystig.) Kl. 377. — Fuck. s. 669. — Letell. 656. 4. — Wstd. 637.
—— saligna. — cf. Sphaer. s. Ehrb.
—— —— Kx.: Wstd. 524.
—— Sambuci. — [S. 386.] — Kl. 555. — Fuck. s. 663. — Letell. 656. 2.
—— —— v. moricola. — Ital. 781.
—— —— v. Hederae. — Act. Turin. 1841. III. Dec. I. f. 8. (Notar.). — Ital. 784.
—— —— v. Lonicerae. — Kl. 1859.
—— Solidaginis v. Virg. — cf. Puccinia Virgaureae Lib. — Wstd. 681.
—— Stellariae. — Lib. 172.
—— stellaris Fr. — Bisch. f. 3516. — Kl. 260. — Voges. 863.
—— striaeformis. — [S. 386.]
—— tetraspora. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 39. (B. B.).
—— Trifolii. — [S. 387.] — Kl. II. 657. — Fuck. s. 662. — Carol. IV. 50.
—— typhina. — [S. 381.] — Bisch. f. 3567. — Loud. f. 16466. — Kl. 55; Cent. XV., suppl. — cf. Polystig. t. — Brit. f. 92. — Wstd. 522. — Krypt. Bad. 48.
—— Ulmi. — [S. 387.] — Dsm. 836. — Loud. f. 16467. — Fuck. s. 667. — Kl. 380. (Cent. XVI.). — Kl. II. 658. — Brit. f. 192. — Letell. 656. 3. — Wstd. 111. — Ital. 445.
—— Vaccinii. — [S. 386.]
—— valvata. — Bail S. t. 18.
—— Veronicae. — Lib. 173., transit in Lasiobotrydem.
—— Xylostei. — [S. 425.]
—— Zollingeri. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 15.
Dothiora. — [S. 418.]
Dryophilum. — [S. 484. 518.]
Dubenia. — [S. 356.]
Dumortiera rostrata. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 14. (Wstd.). — Wstd. 1251.

Ecchyna. — [S. 446***.]
Echinobotryum. — [S. 523.]
—— atrum. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 5—7. — R. f. 383. — Bon. t. 10. f. 218d. — Kl. 1585. — Sturm h. 12. t. 26.
Ectostroma. — [S. 371*. 519.] — non est fungus.
—— Hederae. — Dsm. 1454.
—— Iberidis. — Kl. 866.
—— Iridis. — [S. 520.]
—— Liriodendri Fr. — Dsm. 1451. — Wstd. 480.
—— Oleae Cast. — Dsm. 1453.
—— Plantaginis Lasch. — Kl. 1393.
—— Quercus Rob. — Dsm. 1452.
—— Sedi Fr. — Voges. 988. — Kl. 769. — Wstd. 1243.
—— thoracella. — [S. 520.]
—— Tiliae. — [S. 520.]
Elaphomyces. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 1. f. 2. 3. (Anat. Tul.).
—— aculeatus. — Vitt. t. 3, 12.
—— anthracinus. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 19. f. 5. — Vitt. t. 3. 8.
—— asperulus. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 3. f. 9. — Vitt. t. 4, 6.
—— atropurpureus. — Vitt. t. 4, 1.
—— citrinus. — Vitt. t. 4, 16. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 11. (Vittad.).
—— cyanosporus. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 5.
Elaphomyces decipiens. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 4. (Vittad.). — Sturm h. 19—. t. 11. (Cd.).
—— echinatus. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 6. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 3. f. 6.
—— granulatus. — [S. 445.] — Dsm. 406. — Fl. dan. XI. 1969. 1. — gr. (et asperulus): Voges. 282. — Brit. f. 279; 306. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 10. (Fructif. Berk.). — Bisch. f. 3659. — Fuck. s. 302. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 7. (Vittad.). — Krbh. t. 60. ex p. 1. cf. muricat. Fr. Cd. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 4. — Berg, Charakterist. 1860. t. 1. f. 4. — Kl. 102. — Kl. II. 144. — Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 13. (Anat. Fructif.). — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 24—33. (Fructif.).
—— hirtus. — Pay. b. cr. p. 100. f. 466.
—— leucosporus. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 1. (Vittad.).
—— Leveillei. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 7; t. 19. f. 2.
—— maculatus. — Vitt. t. 4, 5.
—— Morettii. — Vitt. t. 4, 17.
—— muricatus Fr. — [S. 445.] — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 97.
—— mutabilis. — Vitt. t. 4, 14. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 9. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 19. f. 3.
—— —— v. flocciger. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 1.
—— papillatus. — Vitt. t. 4, 3.
—— Persoonii. — Vitt. t. 4, 18.
—— pyriformis. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 2. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 3. f. 4.
—— reticulatus. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 10. (Vittad.).
—— rugosus. — [S. 445.]
—— variegatus. — [S. 445.] — Tul. F. hyp. t. 3. f. 8. — Berk. Out. t. 23. f. 3. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 8. (Vittad.).
—— —— Vitt.? = muricat. Fr. — Vitt. t. 4, 4.
—— vulgaris.
—— —— Cd. St. — cf. muricatus Fr.: Cd. Ic. — Schnzl. t. 14. f. 49. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 11—13; — t. H. f. 78: 20—22. (—25.?).
—— vulgaris columellifer. — Sturm h. 19—. t. 10. (Cd.).
—— —— granulatus. — Sturm h. 19—. t. 8. (Cd.).
—— —— muricatus. — Sturm h. 19—. t. 7. (Cd.).
—— —— variegatus. — Sturm h. 19—. t. 9. (Cd.).
Elvella cucullata Batsch. = Mitrula Heyderi Fl. dan.
—— Brassicae. — Wstd. 182.
—— ciliata. — Wstd. 141.
—— lubrica Scop. — Wstd. 763.
—— mesenterica. — Wstd. 140.
—— pulla. — Wstd. 191.
—— tubaeformis Schff. — Wstd. 1390.
Embolus. — [S. 521.]
—— crocatus. — Wstd. 81.
—— sepulcralis. — Wstd. 18.
Emericella variecolor. — Berk. In. p. 341. f. 76.
Empusa. — [S. 494.]
—— Culicis A. Br. — cf. Entomophth. C.
—— Muscae. — [S. 494. Spor.] — Nov. Act. XXV. I. t. 9—11. (Cohn). — Kl. 1973. — Virchow's Arch. f. path. Anat. 1857. XII. t. 6. f. 1—15. (Leb.): Myiophyton Cohnii. — cf. Entomophth. M. — Bail, Verh. d. 35. Naturf. Vers. Königsberg. 1860. Bot. t. 1. 2: zu Achlya prolif. Ns. u. Mucor Mucedo.
Enchnoa. — [S. 410.]


Bothiora sphaeroidea Fr. S.v.Sc et S.m. ii. p. 552.


Entomophthora Planchoniana M. Cornu note in Bull. Soc. Bot. XX. p. 189. (1873) — Et alt. spec.

Eriosp. Leucost. Not. of Sitzb. Ber. XL. n. 438. Pl. XI. f. 1.

rotheca, Uncinula. — Verh. naturf. Freunde. Berlin. 1829. I. t. 1. f. 5. p. 46. (Sporang. S—l.).
Erysiphe Aceris DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 2. 3. (Uncin. bicorn. Lév.). — Wstd. 551. = E. Mariss. Wstd.; 550.
—— adunca Wllr. — [S. 406.] — Kl. 955. (cf. Uncinula). — Schnzl. t. 14. f. 5—8. 10.
—— —— Grev.: E. Salicis Tul.
—— —— Amentaceorum (Salic.). — Kl. II. 464. — Dsm. 1845.
—— —— Mali. — Wstd. 971.
—— —— Populorum. — Kl. II. 465. — R. f. 560.
—— —— Prunastri Lk. — Dsm. 706. — Erys. Prun. Tul. = Wstd. 969.
—— —— Rosacearum (Prunastri). — Kl. II. 758. — R. f. 565. b. (v. Pruni).
—— —— Ulmorum. — Kl. II. 466. (cf. Uncinula Bivonae). — Dsm. 220.
—— Alchemillae Dub. — Sphaerotheca Cast.
—— Alni DC. — Tul. Sel. I. t. 2. f. 5—7. (penicill. Alni Lk., Microsph. penicill. Lév.). — Wstd. 831.
—— Aphanis Lk. — Dsm. 703.
—— Apii Wllr. — Wstd. 841.
—— Aquilegiae. — Wstd. 408.
—— areolata Wllr. — Wstd. 567.
—— arillata v. Ranunc. Wllr. — Wstd. 678. 1181: v. Colchici.
—— Armeriae Wllr. — Wstd. 1166.
—— Astragali. — Dsm. 221. — Kl. 441. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 2. — Wstd. 1059. (= holoseric. L.). — Microsph. holos. Lév.
—— baccata Wllr. = Ustilago purp. B. — Wstd. 750.
—— Baryana Voigt. — cf. Podosphaera Kunzei.
—— Berberidis DC. — Wstd. 738. — Tul. Sel. I. t. 5. f. 1. (E. penic. Berb. Lk., Microsph. Berb. Lév.).
—— Betulae DC. — Kl. 144.
—— betulina. — Wstd. 129.
—— bicornis. — [S. 406.] — Cd. Anl. t. F. f. 53: 14—18. — Kl. 179. — (Uncinula) Fuck. s. 486. — Norweg. 181. — Wstd. 550. — Krypt. Bad. 51.
—— —— f. Acerum. — Dsm. 512. — R. f. 559.
—— biocellata Ehrb. — Wstd. 553.
—— Brayana Voit. — Kl. 835. (Podosphaer. Kunzei).
—— Capreae Dub. — Wstd. 80. — E. Salicis Tul.
—— Caprearum Wllr. — Wstd. 670.
—— Cichoracearum. — Wstd. 226. — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 1. f. 1—11. (Fructif.).
—— cinnamomea Wllr. — Polygoni: Wstd. 283; Betarum 286; Rumicum 285; Phaseolorum 387; Fabarum 284; Valerianae 571; Viciar. 846; Violar. 840.
—— circumfusa S—l. — Dsm. 111.
—— —— f. Bidentis. — Kl. 445. — Kl. II. 468.
—— —— f. Eupatorii. — Kl. II. 467.
—— clandestina. — [S. 406.] — Kl. 1637.
—— —— Biv. = Erys. Bivonae Tul. Sel. I. 200.
—— —— Lk. = E. Oxyac. Tul. — Bivona t. 4. f. 4.
—— —— Oxyacanthae Lk.? — Dsm. 219. (guttata?). — Wstd. 280.
—— comata Lk. — Fuck. s. 480. (Microsphaera com.).
—— communis. — [S. 406.] — Kl. 1343. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 11. f. 38. (Lév.). — Tul. Sel. I. t. 5. f. 3. (E. comm. Hyper. Fr.). — Letell. 655. 1. — Journ. hort. soc. 1854. IX. p. 68. f. 1. 2. (cum pycnidiis, Berk.).
—— —— f. Aquilegiae. — Wstd. 408.

Erysiphe communis f. Asperifol. — Dsm. 509. — Wstd. 553.
—— —— f. biocellaris Fr. — Bisch. f. 3698.
—— —— f. Calendulae. — Wstd. 972.
—— —— f. Calthae. — Fuck. s. 476. f.
—— —— f. Carduacearum. — Kl. 60. — Brit. f. 202. 269.
—— —— f. Caryophyllacearum: Lychnidis. — Kl. 656.
—— —— f. Cichoracearum Lk. — Dsm. 704. — Wstd. 226.
—— —— f. Compositarum:
—— —— —— Artemisiae (cf. E. taurica). — Kl. 740.
—— —— —— Calendulae. — Kl. 940.
—— —— —— Cirsii. — Kl. 942.
—— —— —— Erigeri. — Kl. 943.
—— —— —— Tanaceti. — Kl. II. 485.
—— —— —— Taraxaci. — Kl. II. 484.
—— —— f. conidifera. — Kl. II. 757.
—— —— f. Convolvulacearum. — Kl. II. 476. — Fuck. s. 476. c.
—— —— f. Cruciferarum. — Kl. II. 487.
—— —— —— Hesperidis. — Kl. 938.
—— —— v. depressa. — cf. Er. dep.
—— —— f. Dipsacearum. — Kl. 651. (cf. f. Knautiae). — Dsm. 1848.
—— —— f. Geranii. — Kl. 64.
—— —— f. Graminearum. — Kl. II. 759. — cf. Er. Graminis Lév.
—— —— f. Graminis. — Wstd. 554.
—— —— f. Heraclei. — Kl. 269.
—— —— f. Humuli. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 450. (ic.).
—— —— f. Hyperici. — Brit. f. 200. — Kl. 1134. (cf. E. Martii; E. comm. Tul. Sel. I. t. 5. f. 3.) [Dsm. III. 672.] — R. f. 563.
—— —— f. Knautiae. — Fuck. s. 476. d.
—— —— f. Labiatarum. — Wstd. 409. — Dsm. 1017.
—— —— f. Lathyri. — Kl. 834. — Fuck. s. 476. b. — R. f. 562.
—— —— f. Leguminosarum. — Kl. 652. (cf. E. Martii). — Kl. II. 670. — Brit. f. 201. — Wstd. 120.
—— —— —— Medicaginis. — Kl. 939.
—— —— —— Ononidis. — Kl. 1230. — Kl. II. 479. — Fuck. s. 476. a.
—— —— —— Pisi. — Kl. II. 480. — Dsm. 813.
—— —— —— Trifolii. — R. f. 562.
—— —— —— Viciae. — Kl. II. 760.
—— —— f. Onagrariae. — Dsm. 508. — Wstd. 737.
—— —— f. Personatarum. — Kl. 1745.
—— —— f. Plantaginearum. — Kl. 268.
—— —— f. Polygonorum. — Dsm. 109. — Kl. II. 486. — Fuck. s. 476. e. — Brit. f. 203. — Wstd. 830.
—— —— f. Potentillarum. — Brit. f. 313.
—— —— f. Ranunculacearum. — Dsm. 1018. — Kl. 61. — Dsm. III. 671. — Wstd. 408, 553, 1389.
—— —— —— Aquilegiae. — Kl. 947. — Kl. II. 483.
—— —— —— Calthae. — Kl. II. 482.
—— —— —— Ranunculi. — Kl. II. 481.
—— —— f. Rubiacearum. — Kl. II. 478. — Wstd. 1058. — cf. E. Martii.
—— —— f. Rumicis. — Fuck. s. 476. h.
—— —— f. Sambuci. — Kl. 654.
—— —— f. Scabiosae. — Kl. 941.
—— —— f. Solanacearum. —






— Gentiana Pers. — Trochila Sutu Discom. p. 14.

Exoasc. Pruni de Bar. — Bull. Soc. Bot. XI. 216.

Eurotium Pyrobolus. — [S. 408.]
—— Rosarum Grev. — Loud. f. 16549. — Erysiphe pannosa Tul., Sphaeroth. pann.
Eustegia. — cf. Stegia.
—— arundinacea. — Voges. 983.
—— Ilicis Fr. — Kl. 431. — Lib. 45. — Wstd. 36. — Ital. 538.
—— —— v. Hederae. — Wstd. 45.
Eustilbum Rehmianum Rbh. — Hdw. II. 1862. t. 10. f. 3: 2. (rechts unten, bez. c. b.).
Excipula. — [S. 403.]
—— aspera. — [S. 403.] — Voges. 886. — Wstd. 1278.
—— Betulae. — Fuck. s. 496.
—— chaetostroma. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 2. (B. B.).
—— corvina. — [S. 403.]
—— Empetri. — [S. 403.]
—— Eryngii. — Bail S. t. 15. — Fuck. s. 498.
—— fusispora. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 1. (B. B.). — R. f. 155.
—— Galii Lasch. — Kl. 678.
—— Gentianae. cf. Peziza.
—— graminis. — Dinemasporium.
—— graminum. — Brit. f. 326. — Wstd. 184.
—— Heraclei Fr. — Kl. 875. — Fuck. s. 497.
—— herbarum. — [S. 403.]
—— hirta. — [S. 403.]
—— immersa. — Dsm. III. 268.
—— melanophaea. — [S. 403.]
—— ornata. — [S. 367.] — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 2. (Notar.).
—— phaeotricha Rbh. — Kl. II. 515.
—— punctiformis. — [S. 403.]
—— Ranunculi? — Kl. 1538.
—— Rubi Fr. — [S. 403.] — Dsm. 1031. — Wstd. 1277.
—— sphaerioides. — [S. 403.]
—— Stellariae Lasch. — Kl. 1235.
—— strigosa Cd. — Kl. 1236. — Kl. II. 60. u. 516.
—— turgida. — [S. 403.] — Wstd. 1279.
—— Typhae Lasch. — Kl. 677.
—— Vermicularia. — [S. 367. 1.] — Cd. Anl. t. F. f. 60: 17—20. — Fuck. s. 495. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 9. (Hoffm.).
Exidia. — [S. 340.] cf. Auricularia, Hirneola.
—— agaricina. — Chile n. 7. f. 11.
—— ampla. — Nederl. kruidkdg. Archief. 1848. I. p. 364. c. ic. (Dozy.).
—— auricula Judae. — [S. 340.] — Cd. Anl. t. G. f. 70: 12—17. — Fuck. s. 890. — Dsm. 1279. — Loud. f. 16296. — Berk. Out. t. 18. f. 7. — Hrz. t. 45. — Sturm h. 19—. t. 6. (Cd.). — Schnzl. t. 16. f. 29—32. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 9. — Kl. 147. — Kl. II. 304. — Voges. 993. — Carol. I. 34. — Huss. I. 53. — Wstd. 760. — Vent. mi. 27. f. 1—3. — Ital. 337.
—— depressa. — Bon. t. 12. f. 244.
—— flaccida E. B. — Loud. f. 16298.
—— glandulosa Fr. — [S. 340.] — Kl. 234. — Dsm. 1278. — Kl. II. 241. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 33. (Keimg. Hoffm.). — cf. Ex. spiculosa, Tremella. — Voges. 395. — Brit. f. 71. — Carol. I. 35. — Huss. I. 42. — Lib. 332. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 5. (var.).
—— impressa. — [S. 341.] — cf. Exid. depressa Bon.
—— lobata. — Sommerf. in Tidsk. natur. Christian. 1827. c. ic. — Norweg. 185.
—— pithya. — [S. 341.]
Exidia plicata. — cf. Tremella plic.
—— porphyra Lév. — Bonit. t. 139. f. 3.
—— purpurascens. — Jungh. pr. t. 4. f. 13.
—— recisa. — [S. 340.] — Bisch. f. 3399. — Fuck. s. 889. — Loud. f. 16297. — Kl. 330. — Kl. II. 416. — Dsm. III. 270. — Lib. 134. (Tremella).
—— repanda. — [S. 341.] — Kl. 245. — Kl. II. 240.
—— rosea. — Pay. b. cr. p. 75. f. 311.
—— rufa. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 17. p. 384. (Berk.).
—— sacharina. — [S. 340.] — Kl. 1611. — Kl. II. 242. — cf. Tremella sach.
—— spiculosa. (= glandulosa). — Ann. sc. n. 1853. XIX. t. 11. (Tul.). — Norweg. 184.
—— straminea Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 4.
—— truncata. — [S. 340.]
—— vitellina. — Chile n. 7. f. 12.
Exoascus Pruni. — Fuck. Nass. f. 26. p. 29. — Fuck. s. 189. — ?cf. Ascomyc. bullat. Berk. In. p. 281. f. 66.
Exosporium. — [S. 419 ***. 475.]
—— clavuligerum. — [S. 475.]
—— Dematium Lk. — Wstd. 578.
—— depazeoides. — Dsm. 1549.
—— Eryngii. — [S. 475.] — Dsm. 145.
—— Genistae. — [S. 475.]
—— hispidulum. — [S. 420.]
—— hypodermium. — [S. 420.]
—— Lilacis. — Dsm. 1550. — Voges. 1311. — Wstd. 986.
—— Lolii. — Wstd. 415.
—— macrochaetum. — Dsm. III. 23. — Wstd. 1240.
—— maculans. — [S. 420.] — Wstd. 579.
—— minutum Lk. — Dsm. 144. u. 1518. — Lib. 350. (Vermicul.).
—— Ononidis. — Fuck. rh. 230.
—— pulvinatum. — Wstd. 183.
—— Rubi Ns. — Lib. 95. — Kl. 576.
—— Tiliae. — [S. 475.] — Cd. Anl. t. G. f. 69: 4—6. — Fuck. s. 228. — Loud. f. 16604. — Kl. II. 782. — Krypt. Bad. 418. — Dsm. 176. (ex Tul.). — Voges. 1099. (Helminthosp. Til. Lk.), — 574! — Fuck. rh. 229.
—— trichellum. — Wstd. 133.

Farinacea seminaria Sow. — Wstd. 435.
—— sulphurea Sow. — Wstd. 400.
Favolus. — [S. 325.]
—— Boucheanus Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 5. — Bail S. t. 30.
—— brasiliensis. — Linn. 1830. V. t. XI. f. 1. (Fries).
—— ciliaris. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 15. f. 2. (Mont.).
—— cucullatus Mt. — Sagra Cuba t. 14. f. 2.
—— fissus Lév. — Bonite t. 136. f. 3. — Pay. b. cr. p. 107. f. 489.
—— glaber. — Cd. Anl. t. H. f. 75: 29. 30.
—— nummularius. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 15. (Berk.).
—— pusillus. — Linn. 1830. V. t. 11. f. 2. (Fries). — Bisch. f. 3408.
—— Sprucei. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 8.
Femsjonia. — [S. 341.]
Fibrillaria. — [S. 496 **. 521.]
—— subterranea. — ?Daedaleae quercinae status abnormis; Tul. F. hyp. t. 21. f. 12. — Wstd. 1255.
—— vinaria Sow. — Wstd. 195.



Fusisporium. — [S. 472 ***. 473.]
—— aequivocum Ces. — Kl. II. 597.
—— album D. — [S. 473.] — Dsm. 229. — Brit. f. 321. — Wstd. 867.
—— arachnoideum. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 5.
—— argillaceum. — [S. 473.] — Fuck. rh. 226.
—— aurantiacum. — [S. 473.] — Ung. Ex. t. 2. f. 13. — Bisch. f. 3804. — Carol. III. 79.
—— aureum. — [S. 473.]
—— bacilligerum Berk. — R. f. 177.
—— Betae. — [S. 473.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 18. f. 2. (Dsm.). — cf. Fusarium B. Fusicolla B. Bon. — Dsm. 104. — Voges. 1098. — Wstd. 496.
—— Biasolettianum. — [S. 473.]
—— Buxi. — Flora 1847. no. 1. f. 13. (Fresen.) cf. Psilonia. — Dsm. 228. — Voges. 1191. — Brit. f. 55. — Wstd. 49. — Chaetostr. B. Cd. II. f. 107.
—— calceum. — Dsm. 651. (Oid. fusispord. Fr.). Kl. II. 491.
—— candidum. — Bon. t. 6. f. 140.
—— cinnabarinum. — Carol. III. 80.
—— concors. — Casp. Schimmel. f. 18—21. — Kl. II. 277.
—— didymum Hg. — zu F. Solani.
—— ebulliens. — [S. 473.] Kl. 1683.
—— Equiseti. — Kl. II. 278.
—— equiv. cf. aeq.
—— flavidum. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 3. p. 191. (Bon.).
—— flavo-virens Fr. — [S. 473.] Bisch. f. 3777. — Dsm. 105. — Brit. f. 213.
—— fungicolum (Sporotrichum). — Cd. Ic. VI. t. 1. f. 4. d. u. 7.
—— Georginae. — Kl. 186.
—— Graminum. — Fuck. rh. 225.
—— griseum Lk. (Fusid.). — [S. 473.] Kl. II. 596. — Dsm. 1730. 1731. — cf. Polyscytalum fecundiss.
—— incarnatum Rob. — Dsm. 1303.
—— inosculans = Keimung von Tilletia Caries (Berk. Intr. cr. Bot. 321. u. Journ. hort. soc. 1847. II. p. 113.) (Berk.).
—— lacteum. — cf. Oidium fusisporioides (Violae). — R. f. 277. — Wstd. 1300.
—— melanochlorum. — Casp. Schimmel. f. 1—17.
—— pallidum. — Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. t. 8. f. 2. (Niessl.).
—— —— Ns. cf. Fusidium cand.
—— palustre Chev. — = Psilonia Arundinis Dsm. Fr.
—— pyrinum. — [S. 473.]
—— rhizophilum.
—— —— v. Betae. — Wstd. 496.
—— —— v. Solani tuberosi. — Wstd. 496.
—— sanguineum Fr. — [S. 473.] — Fuck. s. 230 (Fusicolla Bon.). — Fuck. rh. 224.
—— Solani. — [S. 473.] — André ökonom. Neuigk. 1847. t. 4. f. 10. 11. — de Bary, Kartoffelkrkh. 1861. f. 12. — Flora. 1847. n. 1. f. 1—3 — ff? (Fresen.). — Seubert, Lehrb. d. Pflanzenkunde. I. p. 84. (ic.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 140. f. 8. — Schacht, Kart. t. 9. f. 20; t. 10. f. 1. — Kl. 995. — Müller, Pflzenstaat. 1860. p. 265. 4. (Copie). — Wstd. 496.
—— udum. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 28. (Berk.).
—— Urticae Dsm. cf. Oid. fusisporioid. v. — Wstd. 197. — Oid. concentr. B. B.
—— Zeae. — Wstd. 594.
Fusoma. — [S. 423 **.]
Fusoma glandarium. — Pay. b. cr. p. 61. f. 258.
—— Vaccinii. cf. Fusidium.

Gasteromyces farinosus. — Palaeont. X. t. 6. 1861. (Ludwg.).
Gautiera. — [S. 435.]
—— graveolens Vitt. — Vitt. t. 4, 13. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 63.
—— morchellaeformis Vitt. — Vitt. t. 3, 6. — Cd. Ic. VI. t. 7. f. 62. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 1—3. — Bail S. t. 27. — R. f. 240.
Geaster. — [S. 441. cf. Myriostoma, Plecostoma. — Ann. sc. n. 1842. XVIII. t. 5. 6. (Fructif. Tul.). — Flora 1843. I. t. 2. (Tul.) — Müller Pflzenstaat 1860. p. 268. f. 8. 9.
—— Bryantii. — Brit. f. 198.
—— Cesatii. — Kl. 1631. — Kl. II. 141. — Ital. 590.
—— coliformis. — Loud. f. 16513.
—— Drummondii. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 4.
—— fimbriatus Fr. — [S. 441.] Dsm. 256. — R. f. 165. u. 131. — Berk. Out. t. 20. f. 4. — Fuck. s. 315. (hygr.) — Ann. sc. n. 1842. XVIII. t. 5. f. 8—13: tunic. (Fruct., Tul.) — Voges. 1274. — Vent. mi. 65. f. 8.
—— fornicatus Fr. — [S. 441.] — Bisch. f. 3635. — Kl. II. 140. — R. f. 430.
—— —— Schff.: Voges. 1185.
—— hygrometricus. — [S. 441.] — Dsm. 255. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 12. (Vittad.). — Bisch. f. 3632. — Schnzl. t. 11. f. 45. — Kl. 341. — Fuck. s. 315: fimbriatus Fr. — Voges. 1193. — Carol. III. 75. — Auerswald, Bot. Unterhaltung. 1863. S. 381.
—— lageniformis. — Pay. b. cr. p. 113. f. 519.
—— limbatus. — [S. 441.] — Cd. Anl. t. D. f. 43: 10. 11. — Bisch. f. 3636. 3637. — ? Purton. II. t. 20. — Huss. 1. 2.
—— mammosus Fr. — [S. 441.] — Kops. Fl. bat. X. 750. 1.
—— minimus. — Carol. III. 74.
—— mirabilis. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 8. (Mont.).
—— multifidus. — Lindl. v. K. p. 29. f. 2.
—— quadrifidus cf. fornic.
—— rufescens. — [S. 441.] — Pay. b. cr. p. 101. f. 469. — Brit. f. 275. (v. minor).
—— saccatus. — Carol. I. 77.
—— Schmidelii. — Pay. b. cr. p. 63. f. 281.
—— Sowerbyi. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 6—9.
—— stellatus. — Loud. f. 16516.
—— —— Wallr.: multifid.
—— striatus. — [S. 441.] — Kl. 173. — Fuck. s. 316.
—— triplex. — Tydschr. v. nat. Geschied. 1840. VII. t. 8. f. 1—3. (Jungh.).
—— tunicatus. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 3. (Vittad.). — Tul. F. hyp. t. 21. f. 9. (cf. fimbr.).
—— umbilicatus. — [S. 441.] — Chile n. 10. f. 10.
—— vulgaris. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 42. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 1—5.
Genabea. — [S. 445.]
—— fragilis. — Tul. F. hyp. t. 8. f. 3; t. 16. f. 2.
Genea. — [S. 374. 438.]
—— bombycina. — Vitt. t. 3, 13. u. t. 4, 8.
—— hispidula B. — Cd. Ic. VI. t. 13. f. 109. (papillosa; p. 59.). — Tul. F. hyp. t. 12. f. 2; t. 13. f. 3. — cf. papillosa Cd.
—— Klotzschii Cd. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 101. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 4. — Bail S. t. 13.

Genea Kunzeana Zob. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 102. (verruc. p. 56.).
—— Lespiaultii Cd. — Cd. Ic. VI. t. 12. f. 105.
—— papillosa Berk. Vitt. = hispidula. — Vitt. t. 3, 18.
—— perlata Cd. — Cd. Ic. VI. t. 12. f. 104.
—— pulchra Cd. — Cd. Ic. VI. t. 11. f. 103. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 7.
—— sphaerica. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 2; — t. 12. f. 1; t. 13. f. 6.
—— verrucosa. — Vitt. t. 2, 7. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 5—7. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 1; t. 12. f. 3; t. 13. f. 5. — Pay. b. cr. p. 100. f. 465.
—— —— Kl. cf. G. Klotzschii Cd.
—— —— Kz. cf. G. Kunzeana Zob.
Geoglossum. — [S. 347.] — Bail S. t. 21.
—— aeruginosum S. K. — Wstd. 863.
—— atropurpureum. — [S. 347.]
—— difforme. — [S. 347.] — Kl. II. 424 (: glabr.). — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 50. (Spor. Berk.). — Brit. f. 256.
—— diffusum. — Kützg. Philos. Bot. 1852. t. 20. f. 1.
—— glabrum. — [S. 347.] — Kops Fl. bat. XI. 829. 3. — Kl. II. 424. (diff.). — Cd. Anl. t. G. f. 65: 1—4. — Bisch. f. 3379. — Kl. 239. — Kl. II. 238. — Voges. 95. — Sturm h. 14. t. 59.
—— —— paludos. — Voges. 684 (Sphagnor.). — Wstd. 761. — Krypt. Bad. 55.
—— glutinosum P. — [S. 347.] — Kl. 611. — Kl. II. 319. — Dsm. 352. — Wstd. 863.
—— —— lubricum. — Voges. 780.
—— hirsutum. — [S. 347.] — Cd. Anl. t. G. f. 65: 5—8. — Berk. Out. t. 22. f. 2. — Bisch. f. 3380. 3384. — Loud. f. 16184. — Sturm h. 31 —. t. 16 (Szl.). — Kl. 44. — Kl. II. 237. — Fuck. s. 870. — Wstd. 1084. — Voges. 91. — R. f. 523. a. b.
—— —— v. capitatum P. — Kl. 642.
—— mitratum viride Holmsks. — Wstd. 863.
—— olivaceum. — Berk. Out. t. 22. f. 3.
—— ozonoides. — Letell. 672. (huc Ozonium fulvum P. p. pte.).
—— rugosum Lasch. — Kl. 816.
—— Sphagnorum. — Voges. 684. (G. glabr. paludos.).
—— viride. — [S. 347.] — Dsm. 353. — Bisch. f. 3389. — Fuck. s. 869. — Loud. f. 16187. — Pay. b. cr. p. 85. f. 379. — Schnzl. t. 16. f. 11. 12. — Kl. 1613. — Kl. II. 239. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 146—148. (Fruct. Phöb.). — Müller, Pflzenstaat. 1860. p. 271. — Voges. 994. — Lib. 123. — Wstd. 863. — R. f. 524. — Sturm h. 3. t. 48.
—— viscosum P. — [S. 347.] — Loud. f. 16186.
Geotrichum. — [S. 521.]
Gibbera. — [S. 402.] cf. Sphaeria.
—— glaucina. — [S. 402.]
—— obturata. — [S. 402.]
—— obtusata. — [S. 391: 81.]
—— oppilata. — [S. 402.]
—— plinthis. — [S. 402.]
—— pulicaris Fr. — [S. 402.] — Fuck. s. 501.
—— Vaccinii. — [S. 402.] — Kl. II. 435.
Gibberidia. — [S. 395.] cf. Sphaeria.
—— Berberidis. — Kl. II. 653.
—— Spartii. — Kl. II. 726.
Glaeospor. cf. Gloeosp.
Glenospora Curtisii. — cf. ramor. — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 260. f. 11. (B. D.).
—— ramorum. — Carol. I. 87. (Demat. r. Schw.).
Gliocladium. — [S. 490.]
Gliostroma. — [S. 471.]
—— pezizoides. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 13—15.
Gliotrichum. — [S. 466.]
—— virescens Eschw. — Bisch. f. 3761.
Gloeoporus. — [S. 325.]
—— conchoides Mtg. — Sagra, Cuba t. 15. f. 1. — Carol. I. 22. (? Polypor. nigropurpurascens Schw.).
Gloeosporium acerinum. — Wstd. 979.
—— alneum. — Wstd. 977.
—— andurnense Ces. — R. f. 98. — Ital. 317.
—— Aurantiorum. — Wstd. 1188.
—— Betuli. — Wstd. 978.
—— Carpini. — Dsm. III. 4. — Wstd. 976. — Fuck. rh. 202.
—— Castagnei. — Voges. 1484. — Castagne, Marseill. t. 9. — Fuck. rh. 200.
—— concentricum. — Journ. hort. soc. 1851. VI. p. 121 (Berk.).
—— Delastri Lacr. — Dsm. III. 752. — R. f. 386. — Fuck. rh. 199.
—— Fagi. — Wstd. 1187.
—— Juglandis. — Fuck. rh. 201.
—— Mougeotii. — Dsm. 1728. — Voges. 1348.
—— Populi. — Dsm. 1729; — III. 251.
—— quercinum. — Wstd. 981.
—— Robergei. — Dsm. III. 3. — Wstd. 975.
—— Rubi. — Wstd. 980.
—— Salicis. — Wstd. 1269.
—— Veronicarum Ces. — R. f. 97. — Fuck. rh. 19[illegible].
Glomus. — [S. 438.]
—— macrocarpus T. cf. Endogone m.
Gloniopsis decipiens Not. — Kl. II. 573. (Hysterium dec. Dub.). — Atti VIII. riun. scienz. ital. cum icone (Not.).
Glonium. — [S. 367.]
—— caenobituum. — Dub. Hyst. t. 2. f. 18.
—— confluens. — Dub. Hyst. t. 2. f. 17. (Hyster. aggregatum Wllr. ex Dub.).
—— dives Not. = Hysterium div. Not. (Dub.).
—— graphicum Dub. = Hysterium g. Dub., contortum Ditm. (Sturm).
—— lepidum. — Dub. Hyst. t. 2. f. 19.
—— lineare Not. — Hysterium angustatum Moug. Wllr. (Dub. 35.).
—— Mühlenbergii. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 13—17.
—— stellare. — [S. 367.]
—— stellatum. — Carol. III. 43. — Bail S. t. 18.
—— —— Mühl. = Solenarium Mühl. Kz. (Dub. 35.).
Glutinium. — [S. 400 **. 466.]
Gnomonia. — cf. Sphaeria.
Gomphidius. cf. Agaricus.
—— glutinosus. — [S. 306.] — Loud. f. 16019. — Bail S. t. 34. — Schnzl. t. 16. f. 18—22. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 19. a. (Basid. Hoffm.). — Letell. 617. — Sturm h. 14. t. 51.
—— rhodoxanthus. — [S. 306 ***.]
—— rutilus Fr. — Loud. f. 16050. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 31—33. (Fructif. Berk.). — cf. viscid.
—— stillatus. — Sturm h. 33 —. t. 2. (Strauss).
—— viscidus. — [S. 306.] cf. rutil. — Letell. 647.
Gomphinaria amoena Preuss. — Sturm. h. 35. t. 12.
Gomphus. cf. Gomphidius. [S. 330.: Craterell.]
Gonatobotrys. — [S. 492.]
—— flava. — Bon. t. 7. f. 151.
—— ramosa. — Fres. t. 5. f. 22. 23.
—— simplex. — Bon. t. 7. f. 153. — Pay. b. cr. p. 104. f. 479. — Kl. 1373.

Gloeosp. Notarisii Desm. Notizie 6ª Cent. Nº 79 in annot. Syn.
Myxosporium paradoxum Notaris Micr. Dec. II. Nº 10.

Gyrocephalus aginnensis Brond. in Mem.
Soc. Linn. 1824. p. 74. Pl. III.

Helm. Rousselianum Montg 6e Cent. N° 84. –

Hend. Camphorosmæ Montg. 6e Cent. — Syllog. p. 262 —

— Graminicola Léveil. Champ. du Museum N° 425. —


Hend. Lonicerae Fr. — Diplodia polymorpha West. Sec. IV. Icon. V. —

Helotium fimetarium Fr. Su.: Fuck. s. 805. = Pez. fimetar. Fr. S. m. — Leotia fim. P. — Stilbum erythrocephal. Rbh. hb. myc., non Ditm. ap. Sturm. — Ditiola fimetaria Awd. — Helotium claviculare Wllr. cf. Kl. II. 703.— [S. 355.]
—— flavovirens. — [S. 355.]
—— glabrum. — [S. 354 *.] — Cd. Anl. t. G. f. 73: 19—22. — Kl. 1227.
—— herbarum. — [S. 356.]
—— hirsutum. — [S. 354 *.] — Ann. sc. n. 1828. XIII. t. 10. f. 2. (Dufour).
—— janthinum. — [S. 355.]
—— imberbe. — [S. 356.]
—— infundibul. — [S. 355.]
—— kermesinum. — [S. 356.]
—— lenticulare. — [S. 356.]
—— luteo-virens. — [S. 356.]
—— lutescens. — [S. 355.]
—— Marchantiae. — [S. 356.]
—— melanopus. — [S. 354 *.] — Wstd. 586.
—— nigripes Schum. = Peziza lenticularis Fl. dan. [S. 356. 33.]
—— pallescens. — [S. 355.]
—— perpusillum. — Kl. 1227. (t. XVII).
—— phascoides. — [S. 355.]
—— phyllophilum. — [S. 356.]
—— punctatum. — [S. 356.]
—— rhodoleucum Fr. — [S. 355.] — Kl. 1221.
—— roseum. — [S. 355.]
—— salicellum. — [S. 356.]
—— salicinum. — [S. 355.]
—— serotinum. — [S. 355.]
—— sublenticulare. — [S. 355.]
—— subsessile Schum. = Peziza helotioides Fl. dan. [S. 356.]
—— subtile. — [S. 354.]
—— tenerrimum. — [S. 355.]
—— titubans. — Chile n. 8. f. 6.
—— Tuba. — [S. 355.]
—— uliginosum. — [S. 355.]
—— umbonatum. — [S. 354 **.]
—— vaccinum. — [S. 355.]
—— versiforme. — [S. 356.] — Berk. Out. t. 2. f. 6.
—— virgultorum. — [S. 355.] — Kl. 1416. (Pez. fructigena). — Fuck. s. 799. a. b.
Helvella. — cf. Gyromitra.
—— acaulis Huds. — Wstd. 766.
—— agariciformis Sow. = Leotia acic. P. (Tul.).
—— albida P. = elastica Fl.-dan.
—— atra. — [S. 346.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 12. — Kl. 722. — Fuck. s. 874. — R. f. 236.
—— caryophyllea Bolt. — Wstd. 587.
—— cornucopioides Scop. — Wstd. 192.
—— costata. — [S. 348 **.]
—— crispa Fr. — [S. 346.] — Vent. t. 11. f. 110. — Berk. Out. t. 21. f. 4. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 7, 8. — Loud. f. 16200. — Fuck. s. 878. a. b. — Bisch. f. 3274. — R. f. 238. — Brit. f. 264. — ? Purton. II. t. 16.
—— elastica Bull. — [S. 346.] — Fl. dan. XI. 1968. 2. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 70. (Asc.). — Cd. Anl. t. G. f. 67: 4—6. — Lindl. v. K. p. 33. f. 3. 6. (Asc.). — Loud. f. 16204. — Berk. In. p. 36. f. 13. b. — Kl. 137. — R. f. 130. — Brit. f. 266. — Ital. 233.
—— Ephippium Lév. — Dsm. 914. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. f. 7. (Lév.).
—— esculenta P. — Loud. f. 16202. — Hrz. t. 47. — Berk. In. p. 36. f. 13. a. — (Gyromitra) Kl. 138. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. 7. f. 10—13; u. t. 2: 40. (Fructif.). — Schacht, Lehrb. d. An. Phys. 1856. I. t. 1. f. 31, 32. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 7. — Badham t. 14, 1. — Staude t. 1. f. 3.
Helvella esculenta v. suspecta. — Phöb. Gift. t. 9. f. 1. 2.
—— fistulosa A. S. — Fuck. s. 875.
—— gelatinosa. — Bail S. t. 21. — Wstd. 763.
—— grandis. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino).
—— inflata. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino). — Cd. Anl. t. G. f. 67: 9.
—— Infula Sch. — [S. 346.] — Bisch. f. 3313. — Loud. f. 16203. — Ital. 338.
—— Klotzschiana. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 10, 11. — Bisch. f. 3435. — Schnzl. t. 16. f. 6—10. — Sturm h. 14. t. 57.
—— lacunosa Afz. — [S. 346.] — Fl. dan. XI. 1968. 1. — Fuck. s. 877. — Loud. f. 16201. — Bail S. t. 21. — Brit. f. 265. — Badham. t. 14, 2.
—— —— v. minor. — Wstd. 996.
—— leucophaea. — cf. H. Mitra? Roq.
—— —— P. S. = H. crispa Scop. Fr.
—— lutea Berg. — Wstd. 763.
—— mesenterica Dicks. — Wstd. 693.
—— Mitra. — Roq. t. 1. f. 3.
—— —— Schff.: lacunosa Fl. dan. — (crispa?) Purton. II. t. 16. — Vent. mi. 61. f. 1. 2.
—— mitraeformis. — Pay. b. cr. p. 85. f. 384.
—— monachella. — [S. 346.] — Viv. 52. — Wstd. 996. — Vent. mi. 82. f. 5. 6.
—— pezizoides Afz. — [S. 348. 4.] — Kl. 413. — R. f. 237.
—— Pineti. — Wstd. 587.
—— pulla Holmsk. — [S. 346.] — Fl. dan. XII. 2080. 2.
—— pumila. — Vent. mi. 62. f. 3. 4.
—— reflexa. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino).
—— revoluta Gmel. — Wstd. 763.
—— sulcata. — [S. 346.]
—— suspecta. — [S. 346.]
—— tabacina. — Chile n. 8. f. 2.
—— tremellosa. — [S. 346 ***.]
—— tubaeformis Bull. = Cantharell. tub. Fl. dan.
—— venosa. — [S. 346.]
—— verpoides. — [S. 346.]
Hemiscyphe bicolor. — Bon. t. 10. f. 205.
—— stilboidea. — Cd. Anl. t. C. f. 23: 4—6. — Bisch. f. 3797. — Bon. t. 10. f. 206. — Sturm h. 12. t. 28.
—— trigemina. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 562. (Spring.).
Hendersonia. — [S. 416.] (Ascospora, Sphaeria).
—— acinosa. — [S. 416.]
—— acuminata Lév. — Pestalozzia monoch.
—— conorum Lacr. — R. f. 540.
—— Corni. — Fuck. Nass. f. 18. — Fuck. s. 416.
—— Desmazieri (Piestospora) Mt. — Dsm. 1494.
—— elegans. — [S. 416.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 9. (Berk.).
—— eminens (Piestospora). — Dsm. III. 68.
—— exilis. — [S. 416.]
—— fibriseda. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 10.
—— graminicola Lév. — Dsm. 1495.
—— Humuli. — [S. 416.]
—— innumerosa (Piestosp.). — Dsm. III. 71.
—— insidiosa (Sphaerospora). — Dsm. III. 66.
—— Laburni. — Bull. ac. belg. 2. Ser. 1857. II. p. 579. f. 2. (Wstd.). — Wstd. 1370.
—— lichenicola Somm. — [S. 416.] — Kl. 1166. (Sporoc. ros.).
—— Lonicerae. — [S. 416.]

Hendersonia Lupuli. — Voges. 1268.
—— Luzulae. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 3. (Wstd.).
—— macrospora Berk. — ? Wstd. 1223.
—— Mespili. — Bull. ac. belg. 1857. II. p. 579. f. 1. (Wstd.). — Wstd. 1225.
—— mutabilis. — Hook. J. 1851. III. t. 10. f. 6.
—— neglecta. — Wstd. 1224.
—— nodor. Lacr. — cf. H. sarment.
—— Oleae (Sphaerospora D. — Dsm. 1488.
—— —— v. Phyllireae. — Dsm. 1489. — Voges. 1269.
—— —— v. Bupleuri. — Dsm. 1490.
—— Philadelphi. — Wstd. 1223.
—— Phragmitidis (Piestosp.). — Dsm. III. 70.
—— polycystis. — R. f. 264.
—— Populi. — [S. 416.]
—— Pyri. — Fuck. Nass. f. 17. — Fuck. s. 415.
—— Rosae Fr. — [S. 416.] = Sporocadus rosaecola Rbh. — Fuck. s. 414.
—— sarmentorum Wstd. — Bull. ac. belg. Ser. 1. XVIII. p. 417. t. 2. — R. f. 149. (H. nodorum Lacr.). — Dsm. III. 763. — Wstd. 633.
—— smilacina (Piestospora). — Dsm. III. 69.
—— subseriata (Sphaerospora). — [S. 416.] — Dsm. 1493. — Wstd. 635.
—— Syringae. — [S. 416. 377.]
—— Typhoidearum (Sphaerospora). — Dsm. 1491. — R. f. 45. — Dsm. III. 65, 762.
—— uredineaecola (Sphaerospora). — Dsm. 1487. — Wstd. 634.
—— vulgaris (Piestospora). — Dsm. III. 67.
Hercospora. — cf. Sphaeria.
—— Carpini. — [S. 397.]
—— circumscissa. — [S. 397.]
—— erythropyrena. — [S. 397.]
—— nigrescens. — Bon. t. 3. f. 72.
—— oculata. — [S. 397.]
—— Pupula. — [S. 397.] — R. f. 543. — Massaria pyxidata Rss.
—— rhodostoma. — [S. 397.]
—— Tiliae Fr. — Wstd. 533.
Hericium. — [S. 328.] — cf. Hydnum.
—— alpestre P. — Ital. 146.
—— caput Medusae. — Roq. t. 2. f. 3.
—— coralloides. — Cd. Anl. t. G. f. 72 : 23.
—— Erinaceus. — Cd. Anl. t. G. f. 72 : 22.
—— stalactitium Schrk. — Sturm h. 33 —. t. 9. (Strauss).
Herpotrichum. — [S. 521. 523.]
Heterosphaeria. — [S. 365.] — cf. Tympanis, Phacidium.
—— laciniata. — [S. 365.]
—— laevigata. — [S. 365.]
—— Patella. — [S. 365.] — Bail S. t. 19. — Kl. II. 416. 417. — Fuck. s. 764. — Wstd. 324.
—— phacidioides. — [S. 365.]
—— pinicola. — [S. 365.]
—— Plinthis. — [S. 365.] — Kl. II. 715.
Heterosporium circinale Kl. — Kl. 188.
—— Ornithogali Kl. — Kl. 69.
Hexagona. — [S. 324.]
—— apiaria. — Cd. Anl. t. H. 75 : 31. 32.
—— Carmichaeliana. — Cd. Anl. t. H. f. 75 : 33—35.
—— ciliata. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. 1843. t. 5. f. 1. (Klotzsch).
—— crinigera. — Afzel. t. 4. f. 10.
—— fasciata. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 2. (Berk.).
—— glabra. — Pay. b. cr. p. 107. f. 491.
Hexagona gracilis (Pleuropus). — Hook. J. VIII. t. 5. f. 4.
—— nitida. — Alger. t. 33, 1.
—— orbiculata. — Afz. t. 4. f. 9.
—— polygramma Fr. — Sagra, Cuba. t. 14. f. 3.
—— sulcata. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 20. f. 1.
—— tricolor. — Afz. t. 10. f. 8.
—— Wightii. — Bail S. t. 30. — Bisch. f. 3410. (cf. Polyporus W.).
Heydenia alpina. — Fres. t. 5. f. 37—45.
Heyderia cucullata. — [S. 347.]
Himantia. — [S. 496**. 521.] — Brit. f. 126. 128. (Mycelium Agarici peronati et fusco-purpurei).
—— disticha. — Letell. 660. 4.
—— fimbriata. — Letell. 660. 3.
—— flammea. — Linn. 1830. V. t. 7. f. 4. (Jungh.).
—— fulva. — Wstd. 432.
—— globulifera Schum. — Fl. dan. XII. 2099. 1.
—— lactea. — cf. Thelephora, Jungh.
—— laevis. — Letell. 630. (Athelia).
—— nitens. — Letell. 660. 2.
—— plumosa. — Letell. 660. 1. (Byssus cand.).
—— pulchella. — Wstd. 116.
—— ramosissima. — Fl. dan. XII. 2099. 2.
—— sulfurea. — [S. 334 **.]
Hippoperdon. — [S. 442.]
Hirneola. — [S. 340.] — cf. Exidia.
Hirudinaria macrocarpa. — Hedw. I. t. 14. f. G. 1. 2.
—— Mespili. — Hedw. I. t. 14. f. G. 3. — Kl. II. 269.
Hormiactis alba Preuss. — Sturm h. 35. t. 9.
—— fusca Preuss. — Sturm h. 35. t. 10.
Hormiscium. — cf. Torula.
—— abbreviatum. — Bon. t. 1. f. 5.
—— album. — Bon. t. 1. f. 3.
—— antennatum. — Bon. t. 3. f. 83.
—— caulicola f. Pelargonii. — Hedw. I. t. 7. f. 2.
—— conglutinatum. — Bon. t. 1. f. 10.
—— disciforme. — Bon. t. 1. f. 11.
—— laxum. — Bon. t. 1. f. 17.
—— olivaceum. — Bon. t. 1. f. 6.
—— rhizophilum. — Bon. t. 1. f. 8.
—— Sachari. — Bon. t. 1. f. 2.
—— Tritici. — Bon. t. 1. f. 9.
—— Vini. — Bon. t. 1. f. 1. — Krypt. Bad. 141.
Hormodendron Bon. — cf. Penicill. Cd.
—— atrum. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 7. (Bon.).
—— farinosum. — R. f. 173. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 9. p. 196. (Bon.). — Fuck. rh. 138.
Hormomyces aurantiacus. — Bon. t. 11. f. 234.
Hormospora. — [S. 404.] — cf. Sphaeria.
Husseia. — [S. 440.]
—— insignis. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 17. 18. f. 3. t. 19. f. 1. — Pay. b. cr. p. 112. f. 517.
Hyalopus. — [S. 491.]
—— muscorum. — Cd. Anl. t. B. f. 19 : 12.
Hydnangium. — [S. 436.] — cf. Octaviania.
—— candidum. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 20. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 21. f. 2. — Pay. b. cr. p. 114. f. 527.
—— carneum. — Cd. Anl. t. D. f. 47 : 11—13. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 3. — Bail S. t. 27. — Kl. 1318.
—— carotaecolor. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 4. — Berk. Out. t. 20. f. 1.
—— —— Berk. — cf. Octav. car.
—— hysterangioides. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 5.
—— liospermum. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 1.


Hend. Polycistis Berk. and Br. Not. Brit. Fung. No 415.
— Populi. – Sporocadus Cord. Ic. iv. p. 39. tab. viii. f. 109.


Hormosphaeria tesselata Léveil. Fung. novo-Granaten.
in Ann. Sc. nat. 4e Sér. XX. 1864. p. 16.




Hydnangium Stephensii v. Ravenelii. — Carol. II. 71.
—— virens Kl. — cf. Splanchnomyc. Kl.
Hydnobolites. — [S. 438.] — cf. Hydnotria.
—— cerebriformis Tul. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121. (Oogast. c.) p. 60. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 5; t. 14. f. 2.
—— melanoxanthus Cd. — cf. Pachyphloeus mel. Tul.
—— Tulasnei B. — cf. Hydnotr. T. — Brit. f. 302.
Hydnocaryon. — [S. 438.]
—— fragrans Wllr. ? cf. Genea Klotzschii Zob.
Hydnocystis. — [S. 438.]
—— arenaria. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 7; — t. 14. f. 1.
—— piligera. — Tul. F. hyp. t. 13. f. 2.
Hydnotria carnea C. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 115. (Rhizop. c. p. 61.).
—— Tulasnei B. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 166. (Rhizop. Tul. p. 60.). — Tul. F. hyp. t. 8. f. 2; — t. 14. f. 3; — t. 21. f. 14. — Kl. II. 321. — Brit. f. 302.
Hydnum. — [S. 326.] — cf. Odontia.
—— agaricinum. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 14. f. 3.
—— alpestre P. — R. f. 18.
—— alutaceum. — [S. 327.] — Carol. III. 19.
—— argillae. — Paläontol. VIII. t. 8. f. 1. (R. Ludwig).
—— argutum. — [S. 328.]
—— aurantiacum. — [S. 326.] — Kl. II. 114. — Fuck. s. 951.
—— aureum. — [S. 327.]
—— auriculatum. — [S. 327.]
—— auriscalpium. — [S. 326.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 12—15. — Bisch. f. 3284. — Fuck. s. 944. — Dsm. 254. — Loud. f. 16115. — Schnzl. t. 16. f. 33—35. — Kl. 126. — R. f. 17. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 7. (Fructif. Lév.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 28. (Keimg. Hoffm.). — Voges. 777.
—— barba Jovis. — Loud. f. 16123 ?
—— bicolor A. S. — [S. 327.] — Kl. 1114. — Sturm h. 7. t. 29.
—— byssinum Schrad. — Kl. 813.
—— castaneum. — [S. 327. 39.]
—— cervinum P. — Vent. t. 11. f. 101. 102. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 81. (Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 74: 16—19.
—— ciliolatum. — Carol. IV. 10.
—— cinnabarinum Schw. — zu Polypor. sanguinolent. (Berk. Intr. 370.).
—— cirrhatum P. — [S. 327.] — Fl. dan. X. 1789. 2.
—— coeruleum. — [S. 326.]
—— compactum. — [S. 326.] — Sturm h. 33—. t. 7. (Strauss). — Kl. 128.
—— concrescens. — Voges. 296. — Wstd. 1392.
—— coralloides Scop. — [S. 326.] — Bisch. f 3393. — Loud. f. 16118. — Kl. 125. — Kl. II. 702. — Dsm. 1810. — Carol. II. 24. — Fries Sv. t. 34. — Auerswald, Bot. Unterhaltung. 1863. S. 386.
—— corrugatum Fr. — [S. 326.] — Fries Sv. t. 16.
—— crinale. — [S. 327.]
—— crustosum Fr. — Fl. dan. XIII. 2271. 2.
—— cyathiforme. — [S. 326. 18.] — Pay. b. cr. p. 107. f. 487. — Kl. 124.
—— —— Bull.: Fuck. s. 949.
—— —— v. b. Kl. 1715. (=scrobicul. Fr. Ep.). — Wstd. 1392.
—— diaphanum. — [S. 327.]
Hydnum discolor. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 9. p. 381. (Berk.).
—— diversidens. — [S. 327.]
—— dryinum. — Alger. t. 32. 2.
—— Erinaceus Bull. — [S. 326.] — Loud. f. 16117. Fuck. s. 943.
—— fallax. — [S. 327.]
—— farinaceum P. — [S. 328*.] — Kl. 623. — Wstd. 1391.
—— fasciculare A. S. — [S. 328.] — Bisch. f. 3295.
—— ferrugineum. — [S. 326.] — Kl. 1115. — Fuck. s. 950. — Dsm. 1809. — Carol. III. 17.
—— ferruginosum. — [S. 327.]
—— fimbriatum. — Brit. f. 143.
—— flabelliforme. — cf. Rhois.
—— flavum. — [S. 328*.] — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 8. p. 380. (Berk.).
—— foetidum Secr. — Kl. 1116. — Fuck. s. 956.
—— fragillimum. — Carol. V. 21.
—— fuligineo-album S. — [S. 326.] — Fuck. s. 952.
—— fusco-atrum. — [S. 327.]
—— gelatinosum. — [S. 327.] — Journ. proc. Linn. soc. V. 20. Mai 1861. p. 182. (Fructif. Currey.).
—— gracile. — [S. 326.]
—— graveolens. — [S. 326.] — Carol. III. 16. — Ital. 145.
—— hortense. — [S. 327.]
—— imbricatum L. — [S. 326.] — Loud. f. 16112. — Fuck. s. 957. — Hrz. t. 3. b. — Bisch. f. 3244. — Bail S. t. 29. — Kl. 127. — Kl. II. 112. — Fries Sv. t. 33.
—— —— Schum. = subsquamos. Fl. dan. — Vent. mi. 32. f. 1. 2. — Staude t. 2. f. 4.
—— Infundibulum Sw. — [S. 326.] — Fuck. s. 958?
—— lacticolor. — Carol. III. 18.
—— laevigatum Sw. — [S. 326.] — Fuck. s. 955.
—— leoninum. — [S. 327.]
—— melaleucum. — [S. 326.] — Kl. 122. — Kl. II. 415. — Fuck. s. 946.
—— membranaceum. — [S. 327.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 10. 11. — Brit. f. 142. — Carol. V. 20. — Purton II. t. 15.
—— microdon. — Kl. 1918.
—— minimum Bolt. — Loud. f. 16121.
—— minutum Schum. — [S. 327.] — Fl. dan. X. 1789: 1.
—— molle. — [S. 564.]
—— molluscum. — [S. 327.]
—— mucidum. — [S. 327.] — Kl. 1917.
—— multiplex. — [S. 561.]
—— nigrum. — [S. 326.] — Fuck. s. 947.
—— niveum. — [S. 328.] — Bisch. f. 3321.
—— obtusum Schrad. — Kl. 515.
—— ochraceum P. — [S. 327.] — Loud. f. 16120.
—— olivaceum. — Carol. I. 27. (Irpex fuscescs.).
—— palmatum Vent. — Vent. mi. 24. f. 3.
—— Pinastri. — [S. 327.]
—— politum. — [S. 326.]
—— proliferum (Mesopus). — Afz. t. 5. f. 13.
—— pudorinum. — [S. 327.]
—— Ramaria. — [S. 327.]
—— repandum L. — [S. 327.] — Vent. t. 11. f. 103. 104. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 42. 43. (Fructif. Berk.). — Loud. f. 16113. — Berk. Out. t. 17. f. 2. — Roq. t. 2. f. 2. — Hrz. t. 23. — Fuck. s. 954. — Bisch. f. 3430. — Fries Sv. t. 15. — Kl. 229. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 95—103. (Fructif. Phöb.). —


Brit. f. 141. — Badham t. 12, 3. — Huss. I. 16. — Viv. 39. (c. v. rufesc. et ligul.). — Vent. mi. 24. f. 1. 2; 85. — Staude t. 2. f. 3. — Ital. 144.
Hydnum repandum v. flavidum. — Hrz. t. 61.
—— Rhois. — Carol. II. 25.
—— rufescens. — [S. 326.]
—— scabrosum. — [S. 326.]
—— scrobiculatum. — [S. 326.] — R. f. 214. — ? Fuck. s. 948.
—— septentrionale. — [S. 327.]
—— serpens Lasch. — Kl. 1311.
—— setosum P. — Dsm. 653.
—— spadiceum P. — Bisch. f. 3131. — Kl. II. 113.
—— squalinum. — [S. 327.]
—— squamosum Bull. = subsq. Fl. dan.
—— —— Schff. — [S. 326.]
—— stipatum. — [S. 328.] — Kl. 1107.
—— striatum. — [S. 326. 4.]
—— strigosum. — [S. 327.]
—— suaveolens Scop. — [S. 326.] — Hrz. t. 52. — R. f. 408. — Sturm h. 33 —. t. 8. (Strauss). — Kl. II. 10. — Dsm. 1808.
—— subcarneum. — [S. 327.]
—— sublamellosum Bull. t. 453. f. 1. = Sistotrema confls. P.
—— subsquamosum B. — [S. 326.] — Fl. dan. XI. 1965. — Ital. 772.
—— subtile. — [S. 328.]
—— sudans. — [S. 404.]
—— tenuiculum. — Alger. t. 31, 9.
—— thelephoroideum Dub. — Wstd. 1291.
—— tomentosum L. — [S. 326.] — Hrz. t. 3. a. — Kl. 123. — Kl. II. 8. — Fuck. s. 945.
—— torulosum. — [S. 564.]
—— trichodontium. — Carol. III. 20.
—— udum. — [S. 327.] — Berk. Out. t. 17. f. 3.
—— variecolor. — [S. 327.]
—— velutinum. — [S. 326.] — Ital. 334.
—— violascens. — [S. 326.]
—— viride. — [S. 327.] — Bisch. f. 3293.
—— zonatum. — [S. 326.] — Kl. 1715. = scrobiculat. Fr. Ep.). — Kl. II. 9. — Fuck. s. 948. (949.). — Dsm. III. 271. — Carol. I. 25. — Wstd. 1392. — Vent. mi. 6. f. 3. 4.
Hydrogera crystallina Wi. — cf. Pilobolus cr. Cd.
Hydrophora. — [S. 487.] — cf. Mucor.
—— fimetaria. — Bon. t. 9. f. 190.
—— Mucerdae Fr. — [S. 487.] — cf. Stilbum leiopus Ehrb.
—— murina. — [S. 487.] — Bon. t. 9. f. 191. — Fuck. rh. 50.
—— stercor. T.? — cf. Ascophora sterc. Cd. — [S. 487.] — Fuck. rh. 51.
—— tenella. — [S. 487.]
Hygrocrocis. — [S. 524.]
Hygrophorus. — cf. Agaricus.
Hymenangium. — [S. 136.] — cf. Splanchnomyc.
—— album. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 7—10. — Kl. 736. — cf. Hymenogaster Klotzschii.
—— griseum. — Pay. b. cr. p. 114. f. 528.
—— virens. — Cd. Anl. t. D. f. 47: 4—6.
—— —— Kl.: Sturm. h. 31 —. t. 8. 9. (Szl.).
Hymenobolus. — [S. 366.]
—— Agaves. — Alger. t. 29, 2.
Hymenochaete. — [S. 330****.]
Hymenogaster. — [S. 436.] — cf. Splanchnomyces.
—— albus. — [S. 436.]
—— arenarius. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 2.
—— Bulliardi. — Vitt. t. 3, 5. — Cd. Anl. t. D. f. 45: 7—9. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 14—16. Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 10. f. 6.
Hymenogaster calosporus. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 4.
—— citrinus Vitt. — [S. 436.] — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 9. 10. Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 1. f. 1—; t. 10. f. 3. — Berk. Out. t. 20. f. 2. — R. f. 34.
—— —— Berk. — cf. Splanchnom. Citrus Cd.
—— —— Vitt. — cf. Spl. citrinus Cd. — Brit. f. 281. — Vitt. t. 3. f. 2. 3.
—— decorus. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 4—8. Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 10. f. 9.
—— griseus Vitt. — Vitt. t. 3, 15. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 1—3. (Fructif. Tul.).
—— Klotzschii T. — [S. 436. alb.] — Bail S. t. 27. = Splanchnomyc. albus Cd., Rhizopogon albus Berk., Hymenangium album Kl.). — Tul. F. hyp. t. 10. f. 12. — Kl. 1967. — R. f. 242. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 30. (evolut.). — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 31. (Hoffm.). — Hoffm. Ic. t. 7. f. 1.
—— lilacinus. — Brit. f. 305. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 2. — t. 10. f. 8.
—— —— Berk.? — cf. Splanchnom. Tul. Zob.
—— luteus Vitt. — Vitt. t. 3, 9. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 11—13. Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 1. f. 3.
—— —— Berk. et Vitt. — cf. Splanchnomyc. Berk. Cd.
—— lycoperdineus. — Vitt. t. 2, 5. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 5.
—— —— Vitt. — cf. Splanchnomyc. l. Cd.
—— muticus. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 7.
—— niveus. — Vitt. t. 4, 9.
—— oliv. Vitt. — cf. Splanchnom. ol. Cd.
—— populetorum. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 10.
—— —— Berk. — cf. Splanchnomyc. olivac. Cd.
—— —— Tul. — cf. Splanchnom. p. Cd. — Brit. f. 304.
—— rufus. — Vitt. t. 3, 17.
—— tener. — Tul. F. hyp. t. 1. f. 4; t. 10. f. 1. — Berk. Out. t. 1. f. 3. Spor.).
—— —— Berk. — cf. Splanchnom. t. Cd.
—— Thwaitesii. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 11.
—— vulgaris. — Tul. F. hyp. t. 10. f. 13. — cf. Splanchnom. Tul. Zob.
Hymenogramme. — [S. 315.]
—— javensis. — Hook. Lond. J. 1844. III. t. 14. p. 330.
Hymenophallus. — [S. 434*.] — cf. Phallus. — Bail S. t. 24.
—— Daemonum. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 11.
—— duplicatus. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 7.
—— Hadriani. — Bail S. t. 26.
—— indusiatus Vent. — Cd. Ic. V. t. 8. f. 51. — Cd. Anl. t. F. f. 52: 8—10.
—— subiculatus Mont. — Cd. Ic. VI. f. 48.
Hymenopodium. — [S. 506.]
—— sarcopodium. — Cd. Ic. I. 121.
Hymenula. — [S. 471. 342.]
—— alba. — [S. 471***.]
—— Arundinis Fr. — [S. 471.] — Kl. 347. (est Sphaeria rimosa).
—— ciliata. — [S. 471.]
—— Clavus. — cf. Sclerotium C.
—— Desmazieri Cast. — Dsm. 1348.
—— Ebuli. — [S. 471.] — Fuck. rh. 184.
—— Equiseti. — Lib. 236. (Cryptosporium Eq. Fr.). — Wstd. 493.
—— Georginae Wllr. — [S. 471.] — Kl. 880. — Fuck. s. 252. — Fuck. rh. 183.





Hypoxylon annulatum. — Chile n. 10. f. 3.
—— argillaceum. — [S. 384.] (Sphaeria). — Fuck. s. 693. — Wstd. 530. 905.
—— atro-purpureum. — [S. 384.]
—— Berberidis Kx. — Wstd. 1203.
—— Berterii. — Chile, n. 9. f. 3.
—— Bomba Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 3.
—— bullatum. — Wstd. 68.
—— Carpini. — Wstd. 1206.
—— ceratospermum. — Wstd. 67.
—— chrysites. — Wstd. 365.
—— cinnabarinum. — Wstd. 361.
—— cirrhatum. — Wstd. 323.
—— coccineum. — [S. 384.] — Kl. II. 146. (cf. Sphaeria fragiform. P.). — Fuck. s. 695. a. b. — Wstd. 366. 903.
—— cohaerens. — [S. 354.] — Carol. III. 48. — Fuck. s. 690: H. multiforme. — Wstd. 905.
—— collabens. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
—— comosum. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
—— concentricum. — [S. 381.] — Kl. II. 600. — Carol. III. 49. — Ital. 642.
—— confluens. — Wstd. 166.
—— coprophilum. — [S. 384.] — Kl. II. 257.
—— corrugatum. — [S. 384.]
—— crustaceum. — [S. 384.]
—— cubense Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 1.
—— cupreum. — [S. 384.]
—— cupulare Kx. — Wstd. 528.
—— Cyclops. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
—— deustum. — Ital. 643.
—— dichotomum Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 3.
—— durissimum. — [S. 384.]
—— effusum. — [S. 384.]
—— enteroleucum. — [S. 384.]
—— ferrugineum. — Wstd. 915.
—— filiforme cf. Xylaria fil.
—— flavo-virens. — Wstd. 113.
—— fragiferum Kx. — Wstd. 903.
—— fragiforme. — Carol. III. 50. — cf. Institale acariforme.
—— fuscum. — [S. 384.] — Berk. Out. t. 1. f. 12. a. (Spor.). — Fuck. s. 691.
—— Galeotianum. — Bull. ac. belg. 1841. VIII. 2. t. 2. (Kx.).
—— gastrinum. — [S. 383.] — Wstd. 266. — Ital. 644.
—— glomeratum Bull. = Sphaeria fusca, Fl. dan.
—— glomerulatum. — Wstd. 219.
—— glomerulosum. — [S. 384.]
—— gramineum. — Pay. b. cr. p. 62. f. 266; p. 97. f. 452.
—— grammicum. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
—— granulatum Bull. — Wstd. 713.
—— granulosum B. — [S. 384.] — Fuck. s. 692.
—— guyanense. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
—— Heliscus. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
—— jecorinum. — Carol. IV. 37.
—— investiens. — Carol. IV. 33.
—— irradians. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
—— irregulare. — Wstd. 472.
—— Kickxii. — Bull. ac. belg. 1852. 1. Ser. XIX. p. 132. f. 1. (Wstd.). — Wstd. 714.
—— Laburni. — Wstd. 363.
Hypoxylon Leprieurii. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — Pay. b. cr. p. 97. f. 446.
—— luteum. — [S. 383.]
—— macromphalum. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 5. f. 8. (Mont.).
—— macrosporum. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
—— Malleolus. — Carol. IV. 32.
—— Michelianum. — Ital. 783.
—— microceras. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
—— multiforme. — [S. 384.] — Berk. Out. t. 21. f. 1. — Fuck. s. 689. — Carol. V. 56. — Wstd. 713.
—— notatum. — Carol. IV. 36.
—— nummularium. — [S. 384.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 1. (Notar.). — Fuck. s 686. — Ital. 295.
—— oedipus Mont. — Sagra, Cuba. t. 13. f. 2.
—— omphalostoma. — [S. 384.]
—— operculatum. — Wstd. 112. 529.
—— ostraceum. — [S. 524.]
—— perforatum. — Carol. V. 54.
—— platystoma. — Carol. V. 55.
—— polymorphum. — Kops Fl. bat. XI. 829. 2. — cf. Xylaria p. — Schnzl. t. 15. f. 36—38. — Bail S. t. 17. — Nov. Act. 1861. 28. t. 1 f. 8. (Spor. Bail).
—— punctatum. — Lindl. v. K. p. 29. f. 7.
—— punctulatum. — Carol. III. 51.
—— repandum. — [S. 383.]
—— rhizicola. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 9. (Mont.).
—— Ribis. — Wstd. 474.
—— rubiginosum Fr. — [S. 384.] — Fuck. s. 688.
—— rubricosum. — [S. 384.] — Chile n. 10. f. 2.
—— Sagraeanum Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 4.
—— salicinum. — Wstd. 473.
—— scabrosum Bull. = Sphaeria sc. Fl. dan.
—— Scleroderma. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — Pay. b. cr. p. 97. f. 451.
—— serpens. — [S. 384.] — Fuck. s. 694. — Carol. IV. 34.
—— Sphaerii. — Pay. b. cr. p. 62. f. 268.
—— sphondylinum. — [S. 383.]
—— spiculosum. — Wstd. 651.
—— steroides. — [S. 384.]
—— tabacinum. — Bull. ac. belg. 1841. VIII. 2. t. 2. (Kix.).
—— tubulinum. — [S. 383.]
—— turgidum. — Wstd. 907.
—— udum. — [S. 384.]
—— ustulatum. — [S. 383.] — Sphaeria deusta H. — Berk. Out. t. 21. f. 3. — Fuck. s. 687. — Krypt. Bad. 431.
—— velutinum. — Bull. ac. belg. 1851. Ser. 1. XVIII. p. 417. f. 1. (Wstd.). — Wstd. 475.
—— virgultorum Fr. — [S. 384.] — R. f. 318. — Ital. 873.
—— vulgare. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 5—8. — c. Rhizomorpha subcort.: Nov. Act. 1861. 28. t. 1. f. 1—7. (Bail).
—— Walterianum. — Carol. IV. 35.
—— xanthocreas. — Carol. V. 57.
Hysterangium. — [S. 437.] — Bail S. t. 14. — cf. Splanchnomyces Cd.
—— clathroides. — Vitt. t. 4, 2. — Bail S. t. 14. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 1—4. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 2; t. 11. f. 6. — Pay. b. cr. p. 114. f. 524—526.
—— —— Vitt. — cf. Splanchnomyc. cl. — Alger. t. 24. f. 7—11.







Hysterangium membranaceum Vitt. — cf. Splanchnomyc. m. Cd. — Vitt. t. 4. 15.
—— Pompholyx. — Ann. sc. n. 1843 XIX. t 17. f. 7—9. (Fructif Tul.). — Tul. F. hyp. t. 2. f. 3; t 11. f. 6.
—— stoloniferum. — Tul. F. hyp. t. 11. f. 7.
Hysterites labyrinthiformis. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 30. 31.
Hysterium. — [S. 368. 372, Xyl.; 402. Dich.] cf. Colpoma, Aporia, Coccomyces, Angelina, Hypoderma, Lophoderma, Psilospora, Hysterographium, Gloniopsis, Aylographum.
—— abietinum P. = Xylographa parallela Fr. (Dub. Hyst. 52.). — Voges. 656.
—— acerinum Wstd. = pulicare P. (Dub.).
—— acuminatum. — [S. 368.]
—— acutum Sch. = Cenangium ac. Fl. dan.
—— aggregatum. — Kl. II. 158. = H. elatinum P. (Dub.).
—— —— DC. (non Kl. II. 158.) = Mytilinid. aggr. Dub.
—— —— Wallr. = Glonium confluens Dub. — Norweg. 192.
—— Andromedae Kl. = Sporomega A. Dub.
—— angustatum. — [S. 368.]
—— —— P., Kl. 1258. u. 1566 a. = H. pulicare var. Dub.
—— —— Moug., Wllr., Ns. = Glonium lineare Not. (Dub.). — Fuck. s. 745. — Voges. 563. — Wstd. 926.
—— apiculatum. — [S. 369.] — Kl. 1468. — Kl. II. 444. — Fuck. s. 743. — Cd. Ic V t. 9. f. 58. = Lophodermium arund. v. (Dub.). — Lib. 73.
—— aquilinum Schum. — Fl. dan. XIII. 2330. 2.
—— arachnoideum Schum. — Fl. dan. XIII. 2329. 3.
—— Artemisiae Schum.
—— —— commune Fl. dan. — Wstd. 1118.
—— arundinaceum Schrad. — [S. 369.] — Dsm. 1284. — Kl. II. 575. — Fuck. s. 754. — Lophoderm. ar. Chev. (Dub.). — Voges. 655. — Brit. f. 91. — Wstd. 377.
—— australe. — Dub. Hyst. t. 1. f. 13.
—— Berberidis. — Kl. II. 156. = Lophoderm. xylom. Chev. (Dub.).
—— biforme. — [S. 368.]
—— breve.
—— —— Berk.; zu Lophium arund. Chev. (Dub.). — Berk. Fg. antarct. 3. t. 68. f. 8.
—— caricinum. — Kl. II. 723. — Dsm. III. 168.
—— catenulatum. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 9. (R. Ludwig).
—— cinerascens. — Dub. Hyst. t. 1. f. 15.
—— cinereum P. — cf. Ostropa c. Not.
—— cladophilum Lév. — R. f. 157. — Sporomega cl. Dub. — Dsm. III. 561. — Voges. 1243.
—— cocciferum Cast. = Cenangium Dub.
—— commune. — [S. 368. 297.]
—— —— Fr. — Fuck. s. 740. — Fl. dan. XI. 1860. 2. — Leptostroma vulgare Fr.
—— —— Dub. = Hypoderma c. Fr. (Dub.).
—— —— Moug.: Hypoderma c. var. (Dub.). — Letell. 650. 5. — Wstd. 1118.
—— —— v. Humuli. — Kl. II. 576.
—— —— v. nitidum. — Voges. 1071.
—— confluens Kz. = Triblidium rufulum Spr.
—— conigenum. — [S. 368.] — Fr.: Fl. dan. XIII. 2330. 3.
—— —— Moug.: var. fgi. (Dub. Hyst. 52.). — Voges. 75.
—— —— v. Fraxini: Wstd. 224. — Wstd. 925.

Hysterium contortum. — [S. 368*.] — Kl. II. 157.
—— —— Sturm h. 2. t. 32: Glonium graphic. Dub.
—— Corni Kz. — [S. 368.] — Kl. 562. = Hypoderma C. Not. (Dub.).
—— corrugatum. — [S. 368, 13.]
—— corticolum. — [S. 368.]
—— crispum P. — [S. 368.] — Var. v. elatin. P. (Dub.).
—— culmigenum. — [S. 369.] — Kl. 381.
—— —— Fr.: Fuck. s. 739. — Dsm. 1283. — Kl. II. 34. = Lophodermium ar. Chev. (Dub.).
—— —— v. abbreviat. Dsm. = Lophoderm. arund. v. (Dub.). — Dsm. III. 171. — Wstd. 923.
—— —— f. Cerealium Lasch. — Kl. 1151.
—— —— v. gramineum Fr. = H. gramin. P. — Wstd. 1120.
—— Curtisii. — Dub. Hyst. t. 1. f. 10.
—— curvatum Dur. — [S. 368.] = pulicare P. (Dub.).
—— decipiens. — Dub. Hyst. t. 1. f. 16. (Gloniopsis dec. Not. Rbh.). — Hoffm. Ic. t. 18. f. 1.
—— degenerans. — [S. 364*. 368.] — Kl. II. 260. = Sporomega cladophila Dub.
—— —— Fr. = Sporomega deg. (Dub.). — Dsm. III. 182. — Voges. 762. — Lib. 270.
—— dives. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 5. (Notar.). = Glonium d. Not. (Dub.).
—— elatinum. — [S. 368.] — Voges. 474.
—— —— crispum Fr. — Bisch. f. 3586.
—— elevatum.
—— —— P.: Dsm. 296. — Triblidium hysterinum Duf. (Dub.). — Voges. 1070.
—— ellipticum. — [S. 368.]
—— elongatum. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 62. — Dub. Hyst. t. 1. f. 9. — Fuck. s. 749.
—— —— Moug.: H. Rousselii Not. (Dub.).
—— —— Wllr., Fr. = Hysterograph. el. Cd. — Voges. 1184.
—— —— v. curvatum Fr. = H. curvatum Fr. (Dub.).
—— —— v. Rousselii Dsm. = H. Rousselii Not. (Dub.).
—— Epimedii. — Kl. 1567.
—— episphaericum. — [S. 368.]
—— flexuosum. — Carol. II. 48.
—— foliicolum. — [S. 368.] — Wstd. 922. — Voges. 761. — Brit. f. 196. — Lib. 72. — Dsm. 295. u. III. 179. 562.
—— —— Fr.: Dub. Lib. = Lophoderm. xyl. Chev. (Dub.).
—— —— v. maculare.
—— —— Wllr. = Aporia herbar. Fr. (Dub.).
—— —— Berk. = Hypoderma ilicinum Not. (Dub.). — Brit. f. 95.
—— —— v. Hederae Fr. = Hypoderma Hed. (Dub.). — Voges. 1073.
—— Fraxini. — [S. 368.] — Schnzl. t. 15. f. 11—15. — Fuck. s. 738. (Hysterograph. Dsm.). — Berk. In. p. 284. f. 66. a. — Dsm. 366. — Kl. 167. cf. Hysterograph. Fr. — Kl. II. 33. — R. f. 58. — Voges. 267. — Letell. 650. 2. — Purton. I. t. 32. — Wstd. 224. — Krypt. Bad. 153.
—— gramineum. — P.: zu Lophium arund. Chev. (Dub.).
—— —— Moug. Dsm.: zu Lophodermium ar. Chev. (Dub.). — Dsm. III. 170. — Voges. 368. — Wstd. 1120.
—— grammodes Not. — Kl. II. 574. — Var. v. H. Rousselii Not. (Dub.). — Ital. 297.

Hysterium graphicum. — [S. 368.]
—— —— Dub. = Glonium gr. Dub.
—— —— Fr.: Bisch. f. 3585.
—— Hederae. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 57.
—— —— M.: Fuck. s. 718. — Pay. b. cr. p. 94. f. 426. — Wstd. 1017. — Kl. 1951.
—— —— Mart.: Hypoderma Hed. Not. (Dub.). — H. foliicol. v. Hed. Fr.; Hypoderma xylomoides v. Hed. DC.; Hypod. Hederae Not., Wstd. — Dsm. III. 180.
—— herbarum. — [S. 368.]
—— Juniperi Grev. — Loud. f. 16186.
—— juniperinum. — Kl. 1658. — Wstd. 657.
—— —— R.: Fuck. s. 747.
—— —— Fr. = Lophodermium jun. Not. (Dub.).
—— Lauri. — Ital. 446.
—— Ledi. — [S. 368.]
—— lenticulare. — [S. 368. 1.]
—— lineare. — [S. 368.] — Loud. f. 16176. — Hysterographium lin. — Wstd. 926.
—— longum P. — [S. 372.]
—— maculare. — [S. 368.] — Loud. f. 16177.
—— —— Grev. = Hypoderma ilicin. Not. (Dub.).
—— —— Fr. = Lophodermium mac. Not. (Dub.). — Dsm. III. 561. — Voges. 1072. — Lib. 370.
—— Mali Schum. — Fl. dan. XIII. 2329. 2.
—— melaleucum. — [S. 368.] — Loud. f. 16180. Fuck. s. 742. — Wstd. 1045.
—— —— Fr. = Lophodermium mel. Not. (Dub.). — Voges. 654. — Lib. 178.
—— micrographum. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 3. (Notar.). = Aylographum vag. Dsm. (Dub.). — Kl. II. 528.
—— minutum DC. — cf. Dub. Hyst. 53.
—— Mülleri. — Dub. Hyst. t. 1. f. 12.
—— naviculare. —
—— —— Wllr. = curvatum Fr. (Dub.).
—— nervisequum. — Kl. 1955; Kl. II. 722: Hypoderma nerv. DC. (Dub.).
—— nigrum Tode. = Colpoma querc. Wllr. (Dub.). — Wstd. 96.
—— Oleae Cast. = Opegrapha (Dub.).
—— opegraphoides. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 7. (R. Ludwig).
—— Osmundae. — cf. Leptostroma filicinum.
—— ostraceum DC. = Lophium mytilinum Fr. (Dub.); Hypoxylon ostr. Bull.
—— oxycoccos. — [S. 368.]
—— parallelum Whl. = Xylographa parallela Fr. (Dub.).
—— pedicellatum Schum. = H. pulicare v. ped. Fl. dan. — Ostreichnion europ. Dub.
—— petiolare. — [S. 369.] — Kl. 1730 (est Peziza, Dub.). — Dsm. III. 181, 563. — Lib. 74. — Wstd. 35.
—— Pinastri. — [S. 368.] — Tharand. Jahrb. 1853. IX. (Stein).
—— —— Schrad.: Fuck. s. 750. — Kl. 560. — Dsm. = Hypoderma Desmazierii (Dub.).
—— —— Schrad. = Lophodermium P. Chev. (Dub.). — Voges. 76. — Carol. I. 40. — Letell. 650. 4. — Wstd. 223. 1222. (major). — Ital. 779.
—— —— v. juniperin. Fr. Dsm. = Lophoderm. junip. Not. (Dub.). — Kl. 1658. — Kl. II. 115.
—— —— Fr.: Dsm. 367; III. 183. — Wstd. 657.
—— —— v. minor Wstd. — R. f. 461. — Wstd. 1222.
—— Pini Schum. — Fl. dan. XIII. 2331. 2.
—— pithyum Kz. — Kl. 561. (zu Phacid. pith., Dub.).
—— Polygoni — [S. 368.]

Hysterium Populi Schum — Fl. dan. XIII. 2331. 3.
—— Prostii Kickx = pulicare P. (Dub.); Opegrapha Prostii Nyl.
—— —— Dub. — [S. 368.] — Voges. 1185.
—— pulchellum Fr. cf. melaleucum Fr. (Wstd.).
—— pulicare. — [S. 368.] — Fl. dan. XIII. 2330. 1. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 5—8. — Bisch. f. 3584. — Dsm. 365. — Hysterographium Kl. 1469. u. 1566. b.
—— —— P.: Fuck. s. 752. — Voges. 266. — Carol. IV. 25. — Letell. 650. 1. — Norweg. 95. — Lib. 71. — Wstd. 326. — Ital. 778. — Krypt. Bad. 556.
—— —— f. Betulae. — Kl. II. 261.
—— —— f. pedicellatum Fr. — Fl. dan. XIII. 2331. 1.
—— punctiforme. — [S. 369.] = Lophodermium xylomoides Chev. (Dub.). — Fuck. s. 756. — R. f. 462. — Lib. 271.
—— quercinum. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 59.
—— —— P.: Cenang. q. Fl. dan.; Colpoma q. Wllr. (Dub.). — Voges. 367. — Wstd. 96.
—— repandum Bl. — Dub. Hyst. t. 1. f. 6.
—— Robergei Dsm. = Lophodermium arundinac. v. (Dub.). — Dsm. III. 169.
—— Rocheanum. — Dub. Hyst. t. 1. f. 11.
—— rotundum Bernh. — Röm. Arch. I. t. 1. f. 5. — cf. Ostropa cinerea Not.
—— Rousselii Not. — Dub. Hyst. t. 1. f. 7.
—— —— v. grammodes. — Dub. Hyst. t. 1. f. 8.
—— Rubi. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 56. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 1—4. — Voges. 564. — Letell. 650. 3. — Lib. 177. — Wstd. 921.
—— —— Pers.: Fuck. s. 753. — Loud. p. 1033. f. 16478. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 10—14. (Tul.). — Kl. 559. — Hypoderma virgultorum DC. (Dub.). — Kl. II. 443.
—— —— P. = virgult. Dsm.
—— rubrum Fr. = Hymenula (Dub.).
—— rufescens Fr. = Angelina ruf. Schw. (Dub.).
—— rufulum. — Carol. II. 47.
—— rugosum. — [S. 402.] — Kl. II. 450. — Fuck. s. 737. — Wstd. 928. 924. (fagin. et quercin.).
—— —— v. fagineum Wllr. cf. Psilospora fag.
—— salicinum. — [S. 368.]
—— Salicis. — [S. 520.]
—— samarae. — [S. 369.]
—— samararum Lasch. — Kl. 1259. (an H. samarae Fr.?) = Phoma (Dub.).
—— Sambuci Fr. — [S. 403.] — Fl. dan. XI. 1860. 3.
—— scirpinum. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 54.
—— —— Fr.: = Hypoderma sc. DC. (Dub.). — Dsm. 369. — Bisch. f. 3587. — Kl. 1152; Cent. XV, Suppl. — Kl. II. 262. — Voges. 475. — Wstd. 1221.
—— seriatum. — Lib. 371. — Wstd. 1046. — Lophodermium ar. Ch. var. (Dub.).
—— Smilacis. — Dub. Hyst. t. 1. f. 11. — Carol. II. 49.
—— Sorbi. — [S. 418.]
—— sphaeroides A. S. — [S. 368.] — Bisch. f. 3588. — Lophoderm. sphaer. Dsm.
—— —— f. Rhododendri. — R. f. 355.
—— striaeforme Wllr. = Phoma (Dub.).
—— Striola. — [S. 406*.]
—— Taxi P. — Kl. 291.
—— truncatum. — [S. 401.]
—— tuberculosum Schum. — [S. 520.] — ?Fl. dan. XI. 2329. 1.





Hysterium tumidum. — [S. 368.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 55.
—— —— Fr. = Coccomyces tum. Dub. — Wstd. 1121. (c. v. trigon.).
—— Typhae. — [S. 368.]
—— Vaccinii Carm. = Sporomega clodophila Dub.
—— valvatum Ns. — Wstd. 1117.
—— variegatum Berk. = Hypoderma var. Dub.
—— varium. — [S. 368.] — Bail S. t. 18.
—— versicolor. — [S. 368.] — Whlbg. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 5.
—— virgultorum Dsm. = Hypoderma virg. DC. (Dub.). — Dsm. III. 172—178. — Wstd. 921. (Rubi); 1119 (quercin.).
—— Wallrothii. — Dub. Hyst. t. 1. f. 5.
Hysterographium. — [S. 368.] cf. Hysterium.
—— acerinum. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 18. (Wstd.). — Wstd. 927.
—— conigenum Fr. — Wstd. 925.
—— elongatum. — Pay. b. cr. p. 94. f. 425. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 62. = Hysterium el. Whl. (Dub.). — Dsm. III. 184.
—— Eupatorii Lasch. — R. f. 530.
—— Fraxini Dsm. cf. Hysterium Fr. — Fuck. s. 738.
—— —— Not. = Hysterium F. P. (Dub.). — Dsm. III. 185, 565. — Ital. 777. — Hyst. Oleastri Cast.
—— —— f. Oleae: R. f. 356.
—— lineare Fr. — Wstd. 926.
—— Oleastri Cast. Dsm. = Hysterium Fraxini Dub.
—— Prostii Dsm. = Hysterium Pr. Dub. — Dsm. III. 186.
—— pulicare. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 61.; Hysterium pul. P. (Dub.).
Hysteromyces. — [S. 435.]
Hystricapsa trochiformis Preuss. — Sturm h. 36. t. 9.

Ileodictyon. — [S. 435.]
—— gracile. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 8. — Cd. Ic. VI. t. 5. f. 57.
Illosporium. — [S. 481.]
—— aurantiacum Lasch. — R. f. 74. — Fuck. s. 206. — Fuck. rh. 239.
—— carneum. — [S. 481.] — Kl. 418. — R. f. 73. b. (Cent. IV, Suppl.). — R. f. 73. — Brit. f. 293. — Lib. 383. — Wstd. 89.
—— coccineum. — [S. 481. 482 **.] — Fuck. s. 208. — Voges. 996. — Lib. 281. — Fuck. rh. 240.
—— corallinum Rob. — Dsm. 1151.
—— fagineum. — [S. 482 **.] — Lib. 185.
—— niveum. — Dsm. 1732.
—— persicinum. — [S. 481.]
—— puniceum. — Lib. 282.
—— roseum. — [S. 481.] — Dsm. 82. — Schnzl. t. 14. f. 1—3. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 87. f. 40. c. — Kl. 957. — R. f. 72. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 5. — Lib. 77. — Fuck. rh. 241.
Inoconia. — Michelii: Lib. 96.
Institale. — [S. 447.]
—— acariforme. — Carol. V. 82. (status morbosus Hypoxyli fragiformis).
Irpex. — [S. 328.]
—— candidus Weinm. — Kl. 1214.
—— canescens. — Cd. Anl. t. G. f. 94: 9. — Bail S. t. 29.
—— carneo-albus. — [S. 328.]
—— cinnamomeus. — cf. fuscescens.
Irpex coriaceus. — Carol. III. 21.
—— crispus. — [S. 328.]
—— deformis. — Hoffm. Ic. t. 17. f. 3.
—— fuscescens? — Carol. I. 27. (cinnamom. Fr.).
—— fusco-violaceus. — [S. 328.] — Kl. 230. — Kl. II. 115. — R. f. 309. — Dsm. III. 798. — Agar. decips. Willd., Sistotrema viol. b., Pers., Hydnum Fr. S.
—— lacteus. — [S. 328.]
—— maximus Mont. = Polypor. labyrinthif. Fr.
—— obliquus. — [S. 328.] — Kl. 121. — R. f. 213.
—— pallescens. — Carol. I. 26.
—— paradoxus. — [S. 328.] — Kl. 1405.
—— pendulus. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 7. 8. — Bisch. f. 3411. — Kl. 621. — R. f. 19.
—— sinuosus. — [S. 328.] — R. f. 116.
—— spathulatus. — [S. 328.] — Bisch. f. 3322.
—— tabacinus. — Carol. III. 22.
Isaria. — [S. 464.] — cf. Amphichorda [S. 464.] (auf Raupen. — Robin v. par. t. 9. f. 6.
—— agaricina. — cf. Tul. Sel. I. 113.
—— arachnophila Dt. — [S. 464.] — Bisch. f. 3769. — Letell. 698. 2. — Sturm h. 4. t. 55.
—— brachiata. — [S. 464.] — Fl dan. XIII. 2280. 3. — Kl. 1126. — Kl. II. 134. — Fuck. s. 258. Fuck. rh. 169.
—— bulbosa Ns. — Bisch. f. 3783.
—— calva Fr. — Bisch. f. 3775.
—— candida. — [S. 464 **.]
—— carnea. — [S. 464.]
—— citrina. — [S. 464.] — Cd. Anl. t. G. f. 71: 5—7. — Pay. b. cr. p. 76. f. 351. — Bisch. f. 3786. — Kl. II. 133. — zu I. agaric. (Tul.). — Sturm h. 3. t. 37.
—— clavata Ditm. — Bisch. f. 3768. — Schnzl. t. 12. f. 48. 49. — Sturm h. 1. t. 56.
—— crassa. — Pay. b. cr. p. 58. f. 241.
—— dendroidea. — Jungh. pr. t. 1. f. 6.
—— eleutheratorum Ns. — [S. 464.] — Bisch. f. 3774. — Kl. 1543. — zu Claviceps entomorhiza Dicks. (Bail).
—— —— v. racemosa Awd. — Kl. 872.
—— epiphylla. — [S. 464.] — zu I. agaric. P. (Tul.). — Letell. 698. 4.
—— farinosa. — [S. 464.] — Kl. 1666. u. 1749. — zum Formenkreis der Empusa Muscae (Bail). — R. f. 575.
—— —— velutipes Fr. — Bisch. f. 3773. — Letell. 698. 1.
—— fasciculata. — [S. 464.]
—— filiformis. — Kl. 1665.
—— Friesii. — [S. 464 **.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12.
—— glauca Ditm. — Bisch. f. 3767. — Kl. 1427. — Sturm h. 2. t. 19.
—— intricata. — [S. 464.]
—— leprosa. — [S. 464.]
—— microscopica Grev. — Loud. f. 16552.
—— monilioides A. S. — [S. 467.] — Bisch. f. 3782. — Letell. 698. 3.
—— puberula. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 12. (Berk.).
—— ramealis. — [S. 464.]
—— sphecophila Ditm. — [S. 464.] — Bisch. f. 3776. — Sturm h. 4. t. 57.
—— Stemonitis P. cf. Stysanus St. [S. 467 **.]
—— strigosa. — [S. 464.]
—— sulphurea. — R. f. 60.
—— terrestris. — [S. 464.]
—— tomentella. — [S. 464.]
—— umbrina P. — R. f. 172. — Fuck. s. 260.


Isaria velutipes. — Sturm h. !. t. 54.
Isariopsis pusilla Fres. — Fuck. s. 262. — Fuck. rh. 171. — Phacellium Bon. — Fresen. t. 11. f. 18—28. p. 87.
Isothea. — [S. 421.]


Junghuhnia. — [S. 315. XXII.

Kentosporium. — cf. Claviceps.
—— mitratum Wllr. — cf. Clavic. purpurea. — Wstd. 1201.
Kneiffia. — [S. 536.
—— candidissima. — Carol. V. 32.
—— setigera. — Carol. V. 31.
Kretschmaria. — [S. 409.]

Laboulbenia Guerinii. — Robin v. p. t. 9.
—— Rougetii. — Robin v. p. t. 8. f. 1. 2; t. 10. f. 2. 9.
Labrella. — [S. 422.]
—— cedrina. — Alger. t. 27, 7.
—— Cruciferarum. — [S. 422.]
—— Fagi Rob. — Gloeospora F. Wstd. — Dsm. III. 77. — Wstd. 1187.
—— ?nervisequa. — Fuck. rh. 427. 428.
—— Periclymeni. — Dsm. III. 76.
—— Pomi. — [S. 422.]
—— —— Mont. = Sphaeria hians Wllr. — Fuck. s. 386. — Dsm. 300. — Voges. 1186. (Xyloma pyrig.).
—— Ptarmicae. — Dsm. 147. — Kl. 1394. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 7. (Berk.). — Voges. 987. — Wstd. 375. — Schizothyrium Pt. Dsm.
—— Punctum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 1—3.
—— Rosacearum. — Bail S. t. 15.
—— Rosae. — [S. 402***.]
Lachnella. — [S. 365.] cf. Peziza.
Lachnobolus. — [S. 457.]
Lactarius. — cf. Agaricus.
Lamyella. — [S. 410.]
Langermannia. — [S. 442.] cf. Bovista; Sturm h. 18. t. 10—14.
Lanopila. — [S. 441.]
Lanosa. — [S. 489*; 495.]
Laquearia. — [S. 366.]
Laschia. — [S. 315. XXII; 325.]
—— infundibuliformis. — Ann. Mg. n. h. 1842. IX. t. 9. f. 3. (Berk.).
—— papulata. — Chile n. 7. f. 8.
Lasiobotrys. — [S. 406.] — cf. Dothidea Veronicae.
—— Lonicerae. — [S. 406.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 387. t. 12. f. 44. (Ant. B. B.). — Cd. Anl. t. F. f. 53: 4—7. — Bisch. f. 3701. — Dsm. 257. — Loud. f. 16498. — Schnzl. t. 14. f. 9. — Kl. II. 668. — Voges. 860. — Brit. f. 48. — Ital. 49.
Lasioderma. — [S. 446.]
—— flavovirens. — Alger. t. 20, 4.
Lasiosphaeria cf. Sphaeria.
Laternea. — [S. 435*.] cf. Clathrus.
—— columnata. — Bail S. t. 23.
—— triscapa. — Cd. Anl. t. E. f. 48: 1.
Leangium. — [S. 450.] cf. Polyschismium.
—— floriforme Lk. — Loud. f. 16525.
—— lepidotum. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 21. 22. — Kl. 1544. — Sturm h. 2. t. 21.
—— stipitatum. — [S. 457. 2.]
—— Trevelyani Grev. — [S. 450.] — Bisch. f. 3680.
Lecanidion. — Bail S. t. 19.
—— atrum Rbh. — R. f. 33. — Fuck. s. 765.


Lecideola. — [S. 366. 6.]
Lecythea. — [S. 511.] cf. Epitea, Uredo.
Lecythes. — [S. 511.]
Leiophallus. — [S. 434***.] cf. Hymenoph.
Lemalis. — [S. 360.]
—— Alismatis. — [S. 360.]
Lembosia. — [S. 370**.]
Lentinus. — cf. Agaricus.
—— castoreus. — [S. 314.]
—— cirrhosus. — Afz. t. 10. f. 21.
—— cochleatus. — [S. 314.]
—— crinitus. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 1. (Berk.). — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9. f. 2. (Berk.).
—— dactyliophorus Lév. — Bonite t. 136. f. 2.
—— descendens (Scleroma). — Afz. t. 10. f. 22.
—— eugrammus Mont. — Sagra, Cuba t. 17. f. 2.
—— flabelliformis. — [S. 314.]
—— friabilis. — [S. 314.]
—— fulvus. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9. f. 1. (Berk.).
—— giganteus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 17. 18. f. 2.
—— herbarum. — [S. 314.]
—— inquinans. — Hook. J. VI. t. 7. f. 1.
—— Lecomtei. — Carol. I. 4.
—— lepideus. — [S. 314.]
—— leucochlorus Lév. — Bonite t. 140. f. 1.
—— Léveillei. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 5. (Berk.).
—— maculatus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 19. f. 2.
—— Monnardianus. — Alger. t. 20, 2.
—— Nicotiana. — Hook. J. VIII. t. 5. f. 7.
—— nigripes Fr. — Linn. Trans XX. t. 9. f. 4. (Berk.).
—— obnubilus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 19. f. 3.
—— praerigidus — Hook. J. 1854. VI. t. 8. f. 1.
—— Ravenelii. — Carol. II. 11.
—— ringens. — [S. 314.]
—— Schomburgkii. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 3. (Berk.).
—— setiger Lév. — Bonite t. 136. f. 4.
—— stenophyllus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 17. 18. f. 1.
—— suavissimus. — [S. 314.]
—— tener Kl. — Linn. Trans. XX. t. 9. f. 2. (Berk.).
—— tigrinus. — [S. 314.] — Bail S. t. 32.
—— umbellatus. — [S. 314.]
—— ursinus. — [S. 314.]
—— velutinus Fr. — Sagra, Cuba t. 17. f. 3.
—— vulpinus. — [S. 314.]
Lenzites. — [S. 315.] cf. Daedalea.
—— abietina. — [S. 315.] — Bisch. f. 3437. — Fuck. s. 1025.
—— albida. — [S. 315.]
—— betulina. — [S. 315.] — Kops Fl. bat. X. 790. 1. — Berk. Out. t. 15. f. 3. — Bail S. t. 32. — R. f. 14. — Fuck. s. 1028. — Dsm. 1123. — Carol. II. 14.
—— bicolor. — Carol. II. 15.
—— flaccida. — [S. 315.]
—— Guineensis. — Afz. t. 12. f. 26.
—— heteromorpha. — [S. 315.]
—— Palisotii. — Afz. t. 11. f. 21.
—— sepiaria. — [S. 315.] — Kops Fl. bat. X. 790. 2. — Fuck. s. 1026. — Dsm. 1805. — ?Daedalea asserculorum, Voges. 491.
—— striata. — Carol. I. 7.
—— tricolor. — Ital. 141.





Leptotrichum glaucum. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 16. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 3. 4. — Pay. b. cr. p. 73. f. 328.
Leucina. — [S. 467 ***.]
Leucosporium. — [S. 472 **.]
—— vesiculiferum. — Ns. j. Syst. t. 3. f. 1—3. — Sturm h. 13. t. 34.
Leucostroma Cast. = Erysiphe (Tul.).
Leveillea. — [S. 409.]
Levieuxia. — [S. 415.]
Libertella. — [S. 413 ***. 426.]
—— acerina. — Wstd. 1190.
—— alba. — Lib. 364. — Wstd. 985. 1252.
—— betulina. — [S. 426 ***.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 4. (Dsm.). — Lib. 363. — Ital. 448. (Naemaspora aurea).
—— crocea. — Bon. t. 3. f. 63. a. c.
—— Equiseti. — [S. 426.]
—— faginea. — [S. 426 ***.] — Dsm. 141. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 5. (Dsm.). — Wstd. 338.
—— fusca. — Bon. t. 3. f. 70.
—— macrospora. — Wstd. 1252.
—— nigrificans. — Bon. t. 3. f. 63. d.
—— Rosae. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 6. (Dsm.). — Bon. t. 3. f. 63. e.
Licea. — [S. 458.] cf. Phelonitis, Physarum.
—— alba. — cf. Didymium, Let.
—— Artocreas. — Carol. II. 82.
—— atra. — [S. 454. 30.]
—— badia. — [S. 459.]
—— bicolor P. — Lycogala pariet.
—— caesia Schum. = Physarum caes. Fl. dan.
—— contorta. — [S. 458.]
—— cylindrica. — [S. 459.] — Kl. 349.
—— fragiformis. — [S. 459.] — Loud. f. 16544.
—— macrospora Schum. = Polyang. umbr. Fl. dan. [S. 459 **.]
—— nitens. — [S. 459.]
—— pusilla. — [S. 453, 24.]
—— serpula. — [S. 459.]
—— strobilina. — [S. 458 *.] — Voges. 579. — Norweg. 89. — cf. Perichaena. — Sturm h. 2. t. 20.
—— suberea. — [S. 459.] — Cd. Anl. t. C. f. 27: 14—16.
—— sulphurea. — Kl. 1545. — cf. Anixia truncigena Hoffm. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 12. (Keimg. Hoffm.).
—— tubulina. — [S. 449 ***.]
—— umbrina. — [S. 459.]
—— variabilis. — [S. 459 *.]
Lichen aidaelus. — Wstd. 1254.
—— hippotrich. — cf. Tul. Sel. I. 149.
—— radiciformis. — Wstd. 1255.
Lichenopsis. — [S. 416.]
—— sphaeroboloidea. — Carol. I. 72.
Lignyota. — [S. 459.]
Limbosa. — [S. 406; ast.]
Lindbladia. — [S. 449.]
Lituaria. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 8—10. (Riess.).
Lizonia. — cf. Sphaeria.
Lophiostoma. — cf. Sphaeria.
Lophium. — [S. 401.]
—— aggregatum. — [S. 401.] = Mytilinidion.
—— dolabriforme. — Dub. Hyst. t. 1. f. 4.
—— elatum. — [S. 401.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 5. (Dsm.).
—— —— Grev.: Loud. f. 16458. — Dsm. 1030.
—— Lonicerae Fr. — ? Wstd. 909.
—— mytilinellum. — [S. 401.]
—— mytilinum. — [S. 401.] — Loud. f. 16459. — Bisch. f. 3583. — Bail S. t. 18. — Schnzl. t. 15. f. 16—20. — Pay. b. cr. p. 94. f. 427. — Kl. 1150. — Kl. II. 714. — Hysterium myt. P. Ns., ostraceum DC., Hypoxylon ostr. Bull. (Dub.).
Lophium unguiculatum Wllr. — Ostreichnion europ. Dub.
Lophoderma. — [S. 371.] cf. Hysterium Rubi (Tul.).
—— Pinastri. — Wstd. 223.
—— Rubi Chev. — Wstd. 921.
—— xylomoides Chev. — Wstd. 922.
Lophodermium. — cf. Hysterium, Phacidium.
—— arundinaceum. — Wstd. 377.
—— culmigenum Not. = arundinac. Chev. (Dub.).
—— herbar. Chev. — Hypoderma commune Fr. (Dub.), Leptostroma vulg. Fr.
—— Juniperi Not. = Hyster. Jun. (Tul.).
—— laricinum Dub. — R. f. 158.
—— Neesii. — Dub. Hyst. t. 2. f. 23.
—— Phacidium Not. — Phacid. coronat. Fr.
—— Pinastri. — Ital. 779; — Hysterium P.
—— quadratum. — cf. Phacidium.
—— Rhododendri Ces. — R. f. 458. — Ital. 537.
—— ? sphaeroides Dub. — cf. Hysterium sph. — R. f. 355.
Lundia. — [S. 409 **.]
Lycogala. — [S. 448.]
—— argenteum P. — Loud. f. 16539. — cf. Reticularia ar.
—— cinereum Schum. = plumbeum Fl. dan.
—— conicum. — [S. 448.]
—— contortum Dit. — cf. Trichia retic. — Sturm h. 1. t. 5.
—— epidendrum. — [S. 448.] — Fl. dan. XII. 2086. 2. — Krypt. Bad. 330. — Kops Fl. bat. XI. 805. 2. — Bisch. f. 3673. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 40. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 1. 2. — Ztschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 9. (de Bary). — Kl. 933. — Fuck. s. 300. — Kl. II. 243. — Carol. II. 74. — Huss. II. 3. — Wstd. 741. — Ital. 887.
—— —— v. carnea Fr. — Fl. dan. XII. 2150. 2.
—— ferrugineum Schum. = L. epidendrum Fl. dan. — Wstd. 741.
—— globosum Mich. — Wstd. 741.
—— griseum majus Mich. cf. Reticularia arg. Cd.
—— miniatum P. — Loud. f. 16538. — Verh. zool. bot. Ges. Wien. 1859. Fbr. t. 1. f. 1. (Keimung. Bail). — Voges. 85. — Wstd. 741.
—— minutum Grev. — Loud. f. 16540.
—— parietinum Fr. — [S. 448.] — Dsm. 166. — Voges. 1092.
—— plumbeum. — [S. 448.] — ? Fl. dan. XII. 2086. 1. u. 3.
—— punctatum Ns. — Wstd. 741.
—— terrestre Fr. — [S. 448.] — Cd. Ic. VI. f. 37. — cf. plumbeum Fl. dan. — Carol. IV. 78.
—— verrucosum Batsch. — Wstd. 741.
Lycoperdon. — [S. 442.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 1. f. 2. (Capillit. Tul.) u. 1837. VIII. — Flora 1843. t. 4. (Fructif.). — cf. Langermannia.
—— Anemones Pultn. — Wstd. 662.
—— arenarium. — Gaudich. voy. 1826. t. 1: 1.
—— areolatum. — Sturm h. 18. t. 5.
—— Bovista. — [S. 442 *.] — Kops Fl. bat. IX. t. 720. 2. — Vent. t. 12. f. 118. 119. — Bisch. f. 3689. — Loud. f. 16507. — Schnzl. t. 14. f. 43. 44.
—— caelatum Bull. — [S. 442.] — Kops Fl. bat. IX. t. 715. 1. — Bisch. f. 3604. — Ann. Mg.

— Equiseti Dersumy. 14e not. p. 179. —



n. h. 1840. IV. t. 5. f. 1—6. Fructif. Berk.). — Hrz. t. 74. — Berk. Out. t. 20. f. 7. — Kl. II. 512. — Fuck. s. 311. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. (Fructif. Berk.). — Berk. In. p. 335. f. 75. d. (Anat.). — Huss. II. 23.

Lycoperdon cancellatum L. — Wstd. 123.

—— cepaeforme. — Schnzl. t. 14. f. 48*. — Pay. b. cr. p. 111. f. 508.

—— cinereum. — Wstd. 382.

—— constellatum. — [S. 442.] — Kl. 1411. — Fuck. s. 313. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 18. (Keimg. Hoffm.). — Sturm h. 18. t. 7.

—— Corium DC. — cf. Mycenastr. Cor. Desv.

—— corniferum Müll. — Wstd. 742.

—— cruciatum. — Sturm h. 18. t. 8.

—— cyathiforme. — Carol. IV. 74.

—— defossum. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 15. (Vittad.). — Purton. I. t. 19. f. 2.

—— epidendrum L. — Wstd. 741.

—— epiphyllum L. — Wstd. 663.

—— Euphorbiae Schrank. — Wstd. 837.

—— excipuliforme. — Kops Fl. bat. IX. 715. — Loud. f. 16509. — cf. L. gemmat. v. — Wstd. 1262. — Vent. mi. 68. f. 3; 74. f. 3. 4.

—— favogineum B. — Trichia chrysosp. Fl. dan.

—— Fontanesii. — Alger. t. 22.

—— fucatum Lév. — Bonite t. 140. f. 3.

—— furfuraceum Batsch. — Wstd. 1261.

—— gemmatum B. — Kops Fl. bat. IX. t. 715. 2. — Fuck. s. 308. — Carol. IV. 73. — cf. L. plumbeum. — Huss. I. 54.

—— —— v. echinatum. — Dsm. 1011.

—— —— v. excipuliforme. — Hrz. t. 27. — Wstd. 1262.

—— —— v. perlatum. — Bisch. f. 3614. — Kl. 58. — Wstd. 1263.

—— giganteum. — [S. 442*.] — Fl. dan. IX. 1920. — Ann. sc. n. 1839. XII. t. 2. (Fructif. Berk.). — Ann. Mg. n. h. 1840. t. 5. f. 7—14. (it.). — Cd. Ic. V. t. 4. f. 40. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 7—11. — Berk. In. p. 335. f. 75 e. (Basid.).

—— graniforme Sow. — cf. Cenococcum geoph. — Wstd. 79.

—— hirtum Bull. — Wstd. 1263. — Vent. mi. 68. f. 4. 5.

—— hypophyllum Ehrb. — Wstd. 663.

—— lineare Schrk. — Wstd. 331.

—— lumbricale Sch.: Trichia reticulata.

—— —— Batsch: Trichia Serpula Fl. dan.

—— Mali. — [S. 520.]

—— molle. — Schnzl. t. 14. f. 48***.

—— nigrescens P. — Wstd. 1263.

—— oleraceum Poll. — Wstd. 182.

—— pedunculatum L. = Tulostoma brumale Fl. dan.

—— penicillatum Müll. — Wstd. 556.

—— perlatum. — Schnzl. t. 14. f. 42. = L. gemm. v. papill. Schff. t. 184. — Voges. 577. — Wstd. 1263. — Sturm h. 18. t. 6.

—— pertusum Sow. — Wstd. 39.

—— Pini. — Wstd. 660.

—— —— v. acicola. — Kops Fl. bat. XI. t. 855. 1.

—— pisiforme L. — Wstd. 741.

—— plumbeum. — Badham t. 15, 6. (gemmati var.?).

—— poculiforme Jacq. — Wstd. 227.

—— polyrhizon. — cf. Sclerangium pol.

—— populinum Jacq. — Wstd. 129.

—— pratense P. — Loud. f. 16508.

—— pusillum. — [S. 442.] — Kl. 1635. — Kl. II. 513. — Fuck. s. 312. — Carol. II. 73.

Lycoperdon pyriforme. — [S. 442.] — Kl. 243. — Kl. II. 142. — Fuck. s. 307. — Fl. dan. X. 1680. 1. — Loud. f. 16510. — Carol. II. 72. — Huss. I. 70. — Schweiz. 10. — Krypt. Bad. 552. — Sturm h. 18. t. 9.

—— —— v. excipuliforme. — Dsm. 1012.

—— radiatum Sow. — cf. Agaricus radians Dsm. — L.: [S. 363***.]

—— saccatum. — [S. 442.] — Bisch. f. 3605. — Fuck. s. 309. — Huss. I. 14.

—— sanguineum Rupp. — Wstd. 741.

—— Semen Retz. — Wstd. 78.

—— solidum. — [S. 444†.]

—— sphaericum Mich. — Wstd. 1261.

—— tessellatum Schum. = Scleroderma vulg. v. squamosa.

—— truncatum L. — Wstd. 191.

—— turbinatum P. — Wstd. 1264. (livid.).

—— umbrinum P. — Fl. dan. X. 1800.

—— uteriforme. — Kl. 1412.

—— variolosum L. — Wstd. 903.

—— varium. — Trichia varia.

—— velatum. — Pay. b. cr. p. 112. f. 515.

—— verrucosum. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 19. (Keimg. Hoffm.). — Wstd. 1262. (excipulif.).

Lysurus. — [S. 434.]

—— aseroëformis Cd. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 3—8.

—— Gardneri. — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 17. f. 2.

—— Mokusin. — Cd. Anl. t. E. f. 49: 4—8. — Bail S. t. 24.

Macroon. — [S. 500.]

—— obscurum. — Sturm h. 13. t. 47.

Macroplodia. — cf. Diplodia.

—— conigena Wstd. — R. f. 454. — Wstd. 1230.

—— Visci. — Wstd. 1231.

Macrosporium. — [S. 486. 501.]

—— atrum. — R. f. 273. (cf. Septospor.).

—— bulbotrichum. — [S. 501.]

—— caricinum. — [S. 501*. 506.] — Bon. t. 6. f. 135. a. b.

—— Cheiranthi. — [S. 501.] — Carol. I. 89.

—— concinnum. — [S. 501.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 21. (Berk.).

—— Convallariae. — [S. 501.] — Fl. dan. XIII. 2279. 3. — Bon. t. 6. f. 135. c.

—— divisum. — Bon. t. 8. f. 175.

—— echinellum. — Carol. III. 88.

—— heteronemum. — Dsm. III. 7. — Wstd. 1194.

—— heterosporum. — Dsm. III. 8.

—— pinguedinis. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 2.

—— punctiforme. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 1.

—— Sarcinula. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 10. (Berk.).

—— tenuissimum. — [S. 501.]

Malinvernia. — cf. Sphaeria.

—— anserina. — Hdw. I. t. 15. f. 4. — Sphaeria (Hypocrea) ans. Kl. II. 526.

Mamiania. — cf. Sphaeria.

Mammaria echinobotryoides. — Kl. 1895.

Manina. — [S. 522.]

Marasmius. — [S. 313.] cf. Agaricus.

Martella. — [S. 313.]

Massaria. — [S. 396.] cf. Sphaeria.

—— amblyospora. — Fres. t. 7. f. 24—33. — R. f. 257. — cf. M. foedans.

—— Argus. — Fres. t. 7. f. 7—17.

—— atro-inquinans. — Carol. IV. 65.

Massaria crustata. — [S. 396.]
—— crypta. — [S. 396.]
—— epiphegea. — Fres. t. 7. f. 35—40.
—— foedans. — [S. 396.] — Berk. Out. t. 1. f. 12. e. (Spor.). = Sphaer. amblyospora B. B.
—— inquinans Td. — [S. 396.] — Kl. 541. — Fuck. s. 515.
—— mamillana. — Kl. 1644.
—— Platani Ces. — R. f. 323.
—— pyxidata. — Fres. t. 7. f. 1—6. — R. f. 543. (Sphaeria Pupula).
—— squalens. — [S. 396.]
Mastigosporium album. — Kl. 1758.
—— —— Rss. = Bactrid. alb. Bon.
Mastomyces. — [S. 524.]
—— Friesii. — Ann. sc. n. 1848. X. t. 6. f. 4. (Mont.).
Mazzantia Galii. — [S. 391.] — R. f. 537. 538.
Medusula. — [S. 493***. 521.]
—— ochracea. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 7. 8.
Melampsora. — [S. 482. 512.]
—— areolata. — [S. 482.] — Dsm. 1650.
—— betulina. — Dsm. 1647. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 8. 9. u. t. 8. f. 10—12. (Tul.). — Fuck. s. 29. — Voges. 1276. — Fuck. rh. 299.
—— Carpini. — Fuck. s. 26. — Fuck. rh. 294.
—— Epilobii. — Fuck. rh. 300.
—— Euphorbiae. — Fuck. s. 27. — Dsm. 1086. — Castagne Marseille t. 5. — Wstd. 973. — Fuck. rh. 295. (cum Uredine Euph.).
—— herbarum. — [S. 482.]
—— —— f. Epilobii. — Dsm. 1648. — Wstd. 1060. (Sclerot. h. Fr., Xyloma h. D.).
—— Lini. — Dsm. 1649. — Fuck. s. 30. — Wstd. 1061. — Fuck. rh. 301.
—— populina. — [S. 482.] — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 10. (Tul.). — Fuck. s. 25. a. u. c. — Kl. II. 493. — cf. Sclerotium pop. u. Perisporium p. — Fuck. rh. 291—293 (cum Ured. longicapsulari).
—— punctiformis. — Dsm. III. 405.
—— salicina. — [S. 482.] — Ann. sc. n. 1854. II. t. 7. f. 6—7. (Tul.) — Fuck. s. 28. a—d. — cf. Uredo Capraear. — Kl. II. 494. — Ital. 798. — Fuck. rh. 296—298. (c. Uredine mixta).
—— Vaccinii. — Wstd. 1259.
Melanconium. — [S. 508.]
—— apiocarpum Lk. — Fuck. s. 126. — Fuck. rh. 89.
—— —— v. Alni. — R. f. 469.
—— atrum Lk. — Wstd. 573.
—— betulinum. — Wstd. 132. — Kl. 685. — Fuck. s. 124. — Voges. 670. — Letell. 704. 1 (Didymospor. elevat.). — Fuck. rh. 85.
—— bicolor. — [S. 509.] — Bisch. f. 3835. — Kl. 574. 1470. — Kl. II. (a.) 590. — Fuck. s. 123. a. — Letell. 704. 3. — Fuck. rh. 84.
—— —— f. ramulorum. — Kl. 1470. — Kl. II. (b.) 590.
—— conglomeratum. — [S. 509.] — Coniothec. Amentac. Cd. — Wstd. 573.
—— glomeratum Wllr. — Wstd. 573.
—— juglandinum. — Kl. 777. — Kl. II. 279. — Fuck. s. 128. a. b. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 19. (Hoffm.). — Wstd. 1189. — Fuck. rh. 87. 88.
—— Juglandis. — [S. 509.] — Cd. Anl. t. F. f. 57: 10—14. — Krypt. Bad. 324. — Wstd. 1189.
—— melaspermum. — [S. 413.] — Dsm. III. 753.
—— microsporum. — Wstd. 140. — Ns.: Fuck. s. 127.
Melanconium ovatum. — Lk.: Kl. 684. — Dsm. 139. — Voges. 1257. — Wstd. 131. — Ital. 655.
—— ovoideum Lk. — Kl. 776.
—— Papularia. — [S. 509. P. F.]
—— pyriforme. — Wstd. 577.
—— sphaeroideum Lk. — [S. 509.] — Dsm. 140. — Letell. 704. 4.
—— sphaerospermum. — [S. 509.] — Kl. 573. — R. f. 179. — Fuck. s. 125. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 5. (Keimg. Hoffm.). — Voges. 1258. — Wstd. 392.
—— sphaerosporum Wllr. — Wstd. 392. — Fuck. rh. 86.
—— stromaticum. — Kl. 1359. — Fuck. rh. 90.
—— vulgare. — [S. 508.] — Kl. 1388. (Crypt. Neesii p. ptc.).
Melanocybe. — [S. 400 *.]
Melanogaster. — [S. 437.]
—— ambiguus. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 24. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 12. f. 5; t. 2. f. 5.
—— —— Cd. Ic. cf. Mel. Klotzschii Cd. — cf. Hyperrhiza liquaminosa.
—— Broomeianus Berk. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 17. f. 23. (Fructif. Tul.). — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 90.
—— —— Cauvin Mont. — cf. Splanchnomyc. — Brit. f. 285.
—— Klotzschii Cd. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 88. — cf. Melan. ambiguus Cd.
—— rubescens. — Tul. F. hyp. t. 2. f. 6; t. 12. f. 7. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 92.
—— tuberiformis. — Cd. Anl. t. C. f. 37: 1—3. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 89. — Sturm h. 11. t. 1.
—— variegatus. — Ann. sc. n. 1843. t. 17. f. 22. (Fructif. Tul.). — Tul. F. hyp. t. 2. f. IV, 7; t. 12. f. 6. — Pay. b. cr. p. 114. f. 530. — Cd. Ic. VI. t. 9. f. 91.
—— —— v. Broomeianus. — Tul. F. hyp. t. 2. f. IV. 1—6. — cf. Melan. Broom. B.
Melanosorus. — cf. Rhytisma.
Melanospora barbata. — [S. 396. Scop.] — Alger. t. 25, 3.
—— chionea. — [S. 396*.] — Cd. Anl. t. F. f. 55: 8—10. — Bail S. t. 17.
—— cirrhata. — Brit. f. 325.
—— Coemansii. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 8 (Wstd.).
—— Zamiae. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 11—12.
Melanostroma. — [S. 363***.]
—— fusarioides. — Sturm h. 9. t. 61.
—— minutum. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 11—12.
Melanotrichum. — [S. 495***. 503*.]
—— microspermum. — Sturm h. 13. t. 45.
Melasmia. — Rhytisma.
—— acerina. — [S. 423. 424.] — Voges. 1470. — Wstd. 929.
Melidium. — [S. 489.]
—— subterraneum Eschw. — Bisch. f. 3735.
Meliola. — [S. 406. 503*.] — Froriep Tagesberichte. 1852. no. 592. 593. ic. (Bonnet).
—— amphitricha Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 2. — Berk. In. p. 273. f. 62. d. — Carol. I. 70.
—— cymbisperma. — Berk. In. p. 273. f. 62. c.
Melittosporium aeruginosum Cd. — Kl. 924.
—— versicolor. — Cd. Anl. t. G. f. 63: 5—8. — Bail S. t. 19.
—— —— v. lacteum. — Kl. 925.
Melogramma. — [S. 386.] — cf. Sphaeria.
—— ambiguum. — Carol. IV. 49.

— Platani Ces. — Tab. Select. II. fig. 235.

Melogramma spiniferum Duby Sfer. It. p. 53. t. 51.
— ferrugineum Ces. et De Not. Sch. p. 30. – Sfer. t. 52

Melogramma oligospermum. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 38. (B. B.).
—— vagans. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 2. (Notar.).
Memnonium. — [S. 495***.]
—— effusum. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 4. — Fuck. rh. 140. — Sturm h. 13. t. 46.
Menispora alba. — Sturm h. 25 —. t. 20. (Preuss.).
—— ciliata. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 2. — Kl. 1436.
—— ellipsospora. — Sturm h. 29 —. t. 47. (Preuss.).
—— glauca. — [S. 495.]
—— pyriformis. — Sturm h. 29—. t. 18. (Preuss.). — Kl. 1760.
—— torulosa. — Fres. t. 3. f. 44—48.
Merisma. — [S. 339*.] cf. Thelephora.
—— cristatum Schum. = Thelephora cr. Fl. dan. — Wstd. 430.
—— fastidiosum P. — Dsm. 76.
—— foetidum. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 77. Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 11—13. — ? cf. Sparassis foetida.
—— tremellosum. — Hoffm. hercyn. subt. t. 14. f. 1.
—— truncatum. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 78. (Fructif.). — Cd. Anl. t. G. f. 73: 14. 15.
Merosporium minutum. — [S. 466.] — Cd. Anl. t. B. f. 7: 6. 7. — Sturm h. 12. t. 23.
Merulius. — [S. 325.] — cf. Cantharellus, Craterellus.
—— applicatus. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 2. (Lév.).
—— aureus. — [S. 325.] — Wstd. 1390.
—— brassicaeformis. — Carol. II. 23.
—— bryophilus. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 12. 13.
—— cantharelloides Schum. = Cantharellus tubaef. Fl. dan. ; — cf. Canth. cibar.
—— —— Sow.: Wstd. 1390.
—— Cantharellus. — Wstd. 340. — cf. Canth. cib.
—— cibarius. — Wstd. 340.
—— collariatus With. — Wstd. 1282.
—— confluens. — Carol. I. 23.
—— Corium. — [S. 325.] — Kl. 1916. — Fuck. s. 961. — Brit. f. 19.
—— Cornucopiae. — cf. Craterellus C.
—— cornucopioides. — Wstd. 192.
—— crispatus. — [S. 325.]
—— crispus P. = Canthar. cr. Fl. dan.
—— cucullatus. — [S. 333*.]
—— cupularis. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 6. — cf. Arrhenia c.
—— daedaleus. — [S. 312*.]
—— destruens. — Dsm. 125. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 7—10.
—— —— P. = lacrymans Fl. dan.
—— fugax. — [S. 325.] — Fl. dan. XII. 2027. 2. (inf.). — Carol. I. 24.
—— galeatus Schum. = Cantharell. g. Fl. dan.
—— himantioides. — [S. 325.]
—— hoedinus. — Carol. IV. 8.
—— incarnatus. — Carol. II. 22.
—— lacrymans. — [S. 325.] — Fl. dan. XII. 2026. — Kops Fl. dan. X. 760. 1. — Loud. f. 16059. — Huss. I. 3. — Hrz. t. 77. — Berk. Out. t. 2. f. 1. — Pay. b. cr. p. 107. f. 484. — Sturm h. 31 —. t. 4. (Szl.). — Kl. 228. — cf. M. destruens. — Lib. 320. — R. f. 508.
—— lutescens P. — Wstd. 1390.
—— molluscus. — [S. 325.]
—— niveus. — [S. 325.]
Merulius pallens. — [S. 325. 10.]
—— petropolitanus. — [S. 325.]
—— porioides. — [S. 325.]
—— pulverulentus Fr. — [S. 325. 13.] — zu M. destruens P. (Tul.).
—— refluxus Gmel. — Wstd. 1390.
—— retirugus. — Fl. dan. XIII. 2340. 2. — Cd. Anl. t. H. f. 76: 11.
—— serpens. — [S. 325; 4.] — Kl. 1006. — Kl. II. 6. — Carol. IV. 9.
—— squalidus. — [S. 325.]
—— Squamula With. — Wstd. 586.
—— terginus Fr. — R. f. 12.
—— tortilis. — [S. 329**.] — Fl. dan. XIII. 2270. 2.
—— tremelloides Schrad. — Kl. 110.
—— tremellosus. — [S. 325.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 10. f. 22. (Fructif. Lév.). — Fuck. s. 960. — Bail S. t. 30. — Kl. II. 7. — Carol. III. 15. — Huss. I. 10. — Lib. 222. — Vent. mi. 63. f. 4.
—— tremulosus Schrad. — Bisch. f. 3447.
—— umbonatus. — cf. Cantharellus.
—— umbrinus. — [S. 325.]
—— Vastator. — [S. 325. 12.] — Fl. dan. XI. 2027. 2. (sup.).
—— villosus P. — Wstd. 1390.
—— xanthopus P. — Wstd. 1390.
Mesenterica. — [S. 521.]
Mesophellia arenaria. — Linn. Trans. 1859. XXII. t. 25. (Berk.).
Metremyces lucidus. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 5. — cf. Mitremyces.
Miainomyces. — [S. 498.]
—— fungicolus. — Sturm h. 13. t. 42.
Microbotryon. — [S. 516. 7.]
—— antherarum. — [S. 516.]
Microcera coccophila. — R. f. 269. (zu Stilbum od. Atractium Tul. Sel. I. 130.). — Dsm. 1350. — Sphaerostilbe cocc. Tul. in sched. — Ital. 543.
Microcrater. — Bail S. t. 20.
Micropeltis. — [S. 398.]
—— applanata Mont. — Sagra, Cuba. t. 12. f. 6.
Micropera. — [S. 413**.]
—— Drupacearum. — Kl. 1960. — Dsm. III. 697. — Carol. IV. 71. — Wstd. 465.
Microplodia Aquifolii. — Bull. ac. belg. Ser. 2. 1857. II. p. 579. f. 7. (Wstd.).
Microsphaera. — cf. Erysiphe.
—— Berberidis. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 10. f. 28. (Lév.). — Erys. Berb. Tul. — R. f. 555.
—— comata. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 23. (Lév.). — R. f. 438. — E. Evonymi DC., comata Rbh.
—— divaricata. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 18. (Lév.). — Wstd. 1387.
—— Dubyi. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 26. (Lév.). — Erys. Lonicerae Tul.
—— Ehrenbergii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 22. (Lév.). — Wstd. 1388.
—— Friesii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 20. (Lév.).
—— Grossulariae. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 25. (Lév.).
—— Hedwigii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 19. (Lév.). — R. f. 296. — Erys. penicill. Fr.
—— holosericea. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 27. (Lév.); ic. mala (Tul. Sel. I. 207.). — R. f. 439. — Erys. Astragali Tul.
—— Mougeotii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 9. f. 24. (Lév.). — Berk. In. p. 278. f. 64. e.

Microsphaera penicillata. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 8. f. 21. (Lév.). — Erys. Alni Tul. — R. f. 437. v. Alni.
—— semitosa B. C. — Berk. In. p. 278. f. 61. c.
Microsticta Pomi. — Dsm. 300.
—— vagans D. — Wstd. 1062. — Perispor. speireum Fr., vagans Dsm. — Depazea speirea Cd. — Dsm. 258. 259; III. 674—676.
Microstoma hyemale. — Nov. Act. XXIII. II. t. LXI. (Milde); = Peziza protracta Fr. — Kl. 1719.
—— vulgare Awd. — R. f. 253.
Microthecium. — [S. 426.]
—— fallax. — Kl. 1948.
—— Zobelii. — Cd. Ic. V. t. 8. f. 53. — Pay. b. cr. p. 78. f. 365.
Microthyrium. — [S. 414.]
—— microscopicum. — Dsm. 492; III. 696. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. (Dsm.). — Cd. Anl. t. F. f. 54: 17—20. — Voges. 1256. — Wstd. 176.
—— Smilacis. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 4. (Notar.). — Kl. II. 654. — Dsm. III. 695. — Ital. (44.) 94.
Micula Mougeotii. — Kl. II. 636. — Hedw. 1858. II. t. 1. f. A. — Sphaeria Micula Fr. El.
—— nivea. — Kl. II. 635.
Midotis. — [S. 362.]
Mitremyces. — [S. 440.] — cf. Metremyces.
—— coccineus. — Ann. nat. hist. III. t. 7. f. 1. (Berk.).
—— fuscus. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 7. f. 1. p. 326. (Berk.).
—— Junghuhnii. — Bot. Zt. 1844. t. 3. B.
—— lutescens. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 15—19. — Bisch. f. 3642. — Carol. I. 76.
—— Ravenelii. — Linn. Trans. XXII. t. 25. (Berk.).
Mitrula. — [S. 347.]
—— Abietis Fr. — Loud. f. 16191.
—— Berterii. — Chile no. 8. f. 5.
—— cucullata B. — [S. 347.] — R. f. 37. — Fuck. s. 873. — Brit. f. 254.
—— —— v. Abietis. — Dsm. 655.
—— —— v. Pini. — Bisch. f. 3378.
—— globosa. — [S. 347.]
—— Heyderi. — Fl. dan. X. 1670. 2. — Cd. Anl. t. G. f. 66: 5.
—— minuta Fr. — Loud. f. 16190.
—— Mucerdae Fr. — Stilbum Muc. Fl. dan.
—— paludosa. — [S. 347.] — M. phalloides Chev. — Loud. f. 16189. — Dsm. 952. — Bail S. t. 21. — Sturm h. 31 —. t. 13. (Szl.). — Kl. 238. — Kl. II. 132. — Brit. f. 278. — Carol. V. 36. — Huss. I. 9. — Wstd. 234.
—— phalloides. — Wstd. 234.
—— spathulata Fr. — Bisch. f. 3266. — Brit. f. 257.
Monas prodigiosa. — ? Fres. t. 9. f. 18. 19. — Presburg. Verh. Verein. f Naturk. 1857. t. 1. (Kolaczek).
Monilia. — [S. 489.]
—— auf Seidenraupen. Robin v. par. t. 7. f. 8.
—— antennata. — Wstd. 433.
—— aurea P. — Loud. f. 16555.
—— caespitosa. — Purton. I. t. 34.
—— candida. — Bon. t. 4. f. 86. — Letell. 642. 2. (Aspergill.). — ? cf. Moniliger.
—— Celtis. — Bivona t. 3. f. 6.
—— cinerea. — Bon. t. 3. f. 78. — R. f. 274.
—— digitata. — [S. 489.]
—— fructigena. — Letell. 638. 2.
Monilia Graminum. — Letell. 638. 1.
—— hyalina Fr. — zu Erysiphe Graminis (Tul.). — Letell. 638. 3. — Wstd. 299.
—— nidulans. — Wstd. 400.
—— penicillata Fr. — Bisch. f. 3755.
—— racemosa P. — Bisch. f. 3805.
—— virens. — cf. Aspergillus v.
—— vulgaris. — Wstd. 196.
Moniliger candidus. — Letell. 668. 3. (Monilia?).
—— peniculatus. — Letell. 668. 4.
Monoplodia Magnoliae. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 19. (Wstd.).
Monosporium. — cf. Peronospora. Botrytis.
—— acuminatum. — Bon. t. 7. f. 165.
—— agaricinum. — Bon. t. 5. f. 112. — Fuck. rh. 154.
—— cellarum. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 8. (Bon.).
—— Chenopodii S—l. = Peronosp. effusa Rbh. (Casp.).
—— corticola. — Bon. t. 5. f. 126.
—— curvatum. — Bon. t. 5. f. 115.
—— decumbens. — Bon. t. 5. f. 116.
—— flavum. — Bon. t. 5. f. 107.
—— griseum. — Kl. 1685.
—— macrocarpum. — Bon. t. 5. f. 125.
—— macrosporum. — Bon. t. 5. f. 125. (cf. p. 96.).
—— membranaceum. — Bon. t. 5. f. 113.
—— niveum. — cf. Peronosp. paras.
—— oxycladum. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 18—20. (Riess.).
—— reflexum. — Bon. t. 6. f. 134.
—— spinosum. — Bon. t. 7. f. 148.
—— torulosum. — Bon. t. 5. f. 123.
—— viridescens. — Bon. t. 5. f. 111.
Monotospora. — [S. 497***.]
—— megalospora. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 15. f. 11. p. 462. (B. B.).
—— sphaerocephala. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 5. (B. B.).
Montagnea. — cf. Montagnites.
Montagnites. — [S. 439.]
—— Candollei. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 146. — Cd. Anl. p. 196. (ic.). — Pay. b. cr. p. 117. f. 550. — Alger. t. 21, 1.
—— Dunalii. — [S. 439**.]
Morchella. — [S. 346.] — Müller, Pflanzenstaat. p. 271. (Copie).
—— bohemica. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 14—16. — Schnzl. t. 16. f. 13. 14. — Sturm h. 14. t. 56.
—— conica. — [S. 346.] — Cd. Anl. t. G. f. 67: 13. — Kl. 1009. a.; cf. M. escul. v. — Dsm. III. 265.
—— costata P. — Vent. mi. 65. f. 4.
—— deliciosa. — [S. 346.] — Kl. 136.
—— distans. — [S. 346.]
—— dubia. — Canar. t. 4. f. 4.
—— elata. — [S. 346.] — Kl. 1009. b.
—— esculenta. — [S. 346.] — Kops Fl. bat. IX. t. 670. — Berk. Out. t. 21. f. 5. — Vent. t. 11. f. 107—109. — Roq. t. 1. f. 4. 5. — Hrz. t. 50. — Loud. f. 16197. — Bail S. t. 21. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 6. — Dsm. III. 264. — Carol. I. 36. — Badham t. 12, 2. — Huss. I. 13. — Vent. mi. 52. — Staude t. 1. f. 4. 5. — Ital. 869. — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 2. f. 18—21. (Asci).
—— —— v. conica Fr. — Bisch. f. 3302. — cf. M. con.
—— hybrida. — Dietr. Fl. boruss. t. 534.
—— patula P. — [S. 346.] — Bisch. f. 3301. — Loud. f. 16198.
—— praerosa. — Pay. b. cr. p. 85. f. 382.

Microst. Dyrayea Speirea Cord. Ic. ii. p. 27. t. 13. f. 98

Mycen. Corium Desv. in Summer. of Fungi Unterhoge
Nº 72. Tab. XXII. F. 2. –

Myriocephalum botryosporum. — Fres. t. 5. f. 1—9. — Fuck. s. 119. a., 120. — Microsc. Journ. IV. t. 11. f. 1—9. (Curr.). — Ital. 546.
—— —— v. Carpini. — Kl. 1884.
—— densum. — Fuck. Nass. 23. = M. botr. Fres. t. 5. f. 4. 5. — Fuck. s. 119. a. b. — Fuck. rh. 96. 97.
—— hederaecolum. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 10. (Notar.) = M. botryospor. (t. Mont.). — Kl. 1969.
—— —— Not. (Thyrsidii sp. Mont.) Kl. II. 593. — zu densum: Fuck. Nass. 23.
—— laxum. — Fuck. Nass. 23. = M. botr. Fres. t. 5. f. 9. — Fuck. s. 120. — Fuck. rh. 98.
Myriococcum. — [S. 438.]
—— praecox. — [S. 439.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 39. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 4—6. — Bisch. f. 3697. — Kl. 929.
Myriophysa. — [S. 481.]
Myriophyton. — cf. Myioph.
Myriostoma. — [S. 441.] — cf. Geaster.
—— coliforme. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 16. 17. — Pay. b. cr. p. 63. f. 279.
Myriothecium. — cf. Myrothec.
Myropyxis caricicola. — Kl. 1429; it. Ct. XVI.
—— graminicola. — Kl. 1541.
Myrosporium. — [S. 458*.]
—— coccineum. — Sturm h. 12. t. 32.
Myrothecium. — [S. 448.]
—— fuscum. — Bon. t. 10. f. 216.
—— gramineum. — Lib. 380.
—— inundatum Td. — [S. 448.] — Bisch. f. 3625. — Fuck. s. 301. — R. f. 571. — Fuck. rh. 165. — Sturm h. 1. t. 3.
—— luteo-album. — Bon. t. 10. f. 214.
—— roridum Td. — [S. 448.] — Bisch. f. 3685. — Fuck. rh. 166.
—— scybalorum. — [S. 448.] — Fl. dan. XII. 2083. 1.
—— Verrucaria. — [S. 448.] — Bisch. f. 3627. — Kl. 1855. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 5—8. — Sturm h. 1. t. 4.
—— Vitis. — Bon. t. 10. f. 215.
Mystrosporium. — [S. 506.]
—— aterrimum. — Carol. IV. 86.
—— dubium. — [S. 506.]
—— pulchrum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 9.
—— pyriforme. — Dsm. 1094.
—— Stemphylium. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 9. — Pay. b. cr. p. 73. f. 324.
Mytilinidion aggregatum. — Dub. Hyst. t. 1. f. 3. (Hysterium a. DC. non Rbh. exsicc.).
Myxarium. — [S. 477*.]
Myxocladium. — [S. 503***.]
Myxocyclus confluens. — Fres. t. 7. f. 41—45. — ? R. f. 264. — cf. Stegonospor. mur.
Myxomphalos. — [S. 359.]
Myxonema. — [S. 486. 496**. 520.]
—— assimile. — R. f. 280.
Myxormia atroviridis B. B. — R. f. 63. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 12. f. 9. p. 457. (B. B.).
Myxosporium. — [S. 413.] — cf. Nemaspora.
—— Cameliae. — Lotos 1857. VII. t. 1. f. 3.
—— corallinum. — Lotos. 1858. t. 1. f. 15. (Peyl.).
—— croceum. — Cd. Anl. t. B. f. 3: 14—16.
—— nitidum. — Carol. IV. 70.
—— paradoxum. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 10. (Notar.).
—— quercinum Lasch. — Kl. 1076.
Myxothecium. — [S. 407.]
Myxotrichum. — [S. 502. 494.] — cf. Actinospira.
—— aeruginosum Mg. — ? Kl. II. 179.
—— chartarum Kz. — [S. 498†. 502**. 503.] — Dsm. 106. — Fl. dan. XIII. 2277. 1. — Actinospira ch. Cd. — Sturm h. 29 —. t. 40. (Preuss.). — Bisch. f. 3758. — Kl. 1675. — Kl. II. 179. — Brit. f. 207. — Letell. 679. 4. (Sporotrich. ch.). — Ann. Mg. n. h. 1862. IX. t. 6. p. 32. (Church).
—— deflexum. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 8. f. 9. (Berk.).
—— fuscum. — [S. 502**. 503.] — Fl. dan. XIII. 2277. 3.
—— molle. — [S. 503.]
—— murinum. — [S. 502.]
—— murorum. — [S. 498†. 502**.] — Cd. Anl. t. B. f. 8: 4—6.
—— patulum. — [S. 502.]
—— rarum. — [S. 503.]
—— Resinae. — [S. 502.] — Kl. II. 780. — Fuck. rh. 129.

Naemaspora. — [S. 413.] — Nemaspora.
—— aurea. — [S. 414.] — Bisch. f. 3884. — Kl. 171. — Kl. II. 584. — Ital. 448. (Libertella betul. Dsm., Naemasp. croc. Fr. Scler.).
—— Carpini Sow. — Loud. f. 16613.
—— chrysosperma. — Fres. t. 4. f. 30—34. — Wstd. 323.
—— coerulea. — Fres. t. 5. f. 24—30. — Kl. 1756.
—— crocea. — [S. 413*. 414.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 3. (Dsm.). — Cd. Ic. I. t. 6. 7. — Fres. t. 4. f. 35—39. — Bisch. f. 3885. — Fuck. s. 419. — Kl. 170.
—— —— Fr. = Libertella cr. Bon. — Voges. 177. — Brit. f. 104. — Carol. V. 74. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 2. — Lib. 261. — Wstd. 338. — cf. N. aurea, — Schweiz. 12.
—— encephaloides Spr. — Wstd. 138.
—— epiphylla. — cf. Spilosphaeria Saponariae.
—— grisea. — [S. 414.] — Bail S. t. 16. — Lib. 389.
—— incarnata. — [S. 414.] — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 2. (Dsm.). — Lib. 262. — Wstd. 438.
—— inquinans Spr. — Wstd. 371.
—— leucomyxa Cd. — cf. Cytispora l. — R. f. 357.
—— microspora. — Ann. sc. n. 1830. XIX. t. 5. f. 1. (Dsm.).
—— —— Lib.: status spermogonifer Nectriae cinnabarinae. R. f. 324. — Lib. 388. — Wstd. 138.
—— Mougeotii. — Voges. 1471.
—— orbicularis. — [S. 414.]
—— persicina. — Fres. t. 3. f. 53—55.
—— Plantaginis. — Kl. 1664.
—— Ribis. — [S. 414.]
—— Rosae. — Bisch. f. 3886.
—— Rosarum Grev. — Loud. f. 16615.
—— Salicis. — Cd. Anl. t. F. f. 57: 5—9. — Cd. Ic. III. f. 70.
—— Tiliae Reb. — Wstd. 533.
Naematelia. — [S. 477*. 476.]
—— encephala. — Brit. f. 291.
—— frondosa. — Bon. t. 11. f. 232. — Fuck. s. 887. (Tremella fr. P.).
—— nucleata. — [S. 477*.] — Carol. IV. 82.
—— rubiformis Fr. — Bisch. f. 3448. — Bail S. t. 22.
—— virescens. Cd. Anl. t. G. f. 70: 10. 11.
Naevia. — [S. 373.]
—— Lauri. — Ital. 491.
Nassula. — [S. 456.]

Myxotrichum.

—Chartarum K^e. Mycet. heft. 11. p. ~~90~~ et p. 63. Sub Oncidio. Tab. 11. fig. 1.

—Murorum Kz. —Cord. Icon. 11. pag. 10. Tab. x. f. 52.

Myxormia atroviride. Affin. Catinula, Excipula on Bark!

Nectria Rousseliana Mont. Castag. Catal. Pl. Marseille Suppt. pag. 44 — et var. viridis Berkel. notice Brit. Fungi no. 898. (Ann. Mag. N. Hist. 1859. Tom. III.

Odontia bugellensis. — Kl. 1915. — Kl. II. 210. — Ital. 536.
—— barba Jovis. — [S. 329.] — Cd. Anl. t. G. f. 74: 3. 4.
—— compacta = Phlebia hydnoides. — [S. 329.]
—— crustulata. — [S. 329.]
—— fimbriata = Sistotrema f. P. — [S. 329.]
—— lateritia. — Carol. V. 22.
—— Pruni. — Kl. 1514.
Odontostroma. — [S. 441.]
Oedemium. — [S. 501.]
—— atrum. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 3. — Bisch. f. 3816. — Sturm h. 6. t. 9.
Oedocephalum album Preuss. — Sturm. h. 36. t. 2.
—— alienum Preuss. — Sturm h. 36. t. 3.
—— crystallinum. — Hedw. I. t. 4. f. 3. — ? Kl. 1974.
—— elegans Preuss. — Sturm h. 36. t. 1.
Oidium. — [S. 494.] — cf. Torula, Erysiphes conidia.
—— in sero sanguinis: Hoefle, Chemie u. Mikrosk. 1848. Anm. p. 29. ic.
—— in ovis gallin. — cf. Dactylium oogen.
—— in graminibus. — Linn. Trans. 1838. XVIII. t. 33. (F. Bauer).
—— Aceris. — Kl. 1892.
—— acutatum. — Bot. Zt. 1861. t. 8. f. 7. p. 196. (Bon.).
—— aeruginosum. — [S. 494.]
—— anguinum. — Fres. t. 3. f. 40. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 13. (Bon.).
—— aurantiacum. — Dsm. III. 553.
—— aureum. — [S. 448. 494.]
—— Berberidis. — Fres. t. 9. f. 12.
—— botryoides. — Kl. 1671.
—— bulbigerum Fr. — cf. Torula.
—— bullatum. — Journ. hortic. soc. 1854. IX. p. 51. (Berk.).
—— candidum. — Bon. t. 3. f. 82.
—— chartarum Lk. — Dsm. 115. — Wstd. 149. — Torula ch. Cd.
—— Chrysanthemi. — Kl. 1763. — Dsm. III. 552.
—— crystallinum. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 9. (Lév.).
—— Epilobii. — Dsm. III. 256.
—— erysiphoides Fr. — [S. 494.] — Kl. 184. — Dsm. 507. — ? zu Erysiphe. comm. (Tul.). — Dsm. III. 158. — Wstd. 435. — Krypt. Bad. 316.
—— —— f. Cucurbitarum. — R. f. 87.
—— —— f. Pisi sativi. — R. f. 276.
—— Favorum. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 14. p. 463. (B. B.).
—— fructigenum. — [S. 494.] — Bisch. f. 3822. 3823. — Dsm. 155. — Kl. II. 80. — Carol. II. 84. — Lib. 83.
—— —— f. Prunorum. — Dsm. 114.
—— fulvum. — [S. 494.] — Kl. 1478. — Brit. f. 295.
—— fusisporioides Fr. — [S. 494.] — Kl. 1286. — R. f. 277. — Dsm. 230. 651. — Dsm. 1542. (Fusispor. lact.) u. 1734. — Wstd. 1300. (Violae). — Krypt. Bad. 146. (Lamii). — Fuck. rh. II. 132—137.
—— —— f. Glechomatis. — Kl. II. 491.
—— —— f. Lamii. — Kl. II. 492.
—— —— f. Urticae. — Kl. II. 271.
—— —— f. Urticarum. — R. f. 88.
—— —— f. Violae Fr. — Kl. II. 586. (Fusisporium lacteum Dsm.).
—— lactis. — Fres. t. 3. f. 41—43. — R. f. 588.
—— —— v. luxurians. — Kl. 1885.
Oidium Lamii. — Kl. 1777.
—— Leuckartii. — cf. Mucor melitt.
—— leucoconium. — Ann. sc. n. 1829. XVII. t. 6. A. (Dsm.). — zu Erysibe pannosa Tul. — ? huc Oid. Ros. Fres. — Sturm h. 29 —. t. 34. (Preuss. = Crocysporium fallax Bon.). — Kl. 1778.
—— —— Dsm.: Sphaerotheca pannosa. — Brit. f. 100. — Carol. III. 81. — Wstd. 434. — R. f. 587.
—— monilioides Ns. (Acrosporium). — [S. 494.] — Kl. 73. — R. f. 169: forma graminum. — Fuck. s. 168. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 22. (Hoffm.). — zu Erysiphe graminis Tul. — Dsm. III. 257. — Carol. II. 85. — Wstd. 299; v. Rosac.: 431.
—— —— f. Leonuri. — Kl. II. 272. (c. ic.) = O. erysiphoid. (Tul. Sel. I. 215.).
—— opuntiaeforme. — Kl. 1672.
—— Polygoni avicularis. — Fres. t. 9. f. 17.
—— Porriginis Mgh. — cf. Achorion Schönleinii Rem.
—— radiosum. — Lib. 285.
—— Rosarum. — Fres. t. 9. f. 13. — ? leucocon. Dsm.
—— rubens Lk. — Wstd. 309.
—— Schönleinii Fr. — cf. Mycoderma Favi Gruby.
—— simile. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 4.
—— Tanaceti ? — Fres. t. 9. f. 16.
—— Tritici. — Lib. 385. — Kl. II. 81. — R. f. 477.
—— Tuckeri. — Traubenpilze. J. Crocq, Rech. s. l. malad. de la vigne, mit 3 Taf. (Mém. d. sav. étr. de l'Acad. r. sc. Belgique. 1851—1853. Tom. XXV. Brüssel. 1854. 4to.). — Journ. hort. soc. 1853. VIII. p. 235. (cum Cicinobolo); u. 1854. IX. p. 69: 6. 7; p. 70: 5. (Berk.). — Fres. t. 9. f. 14. — Fuck. s. 169. — Bot. Zt. 1853. t. 11. (Mohl): = Crocysporium fallax Bon. — Willkomm, Wunder d. Mikr. 1856. p. 89. f. 42. — Regel, Gartenflora. 1852. t. 21. f. 1—6. — Kl. 1669. — Natur, v. Müll. u. Uhle. 1861. p. 29. (c. fruct., Bettziech). — Schacht, Baum. 1860. p. 314. — zu Erysiphe Tuckeri Berk.: Journ. hort. soc. London. 1855. IX. p. 68—70. ic. — Dsm. 1733. (ed. 1850.). — Wstd. 771. — Fuck. rh. 131.
—— Uredinis. — [S. 505.]
—— velutinum. — Kl. 1670.
—— violaceum. — Ann. sc. n. 1846. VI. t. 6. f. 16. 17; u. 1848. IX. t. 9. f. 16. 17. (Harting). — Schacht, Kart. t. IX. f. 8; t. X. f. 1.
—— virescens. — [S. 494.]
Ombrophila. — [S. 357.]
Oncidium. — cf. Actinonema.
Oncomyces. — cf. Sphaeria. — Bail S. t. 22.
—— carneo-albus B. B. — R. f. 134.
Onygena. — [S. 446.]
—— agaricina S. — cf. Asterophora phys.
—— corvina A. S. — [S. 446.] — Bisch. f. 3617. — Pay. b. cr. p. 99. f. 457. — Berk. In. p. 273. f. 62. b. — Ann. sc. n. 1844. I. t. 17. f. 1—11. (Tul.).
—— equina. — [S. 446.] — Ann. sc. n. 1844. I. t. 17. f. 12—17. (Tul.). — Cd. Anl. t. C. f. 27: 20—22. — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 96. — Loud. f. 16501. — Bisch. f. 3611. — Berk. In. p. 273. f. 62. a. c. — Kl. 645. — Voges. 775.
—— faginea. — [S. 446.] — Kl. 1724. — cf. Pilacre et Botryochaete.
—— hypsipus Ditm. — Sturm h. 1. t. 12.
—— piligena. — [S. 446.]

Oid. aurantiacum Levéil. — Penicillium Sitophilum Mont.

Ollula Pezizoidea Levéil. Fung. Novo-Granatens.
in Ann. Sc. nat. 4e Ser. XX. Sem. p. 18.

Oxysporium armatum Levéil. Fung. novo-Granat.
in Ann. Sc. nat. 4e Ser. XX. Scott. p. 19. –

Oogaster algericus. — Cd. Ic. VI. t. XVI. f. 122. = Terfezia Leonis Tul. u. Tulasneinia Leonis.
—— Berkeleyanus. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 118.
—— brumalis Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 127.
—— cerebrif. Cd. — cf. Hydnobolit. cereb. Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 121.
—— cibarius Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 126. = O. gulonum Cd. cf. p. 74. — Französ. Trüffel. = O. melanospor. Cd. ?
—— gulonum Cd. — Cd. Ic. VI. t. 17. f. 125.
—— Lespiaultii Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 119.
—— leucophloeus Cd. — cf. Oog. brumalis Cd.
—— melanosporus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 124.
—— nitidus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 15. f. 117.
—— rufus Cd. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 123.
—— Venturii. — Cd. Ic. VI. t. 16. f. 120.
Oomyces carneo-albus B. B. — Fuck. s. 501. — R. f. 131.
Oospora chartarum Wllr. — Wstd. 149.
—— monilif. Wllr. — cf. Oidium monilioides. — zu Erysiphe Gram. Tul. — Wstd. 299.
Opegrapha. — cf. Lichenes.
—— coccinea. — Wstd. 316.
—— culmigena Lib. — Wstd. 66.
—— Epilobii Lib. — Wstd. 66.
—— herbarum Mont. — Wstd. 66.
—— herpetica v. disparata. — Wstd. 315.
—— macularis Ach. — cf. Psilonia faginea. — [S. 402**.]
—— Prostii Nyl. = Hysterium Pr. Dub.
—— rimalis Wahl. — Wstd. 315.
—— rubella Duf. — Wstd. 315.
—— rufescens P. — Wstd. 315.
—— rugosa Schaer. — cf. Psil. fag.
—— scripta Duf. — Wstd. 405.
—— verrucarioides. — Wstd. 315.
Ophiobolus acuminatus Dub. — Kl. II. 57.
—— disseminans. — Hedw. I. t. 4. f. 8. — Kl. 1823 u. 1944. — Kl. II. 530.
Ophiotheca. — (affinis Arcyr. et Didermati).
—— chrysosperma Curr. — Micr. Journ. II. p. 240. t. 9. f. 1—5. (1851).
Ophiotrichum. — [S. 503.]
Orbilia. — [S. 357.] — cf. Peziza.
Ospriosporium. — [S. 481***. 503.]
—— atrum. — [S. 503.] — Cd. Anl. t. B. f. 13 : 4. — Sturm h. 12. t. 24.
Ostraoococcum. — [S. 460.]
Ostracoderma. — [S. 447. 448.]
—— pulvinatum. — ? Fuck. rh. 162.
Ostreichnion americanum. — Duby Hyst. t. 1. f. 1.
—— europaeum. — Duby Hyst. t. 1. f. 2. (Lophium unguiculat. Wllr.).
Ostropa. — [S. 401.] — cf. Sphaeria, Hysterium.
—— cinerea. — [S. 401.] — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 5. (Notar.) = Sphaeria barbara Fr. s. (Dub.). — Flor. alger. I. t. 26. f. 4. (Dur. Mont.). — Kl. 1825. — Kl. II. 527.
—— truncata. — [S. 401.]
Ottaviania. — cf. Octaviania.
Ozonium. — [S. 521.]
—— aurantiacum Lk. — Dsm. 158. — Loud. f. 16561. — Fuck. s. 204.
—— aureum Dub. — Wstd. 699.
—— auricomum Lk. — Wstd. 432.
—— candidum Mart. — Kl. 907. — Fuck. s. 203.
—— fulvum. — cf. Agaric. ozonoides.

Pachnocybe. — [S. 467.]
—— albida. — cf. Sporocybe alb.
—— subulata. — cf. Periconia sub.
Pachyma. — [S. 444.]
Pachyphloeus. — [S. 437.]
—— citrinus B. B. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 114. (Rhizopog. pach.).
—— ligericus. — Tul. F. hyp. t. 14. f. 5.
—— melanoxanthus. — Tul. F. hyp. t. 4. f. 6. t. 14. f. 4. — Cd. Ic. VI. t. 14. f. 113. (Rhizopog. mel.).
Pactilia. — [S. 472.]
Panhistophyton ovatum. — Virchow, Arch. f. path. Anat. 1857. XII. t. 6. f. 16. 17; u. Berlin. entom. Zeitschr. 1858. t. 1; t. 2. f. 6. 8—11; t. 3. f. 13; t. 4 6. (Lebert).
Panus. — cf. Agaricus.
—— areolatus. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9. f. 3. (Berk.).
—— conchatus. — [S. 314.]
—— cyathiformis. — Bail S. t. 32.
—— dealbatus. — Carol. V. 9.
—— dorsalis. — Carol. II. 13.
—— farinaceus. — [S. 315.]
—— foetens. — Carol. I. 5.
—— griseo-tomentosus. — [S. 561.]
—— patellaris. — [S. 315.]
—— rudis Secr. — Ital. 140.
—— Sprucei. — Hook. Lond. J. VIII. t. 5. f. 6.
—— stypticus. — [S. 315.] — Kops Fl. bat. XI. 805. 1. — Roq. t. 10. f. 5. — Kl. II. 207. — Fuck. s. 1030. — Bot. Zt. 1860. t. 13. f. 4. (Hoffm.). — Krypt. Bad. 339. — Carol. II. 12. — Ital. 139.
—— torulosus. — [S. 314.] — Kl. 1910. — Agar. carneo-tomentos. Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 31. (Hoffm.).
Papularia. — [S. 509.]
—— Arundinis Cd. — [S. 509.] — Kl. 1486. — Fuck. rh. 99.
—— concentrica. — Dsm. 485.
—— Fagi. — [S. 509.]
Papulaspora sepedonioides. — Sturm h. 29—. t. 45. (Preuss.). — Berk. In. p. 305. f. 69. b. — R. f. 80.
Parmularia. — [S. 414.]
Passalora. — [S. 500.]
—— bacilligera. — Fresen. t. 11. f. 55—58. p. 93. (Cladospor., Mont.).
—— penicillata Ces. — Kl. II. 587. (Cercospora, Fresen. p. 93).
—— polythrincioides. — Fuck. rh. 103. fsc. 2.
Patellaria. — cf. Peziza.
—— arduennensis. — [S. 365.]
—— atrata. — [S. 366.] — Kl. 521. — R. f. 33. — Mag. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. h—k. p. 225. (Fructif., Berk.). — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 9. 10. (Curr.).
—— Carestiae. — Ital. 776.
—— clavispora. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 8. (Curr.).
—— concolor. — [S. 365.]
—— connivens. — [S. 366.]
—— discolor. — [S. 366.] — R. f. 528. (Pez. fallax Dsm.).
—— Lecideola Fr. Su. = Peziza Fr. — [S. 366.]
—— lignyota. — [S. 366.]
—— melaleuca. — [S. 366.]
—— melaxantha. — [S. 366.] — Kl. II. 709. — cf. Pez.: Ital. 774.
—— microsticta. — Alger. t. 28, 7.
—— proxima. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 18. p. 451. (B. B.).
—— rhabarbarina. — Carol. V. 46.
—— rhizogena. — Chile n. 8. f. 7.
—— Rubi. — Lib. 231.



Per. alsinearum De Bary Champ. Par. An. S. nat. 1863.
Tom. XX. Pl 8-17.—

Per. calotheca De Bary loc. cit. Pl. 9. Fig. 9. 10.

Per. densa Rab. De Bary champ. parasit. in An. Sc. nat. 1863
Tom. XX. p17. Pl. 7.—

Per. effusa De Bary loc. cit. Pl. 8.

Per. gangliformis De Bary loc. cit. Pl. 8. f. 1-6.

Per. leptosperma De Bar. loc. cit. XX. Pl. 9. f. 1, 2.

Per. macrospora De Bary. Crypt. Parasit. in
An. Sc. nat. 1863. Tom. XX. p. Pl. 7. f. 10-15.

Per. parasitica De Bar. loc. cit. Pl. 9. f. 5-8.

Per. Radii De Bary. An. S. n. loc. cit. Pl. 9. f. 3. 4.

Per. Solani De Bary Champ. Parasit. in An. Sc.
nat. Tom. XX 1863.—Pl. 5, 6.—

Peron. Umbelliferarum De Bary Champ. parasit. in An.
Sc. nat. Tom. XX 1863. Pl. 4.—


Per. violacea Berk. in Westend. Crypt. Supp. p. 343.

Perisporium betulinum Fr. — [S. 404.] — Bisch. f. 3681. — Wstd. 279.
—— Brassicae. — Lib. 280.
—— circinans. — Voges. 1097.
—— disseminatum. — [S. 404.]
—— elegans Fr. — cf. Sphaeronema el. Not.
—— exuberans Fr. — [S. 404.] — Kl. 978.
—— fagineum. — [S. 404.]
—— ?fibrillosum. — Dsm. III. 766. 767.
—— Graminearum Fr. = Crocicreas Gr. Fr. Su. — Fuck. s. 401.
—— gramineum. — [S. 418. 1.] — Kl. 1322.
—— Juglandis Lasch. — Kl. 1060.
—— ?occultatum. — Kl. II. 721.
—— poliotum Fr. — Dsm. 1021; III. 765.
—— populinum Wllr. — Melampsora pop. — Wstd. 77.
—— princeps. — Brit. f. 287.
—— speireum Fr. — Kl. II. 570. Depazea sp. Cd., Microsticta vagans Dsm.
—— Tragopogi. — [S. 402.]
—— vagans Dsm. = Microsticta. — Dsm. 258.
—— vulgare. — [S. 404. 6.] — Cd. Anl. t. F. f. 55: 1—7. — Pay. b. cr. p. 61. f. 249; p. 96. f. 442.
—— Zeae. — Dsm. 127. — Carol. III. 65. — Wstd. 492.
Perona. — [S. 333.]
Peronospora. — [S. 493. 191*.] cf. Botrytis, Monosporium, Artotrogus.
—— affinis Rossm. — Kl. II. 489. — Fuck. rh. 22.
—— Alliorum. — Fuck. rh. 41.
—— Alsinearum Casp. — Kl. 1878! (non Ung.). — Fuck. s. 179. — R. f. 377. — Fuck. rh. 20.
—— alta. — Fuck. rh. 39.
—— Arenariae. — Fuck. rh. 18.
—— calotheca. — Kl. II. 673. — Fuck s. 177. (Sporang.). — Fuck. rh. 28. 29.
—— candida. — Fuck. rh. 38.
—— Chenopodii. — Kl. 1776. = effusa Rbh. (Casp.).
—— conferta. — [S. 493.] — Bot. Zt. 1847. t. 4. f. 7. — Fuck. rh. 16. 17. — Kl. 1878. P. Alsinear. Casp.
—— conglomerata. — Fuck. rh. 25.
—— crispula. — Fuck. rh. 23.
—— crustosa. — [S. 493.]
—— curta. — Berk. Out. t. 1. f. 7. b.
—— densa. — Casp. Schimmel. f. 27. — Fuck. s. 171. — Kl. 1572. — Kl. II. 173. — Dsm. III. 412. — Fuck. rh. 34.
—— Dentariae. — R. f. 86. — Fuck. rh. 7.
—— destructor. — [S. 493.]
—— devastatrix. (cf. P. Solani). — Fuck. rh. 37.
—— Dipsaci. — Fuck. rh. 32.
—— effusa. — Kl. 1776, 1880. — Fuck. s. 170. a. b. — Dsm. III. 258. — cf. Botrytis farin. Fr. u. effusa Grev. — Fuck. rh. 11—14.
—— —— f. Fumariae off. — Dsm. III. 410.
—— —— f. Hyoscyami. — R. f. 291.
—— —— f. intermedia. — Kl. II. 490.
—— —— f. major. — Kl. II 171.
—— —— f. minor. — Kl. II. 172; 323.
—— —— f. Papaveris. — Dsm. III. 411.
—— —— f. Ranunculac. — Dsm. III. 409.
—— —— f. Ranunculi. — Krypt. Bad. 328.
—— Euphorbiae. — Fuck. rh. 40.
—— farinosa. — [S. 493.]
—— Ficariae Tul. — R. f. 85. — Fuck. rh. 3.
—— Galii. — Fuck. rh. 30.
—— ganglioniformis. — Bot. Zt. 1843. t. 3. f. B. — Fuck s. 172. — Transact. hort. soc. 1846. I. 31. (Berk.). — Kl. II. 168. 326! — R. f. 290. — ?cf. Botrytis geminata. — Fuck. rh. 33.
Peronospora grisea. — Kl. II. 322. (?var. n. effusa. Kl. II. 323., Casp.). — Fuck. rh. 9.
—— —— Medicaginis. — Kl. II. 775.
—— —— minor. — Kl. II. 323. cf. P. Papav.
—— —— Trifolii. — R. f. 375. (cf. et P. Papaveris Tul.).
—— Hepaticae. — Casp. Schimmel. f. 22—26. — Kl. 1972.
—— Holostei. — Kl. II. 774.
—— infestans. — cf. P. Solani.
—— Lamii. — Kl. II. 325. — Fuck. s. 176. — Fuck. rh. 36.
—— Lepigoni. — Fuck. rh. 21.
—— leptosperma de B. — R. f. 574.
—— lilacina Fres. = effusa Kl. 1880.
—— macrocarpa. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 21.
—— —— Rbh. (non Cd.) zu P. Umbellif. Csp. — Kl. 1172; it. Cent. XV; it. Cent. XVII. — R. f. 373. — Botrytis crustosa Fr. — Fuck. rh. 2.
—— —— f. elongata. — R. f. 374.
—— macrospora Casp. = Botrytis crustosa Fr.
—— Myosotidis de B. — R. f. 572.
—— obovata B. — R. f. 289. — Fuck. rh. 19.
—— ochroleuca. — Kl. II. 175. — Fuck. rh. 8.
—— Papaveris T. — Fuck. s. 175. — Kl. II. 323. (= grisea Ung.: Casp.). — Fuck. rh. 4.
—— parasitica. — [S. 493.] — Bon. t. 5. f. 124. — Fuck. s. 174. — Kl. II. 324. — cf. Botrytis par. — Fuck. rh. 5. 6. — Schweiz. 9. — Krypt. Bad. 516.
—— pulveracea. — Fuck. rh. 1.
—— pygmaea. — [S. 493.] — Bot. Zt. 1847. t. 6. f. 8. — Fuck. s. 180. — Fuck. rh. 26.
—— radii de B. — R. f. 573.
—— Rumicis. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 2*. 3. — Pay. b. cr. p. 72. f. 317. — Kl. 1485.
—— Schleideni. — [S. 493. 5.]
—— Scleranthi R. — R. f. 378. — Fuck. rh. 24.
—— Sherardiae. — Fuck. rh. 31.
—— Solani. — Flora 1847. no. 1. f. 7. (Fresen.). — Kl. 1879. — Fuck. s. 178. — Kl. II. 174. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 23. (Hoffm.). — Bot. Zt. 1847. t. 4. f. 1—6. — Regel, Gartenflora. 1854. t. 87. f. 5—10. — Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 88. f. 41. — Berk. Out. t. 1. f. 7. — Bull. Soc. Nat. Moscou. 1856. no. II—IV. S. 301—306. 1 Taf. 8°. (Mercklin). — de Bary, Kartoffelkrkht. 1861. f. 1—11; Ann. sc. n. 1860. XIII. t. 13. f. 1—9. — Schacht, Kartoff. t. 6. f. 5—11. — Kühn, Krkh. t. 7. f. 1. 2. — Dsm. 1092. (ed. 1846). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. p. 439. f. 7. — P. trifurcata, devastatrix, infestans. — Carol. V. 92. — Journ. hortic. Soc. 1846. I. p. 9. t. 1—4. (Berk.). — Fuck. rh. 37.
—— sparsa Berk. — Gardener's Chronicle 1862. p. 308. — Regel's Gartenflora 1863. p. 204.
—— stellata. — Dsm. III. 758.
—— tomentosa. — Fuck. rh. 15.
—— torulosa. cf. Monospor.
—— trifurcata. cf. P. Solani. — [S. 493.]
—— Umbelliferarum. — Casp. Schimmel. f. 28—32. — Fuck. s. 173. a. b. — Fuck. rh. 27.
—— —— f. Aegopodii. — Kl. II. 170.
—— —— v. Berkelei Ces. — Kl. II. 585.
—— —— f. Conii. — Kl. II. 169.
—— —— f. Mei. — R. f. 376.
—— Valerianellae. — Fuck. rh. 35.
Pestalozzia. — [S. 415.]
—— Callunae Ces. — R. f. 161.

Pestalozzia Castagnei. — Dsm. 1090.
—— caulicola. — [S. 416.]
—— conigena. — [S. 416.]
—— funerea. — Wstd. 491.
—— —— v. heterospora. — Dsm. 726. — Kl. II. 63. — Voges. 1262.
—— Guepini. — Dsm. 481. — Cd. Anl. t. F. f. 58: 8—9. — Pay. b. cr. p. 78. f. 361. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 4. — Voges. 1195. (Prostenium Guep. M.). — Wstd. 337.
—— hypericina Ces. — Kl. II. 64.
—— hysteriiformis. — Carol. III. 70.
—— Ilicis. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 21. (Wstd.).
—— Laurocerasi. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 1. (Wstd.).
—— macrospora. — Fres. t. 6. f. 41—45. — Kl. 1663 = Bactridium Bon. (R. f. 473). — Kl. II. 66.
—— monochaeta. — Dsm. 1334. — Kl. 1852. — Ital. 652. — Hendersonia acuminata Lév.
—— pezizoides. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 9. (Notar.).
—— phacidioides Ces. — Kl. II. 65.
—— Quepini. cf. Guepini.
—— ramealis. — [S. 416.]
Peylia racemosa Opiz. — Lotos. 1857. VII. t. 1. f. 1.
Peziza. — [S. 348.] cf. Helotium [S. 354], Dermatea, Cenangium, Niptera, Lachnella, Patellaria. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 33. (Fructif. Lév.). — Linn. 1842. XVI. t. 9. f. 41—48. (Fructif. Nägeli). — Flora. 1847. n. 1. f. 15. (asci. Fresen.). — Müller, Pflanzenstaat. p. 271. (Copie).
—— abacina. — [S. 357.]
—— Abbotiana Sow. — Loud. f. 16276.
—— abietina. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1853. 1. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 66. (Asci). — Pay. b. cr. p. 7. f. 23.
—— Abietis. — [S. 351.] — Voges. 399. — Wstd. 1275.
—— Absynthii. — Kl. 1317.
—— Acetabulum Bull. — [S. 348; 3.] — Loud. f. 16209. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 12—14. — Cd. Ic. III. t. 6. f. 95. = bulbosa (Schnzl.). — Sturm h. 31—. t. 20. (Szl.). — R. f. 316. — Dsm. III. 795. — Viv. 52. — Kl. II. 627. (sulc.).
—— acicularis. — Loud. f. 16278. — (Helotium) v. abietina: Fl. dan. XII. 2015. 1.
—— Aconiti. — [S. 354.]
—— acuum A. S. — Kl. 1022. — Dsm. 1036. — Fuck. s. 797.
—— aeruginosa. — [S. 520.] — Loud. f. 16259. — Fuck. s. 801. — Krypt. Bad. 436. — Brit. f. 281. — Carol. V. 40. — Lib. 328.
—— affinis. — Borcz. fg. ingr. t. 3. f. 1.
—— Afzelii. — Afzel. t. 12. f. 30.
—— agyrioides. — [S. 351. 360, 6.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 5.
—— alabastrina. — [S. 353.]
—— alba Fr. — Fl. dan. XI. 1855. 1.
—— albida. — Dsm. 1604.
—— albo-badia — [S. 351.]
—— albo-marginata Schum. = caulicola, Fl. dan.
—— albo-testacea. — Dsm. 915.
—— albo-violascens. — [S. 365.] — Fl. dan. XI. 1917. 2. — Kl. 142. — [S. 365.] — Letell. 615. 1. (fallax P.). — Lib. 126. — Wstd. 397. — cf. P. velutina.
—— —— v. alba. — Dsm. 119.
—— —— v. nigro-caesia Fr. — Fl. dan. XII. 2082. 2. — Kl. 918.

Peziza Alismatis. — [S. 360.]
—— alutacea. — Fl. dan. XIII. 2275. 1. — Fuck. s. 862.
—— amentacea. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 2. (Cumino). — Kl. 1019.
—— amentalis Schum. = P. Caucus Fl. dan.
—— amenti. — Kl. 1018. — Fuck. s. 802.
—— ammophila. — Alger. t. 28, 2.
—— amorpha. — Voges. 398. — cf. Corticium.
—— amplissima. — [S. 349.]
—— ancilis. — [S. 349.]
—— annularis. — ? Atractob. ubiq. Td.
—— annulata. — [S. 352.]
—— anomala. — [S. 352.] — Fl. dan. XII. 2082. 3. — Dsm. 459. — Fuck. s. 823. — Kl. 524. Kl. II. 307. — Brit. f. 260. — Carol. IV. 20. — Lib. 227. — Wstd. 398.
—— Antzii. — Bull. ac. belg. 1861. p. 174. ic. (Münter).
—— apala B. B. — R. f. 25.
—— applanata. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2081. 3.
—— Aranea. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 1. (Notar.). — Kl. II. 17.
—— araneosa Sow. — R. f. 30.
—— ardennensis Mnt. — [S. 365.] — Dsm. 469. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.). — R. f. 223. (rhabarb.). — Wstd. 992. 1281 (Rosae).
—— arenaria Osb. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1851, 2. — Kl. 732.
—— arenivaga (Phial.). — Dsm. III. 17.
—— arenosa Fuck. — Kl. II. 630. (t. Fuck.).
—— arenula. — [S. 354.]
—— Ariae. — Voges. 888.
—— armeniaca. — [S. 352.]
—— Armeriae Lasch. — Kl. 1126.
—— Artemisiae Lasch. — Kl. 335; it. Cent. XVII. — Kl. II. 623.
—— Artocreas Reb. — Wstd. 919.
—— Arundinariae. — Carol. III. 38.
—— Arundinis. — Kl. 1425. (cf. Cent. XVII.).
—— ascoboloides. — [S. 365 ***.]
—— Aspidii. — Lib. 226. — Ital. 588.
—— aterrima Lasch. — Kl. 336.
—— atrata. — [S. 354.] — Dsm. 123. 713. — Kl. 729. — (Phial.) Voges. 1190. — Brit. f. 68. — Wstd. 99. 993: var. Leguminum.
—— —— v. Ebuli. — Dsm. 1042. u. III. 454. — Kl. 1923.
—— atrides. — [S. 354.]
—— Atropae. — Voges. 686.
—— atro-rufa. — [S. 350. 65.]
—— atro-virens. — [S. 359.]
—— Aucupariae. — Voges. 789.
—— aurantia. — [S. 349.] — Loud. f. 16213. — Bisch. f. 3365. — Hrz. t. 72. B. — Sturm h. 31—. t. 18. (Szl.). — Lindl. v. K. p. 33. f. 5. (Spor.). — Bail S. t. 20. — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 38. 39. (Currey). — Kl. 523. — Fuck. s. 860. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 36. (Hoffm.). — Huss. I. 37. — Wstd. 687. — Ital. 444.
—— aurata. — Carol. III. 37.
—— aurea P. = chrysocoma Fl. dan.
—— aurelia. — [S. 351 *.] — Voges. 783.
—— aurella. — Carol. V. 41. — Lib. 127.
—— auricula Judae Hall. — Wstd. 760.
—— avellana Lasch. — R. f. 28.
—— azurea. — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 15. f. 9. (Lév.).
—— badia. — [S. 349.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 67. (Asci). — Kl. 337. — Berk. Out. t. 22. f. 4. — Huss. II. 13.


Pestalozzia Castagnei Desm. 13e Not. pag. 64. –



Peziza barbata Kz. — [S. 365.] — Fuck. s. 762. — R. f. 429.
—— Batschii. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11. (Balbis).
—— benesuada. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 15. f. 8. 9. (Tul.). — Schacht, Lehrb. An. Phys. II. 1859. t. VI. f. 4.
—— Betuli. — [S. 372.]
—— betulina A. S. — Wstd. 279.
—— bicolor. — [S. 351.] — Loud. f. 16242. — Fuck. s. 836. — Dsm. 457. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Bisch. f. 3357. — Kl. 141. — Kl. II. 224.
—— —— Schum. = cerinea Fl. dan. — Brit. f. 155. — Norweg. 99. — Wstd. 189.
—— —— v. caulicola: R. f. 227.
—— blandula. — Berk. Out. t. 1. f. 13. c. (Spermat.).
—— bolaris. — [S. 353.]
—— brevipila Rob. — Dsm. 1342.
—— brunnea A. S. — [S. 350.] — Kl. 915. — Dsm. 712. — ? Schnzl. t. 16. f. 1—3. — Sturm h. 7. t. 28.
—— —— Batsch: Wstd. 191.
—— brunneo-atra. — [S. 351.] — Dsm. 26.
—— brunneola Dsm. — Dsm. 656. — R. f. 426.
—— bryophila. — [S. 353.]
—— bulbosa. — [S. 348.] — Bisch. f. 3341. — Sturm h. 31—. t. 21. (Szl.). — cf. Pez. Acetab.: Cd. Ic. III. t. 6. f. 95. (sec. Schnzl.).
—— byssiseda. — [S. 352.]
—— Cacaliae (Phialea). — Kl. 1528.
—— caesia P. — [S. 352.] — Kl. 529. — Fuck. s. 822.
—— calamaria. — Kl. 1926.
—— calyciformis. — [S. 348.]
—— calycina. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1917. 1. — Fuck. s. 837. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 61. — Kl 1021. a. — Kl. II. 422. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Brit. f. 261. — Lib. 124.
—— —— f. Abietis Fr. — Kl. 237.
—— —— v. flavo-coccinea A. S. — Kl. 1021. b.
—— Calycium. — [S. 356**.]
—— calycula Schum. = P. Calyculus v. Infund. Fl. dan.
—— calyculaeformis. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 2.
—— Calyculus Sow. —
—— —— v. Infundibulum Fr. — Fl. dan. XIII. 2275. 3.
—— Campanula. — [S. 353*.] — Loud. f. 16264. — Bisch. f. 3350. — Kl. II. 419.
—— Candolleana. — cf. Sclerotium Pustula.
—— cantharella. — [S. 349.] — Kl. 236.
—— capillaris. — [S. 351.]
—— capula Holmsk. — [S. 353*.] — Fl. dan. XI. 1970. 3.
—— carbonaria. — [S. 349.] — Kl. II. 622.
—— Carestiae. — Kl. II. 704.
—— caricicola. — Kl. 1531.
—— caricina. — Lib. 230.
—— Caricis. — Dsm. 455.
—— carnea Fr.? = subcarnea Fl. dan.
—— carneo-pallida. — Dsm. 1609.
—— carpinea P. — Dsm. 462. — Voges. 787.
—— —— fascic. = Dermatea carp. Fr. — Carol. V. 38. — Wstd. 1274. (fascic.).
—— Catinus Holmsk. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2081. 2. — Kl. 1720.
—— Caucus. — [S. 353.] — Fl. dan. XII. 2084. 2. — Fuck. s. 818. a. — Krbh. t. 5. f. 39.

Peziza caulicola. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1918. 3. — Fuck. s. 832. — Kl. 416. — Kl. II. 220.
—— Cenangium. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 1. f. 1. (Notar.). — Ital. 637.
—— ceracella. — [S. 353.]
—— Cerasi. — Voges. 494. — cf. Cenang. Cer. — Wstd. 494.
—— Cerastiorum. — Kl. 1420. — R. f. 421. — Wstd. 1081. — Dsm. 468. — Lib. 28.
—— cerea Sow. — [S. 349.] — Loud. f. 16216. — Vent. t. 12. f. 116. 117.
—— cerina P. — [S. 351.] — Kl. 525. — Fuck. s. 835. — Kl. II. 628. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Voges. 687.
—— cernua Schum. = capula Fl. dan.
—— cervina P. — Wstd. 1275.
—— Cesatii Mont. — Hedw. I. t. 11. f. IV. — Kl. II. 128. (Helotium).
—— Chailletii. — Lib. 269, a.: Phacid. Patella camp.
—— Chauvini P. — Wstd. 324.
—— Chavetiae. — Lib. 26.
—— chlora. — [S. 356**.] — Carol. V. 39.
—— chlorina P. = diversicolor v. viridis Fl. dan.
—— chlorinella. — Kl. 1812.
—— chlorotica. — [S. 352.]
—— chrysocoma. — [S. 359.] (Calloria). — Fl. dan. XII. 2033. 2. — Loud. f. 16270. — Dacrymyces chr. Tul.
—— chrysops. — [S. 351.]
—— chrysostigma. — Kl. 1526.
—— ciboria Vahl. —
—— —— v. major. — Kl. 1014.
—— ciborioides. — [S. 353.] — Hoffm. Ic. t. 16. f. 1.
—— Ciborium. — [S. 348. 353.] — Kl. 913.
—— ciliaris. — [S. 351.]. — Fl. dan. XII. 2032. 1. — Fuck. s. 840. — Kl. 1622. — Dsm. 456.
—— ciliata Hoffm. — Wstd. 141.
—— cinerea Batsch. — [S. 353.] — Loud. f. 16271. — Kl. 528; Cent. XV, Suppl.
—— cinnabarina Schum. = subhirsuta v., Fl. dan. [S. 365***.]
—— cinnamomea. — [S. 362.]
—— citrina Batsch. — Fl. dan. XI. 1971. 3. — Voges. 784. — Kl. 333. — Fuck. s. 796. — R. f. 29; 29. b.: Cent. III, Suppl. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 24. (Keimg. Hoffm.).
—— clandestina. — [S. 351.] — Dsm. 1037. — Kl. 1129. — Kl. II. 21. — Voges. 1475. — Norweg. 100.
—— —— v. patula A. S. — Kl. 728.
—— Clavariarum. — [S. 352*.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 4.
—— clavata. — [S. 353.] — Norweg. 188.
—— clavellata. — Dsm. 122.
—— Clavus A. S. — [S. 357. ombr.] — Bisch. f. 3367.
—— clypeata. — [S. 348**.]
—— coccinea. — [S. 350.] — Loud. f. 16228. — Fuck. s. 845. — Kl. 1020. — Huss. I. 44. — Wstd. 687. — Vent. mi. 82. f. 3.
—— coccinella (Orbil.). — [S. 357. 3.]
—— cochleata. — [S. 349.] — Loud. f. 16215. — Hrz. t. 72. A. — Fuck. s. 863. — Kl. 417. — Kl. II. 25. — Wstd. 687. — Ital. 234.
—— coelopus. — Chile n. 8. f. 4.
—— coerulescens Schum. = P. Schumacheri. v. coerulescens.
—— comitialis Batsch. — Wstd. 919.
—— compressa. — [S. 354.] — Kl. 530. (1417).

Kl. II. 509. — Fuck. s. 806. — Dsm. 714. — Voges. 586.
Peziza concinna. — Letell. 609.
—— confluens. — [S. 350.] — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 2. f. 1—14. (evol.).
—— conistea. — Alger. t. 28, 10.
—— connivens. — [S. 366.] — Wstd. 919.
—— convexula. — [S. 350.] — de Bary, Ascomyc. 1863. t. 2. f. 15—17.
—— convivalis Batsch. — Wstd. 482.
—— coracina. — Alger. t. 28, 4.
—— coriacea. — zu Sphaeria Poronia (Lév., Ann. sc. n. 1843. XIX. p. 220.). — [S. 366**.]
—— cornucopioides L. — Wstd. 192.
—— coronata. — [S. 353. 349, 23.] — Bisch. f. 3369. — Fuck. s. 815. — Dsm. 72. — Kl. 1128. — Kl. II. 219.
—— —— Jacq.: = repanda Fl. dan.
—— corrugata. — [S. 349, 13.]
—— corticalis P. — [S. 365.] — Kl. 332. — Kl. II. 625. — Fuck. s. 763. (Lachnella). — Dsm. 120. 657.
—— —— P. = granulaeformis Fl. dan.
—— corvina. — [S. 403 ?.]
—— Craterium. — [S. 364. Urnul.] — Carol. I. 39.
—— crenulata. — Bot. Zt. 1861. t. 10. f. 6. p. 250. (Fuck.).
—— crocina. — [S. 359*.]
—— cruciburiformis Schum. = P. Crucibulum Fl. dan.
—— —— Schaeff.: Wstd. 481.
—— Crucibulum. — [S. 353.] — Fl. dan. X. 1784. 1.
—— culmicola. — Dsm. 28.
—— cupressina. — [S. 351.] — R. f. 122. — Dsm. III. 19. — Fuck. s. 838. — Wstd. 689.
—— cupularis L. — [S. 349.] — Loud. f. 16221. — Fuck. s. 855. — Berk. Out. t. 1. f. 2. (Fruct.).
—— Curreyana. — huc Sclerotium roseum Mont.
—— cyanoderma de B. — R. f. 516.
—— cyathoidea. — [S. 353.] — Bisch. f. 3356. — Kl. 140. — R. f. 224. — Dsm. 461. — Brit. f. 158. — Wstd. 144. — Ital. 587.
—— —— f. Lychnidis. — Kl. 1616. (cf. 1617. b.).
—— —— ? v. platealis. — Kl. 1617. b.
—— —— f. Umbellatarum. — Kl. 1617. a. — Kl. II. 420.
—— cyathula. — [S. 351.]
—— Cyathus. — [S. 364. 5 ?.]
—— daedalea. — Carol. I. 37.
—— Dehnii Rbh. — Kl. 334. — Kl. II. 23.
—— dentata P. — [S. 354.] — Bisch. f. 3368.
—— Diadema Gmel. — Bisch. f. 3352.
—— Digitalis. — Voges. 585.
—— diluta. — [S. 349.]
—— dilutella. — [S. 354.] — Dsm. 1344. — Kl. 727.
—— diminuta Rob. — Dsm. 1038.
—— disciformis. — [S. 356.] — Hoffm. Ic. t. 16. f. 2.
—— diversicolor. — [S. 351.] — Carol. V. 37.
—— —— v. luteo-subferruginea. — Fl. dan. XII. 2082. 1. — Dsm. 1343.
—— —— v. viridis Fr. — Fl. dan. XI. 1918. 1.
—— Drummondii. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 2. f. 10. (Ascus).
—— dumorum. — Dsm. 1602.
—— Ebuli. — Kl. 1424.
—— eburnea. — Dsm. 1605; III. 656.
—— echinophila. — Kl. 1525.
—— effugiens. — Dsm. III. 16. (Phial.).
—— elatina A. S. — Bisch. f. 3358.
—— elongata Schum. — Fl. dan. XIII. 2275. 2.
Peziza epiblastematica (Orbilia) Wllr. — Kl. 1016. — [S. 357. 4.]
—— epiphylla P. — Fl. dan. XII. 2033. 1. — Fuck. s. 792. — Kl. 1920. — R. f. 220.
—— epithelephora. — Ital. 589.
—— equina Mill. — cf. stercorea P.
—— Equiseti Hoffm. — R. f. 123. — cf. P. Persoonii.
—— erecta Sow. — Loud. f. 16225.
—— eriobasis. — [S. 352.]
—— erioloma. — [S. 353.]
—— erratica. — [S. 352.]
—— erumpens. — [S. 359.] — Dsm. 1345. — Loud. f. 16273.
—— erythrostigma. — [S. 359*.]
—— eximia. — Alger. t. 28, 9.
—— expallens. — [S. 359.]
—— fallax. — Dsm. 920. — cf. albo-violascens u. velutina; Patellaria discolor R. f. 528.
—— fascicularis. — [S. 362.] — Bisch. f. 3363. Fuck. s. 774. (cf. Dermatea). — Kl. 248. — Dsm. 567. — Brit. f. 154. — Letell. 609. (populnea). — Norweg. 97.
—— fasciculata Fr. — cf. Dermatea carpin.
—— ferruginea Schum. — Fl. dan. XII. 2033. 3.
—— fibuliformis Fr. — Loud. f. 16277.
—— fimetaria Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1787. 1. — Fuck. s. 805.
—— —— Fr. = Helot. fimet. Fr. Su. (Fuck.).
—— fimiputris. — [S. 350.]
—— firma. — [S. 353.] — Loud. f. 16251. — Lib. 228.
—— fissa. — [S. 362.]
—— flammea A. S. — [S. 365.] — Bisch. f. 3347. — Kl. 1523. — Kl. II. 22.
—— flavo-fuliginea. — [S. 351.]
—— flexella. — [S. 372.] — Voges. 1094.
—— floccosa Lasch. — Kl. 1225.
—— Frangulae. — Voges. 887. — Wstd. 1276.
—— fructigena Bull. — Dsm. 460. — Loud. f. 16253. — Fuck. s. 799. a. — Bisch. 3338. — Kl. 828. — Kl. II. 510. — Wstd. 1080. — cf. Helotium virgult.
—— —— f. Carpini. — R. f. 121.
—— fulgens. — [S. 349.]
—— fuliginea Schum. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1854. 1.
—— fumosa. — [S. 353.]
—— furfuracea. — [S. 362.] — Pay. b. cr. p. 8. f. 24—26. (Ascobolus). — Ital. 443. (Dermatea).
—— fusarioides Berk. — Dsm. 463. — Kl. II. 20. — Voges. 1476. 396. (Trem. Urt.). — Brit. f. 67. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 4. p. 46. (Berk.). — Wstd. 688.
—— fusca. — [S. 352.] — Loud. f. 16250. — Kl. II. 306. — Fuck. s. 821.
—— —— Schum. = P. Schumacheri Fl. dan. — Brit. f. 286. (zu P. Rosae). — Letell. 615. 3.
—— fuscescens. — [S. 351.]
—— Galegae. — Kl. 1614.
—— gemmata Schum. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1853. 2. — Pay. b. cr. p. 7. f. 22.
—— Gentianae P. — R. f. 423. (cf. Excipula G.).
—— globosa. — [S. 348.]
—— globularis. — [S. 364.]
—— glumarum. — [S. 352.] — Dsm. 454.
—— Godroniana Mont. — Kl. II. 16. — (Lachnea) Voges. 1189.
—— Graminis. — Dsm. 466. — Kl. II. 228. — Wstd. 98.
—— granulaeformis Schum. — Fl. dan. XI. 1917. 3.
—— granulata Bull. — [S. 350.] — Loud. f. 16223.




Peziza granuliformis P. — Wstd. 690.
—— granulosa Schum. = repanda Fl. dan.
—— haemastigma Fr. — Bisch. f. 3372.
—— haematostigma Hedw. — Sturm h. 33—. t. 11. (Strauss).
—— Hederae. — Lib. 229. (Sphaeria Crat. DC.). — Wstd. 45.
—— helodina. — Alger. t. 28, 3.
—— helotioides Fr. — Fl. dan. XI. 1855. 3.
—— helvelloides. — [S. 348.] — Kl. 1010.
—— —— Fr.: Kl. II. 26.
—— Helvellula. — Alger. t. 27, 11.
—— helvola. — Jungh. pr. t. 5. f. 17.
—— hemisphaerica. — [S. 350.] — Dsm. 711. — Kl. 235. — Kl. II. 630: P. arenosa Fuck., Bot. Zt. 1861. p. 250. — Fuck. s. 814. a. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms).
—— herbarum. — Bisch. f. 3313. — Kl. 633. — Kl. II. 227. — Fuck. s. 791. — Dsm. 568. — Voges. 785. — Lib. 27.
—— herpotricha Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 2.
—— heteromera. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 6. (Mont.).
—— Hindsii. — Hook. J. 1842. I. t. 15. (Berk.).
—— hirneolus. — [S. 349.] — Borcz. fg. ingr. t. 3. f. 2.
—— hirsuta Schff. — Wstd. 121.
—— hirta Schum. — [S. 351.] — Loud. f. 16232. — Fl. dan. XI. 1970. 2. — R. f. 27.
—— hirtella P. = subhirsuta Fl. dan.
—— hispida Schff. — Wstd. 991.
—— hispidula. — [S. 367 ***. 1.]
—— horridula. — Dsm. 1340. — Voges. 1471.
—— humilis. — Dsm. 1346.
—— humosa. — [S. 350.] — Loud. f. 16226. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 69. (Asc.).
—— Humuli. — Kl. 630. — Kl. II. 221. — Fuck. s. 817. — Ital. 870.
—— hyalina. — [S. 352.]
—— Hypnorum. — [S. 354.]
—— hysteriiformis. — [S. 367. 3.]
—— janthina Fr. — Bisch. f. 3353.
—— ilicincola B. B. (Dasyscyph.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 17. p. 450.
—— imberbis. —
—— —— v. cinerea. — Kl. 1524.
—— inaequilatera Schum. = Cyphella muscicola v., Fl. dan.
—— inclusa. — [S. 373.]
—— infarciens Ces. — R. f. 515. — Ital. 871.
—— inflexa Bolt. — Loud. f. 16255. (über 16259.)
—— Infula Rebt. — Wstd. 177.
—— infundibuliformis Hoffm. — Wstd. 191.
—— ingrica. — [S. 350.]
—— inquinans P. — Wstd. 191.
—— insidiosa. — Dsm. 29. — Wstd. 45.
—— integra Schum. = abietina Fl. dan.
—— jucundissima. — Dsm. 1040.
—— juncicola. — [S. 351.]
—— juncina. — [S. 356: Dub.]
—— Jungermanniae Ns. — [S. 353: 157. 359*.] — Kl. 917.
—— Kerguelensis. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 164. 3.
—— Kneifii. — Kl. 1924.
—— Körberii. — Lotos (Prag) 1858. t. 1. f. 20. (Peyl.).
—— labiata Rob. — Dsm. 1035.
—— lacera. — [S. 362 ***.]
—— lachnobrachya. — Dsm. II. 1603.
—— laciniata. — [S. 365.]

Peziza lacustris. — [S. 359.] — Dsm. 464. — Kl. 1623. — Kl. II. 231. — Voges. 1093. — Wstd. 44.
—— laetissima Ces. — Kl. 1024; 1527. — cf. P. Persoonii.
—— laevigata. — [S. 365.]
—— laevis Huds. — Wstd. 481.
—— lancicula Rebt. — Kl. 1228.
—— laricina. — Act. Turin. 1803. XII. t. 11. (Balbis.).
—— Lecideola Fr. = Patellaria Lec. Fr. Su. — [S. 366.]
—— Ledi. — [S. 361.]
—— lenticularis Bull. — Fl. dan. XI. 1855. 2. — Fuck. s. 795.
—— lentifera L. — Wstd. 121.
—— —— Huds.: Wstd. 282.
—— lepidota. — [S. 349.]
—— leporina Batsch. — [S. 349.] — Kl. 143. — Kl. II. 24. — Fuck. s. 865. — R. f. 512.
—— leucoloma. — [S. 350.] — Bisch. f. 3345. — Fuck. s. 850. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 18—19. — Sturm h. 31—. t. 17. (Szl.). — Kl. 1315. — R. f. 513. — Krypt. Bad. 154.
—— leucomela P. — ? Wstd. 1279.
—— leucorrhodina Mont. — Sagra, Cuba t. 13. f. 4.
—— leucostigma. — [S. 357. 1.]
—— leucotricha. — [S. 351.]
—— lignyota. — ? Kützing, Phil. Bot. 1852. t. 20. f. 2. — [S. 366.]
—— Ligustici. — Phacid. Patella camp. — Wstd. 324.
—— lilacina. — [S. 358*.]
—— Linariae Rbh. — Kl. 724 (a Pez. herb. vix diversa).
—— litorea. — [S. 353.] — Kl. 1125; 1619. — Wstd. 142.
—— livida. — [S. 351.] — Fl. dan. XI. 1915. 3. Fuck. s. 841.
—— livido-fusca. — [S. 353.]
—— Lonicerae. — [S. 353.]
—— lutea Schum. — Fl. dan. XIII. 2271. 2.
—— luteola. — [S. 352.]
—— luteo-virens. — Dsm. 1041. — Kl. 1815.
—— lutescens. — Kl. 1813.
—— Lychnidis. — Kl. 1616.
—— macrocalyx. — Fres. t. 9. f. 7—11.
—— macropus. — [S. 348.] — Loud. f. 16219. — Fuck. s. 866. — Berk. In. I. p. 36. f. 13. c. — Kl. 144. — Kl. II. 217. — Wstd. 991.
—— maculincola. — [S. 365 ***.]
—— malatephra. — cf. melat.
—— Marchantiae. — [S. 354.]
—— marchica. — [S. 362 ***.]
—— marginata Holmsk. = cerinea Fl. dan.
—— maritima. — [S. 349.] — Dsm. 918.
—— Marsupium P. — Kl. 1013.
—— Martii. — Sturm h. 33—. t. 10. (Strauss).
—— melaena. — [S. 319.]
—— melaleuca. — [S. 366.]
—— melaloma. — Kl. 1423; — it. Cent. XVII. Fuck. s. 852.
—— melanoloma. — [S. 350.]
—— melastoma. — [S. 350.]
—— —— Sow. — Loud. f. 16229.
—— —— v. rhizopus Fr. — Bisch. f. 3346.
—— melatephra Lasch. — Kl. 825. — Dsm. 1608. — Wstd. 994.
—— melaxantha. — [S. 352. 366.] — Ital. 774. — Patellaria mel.

Peziza membranacea Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1784. 2.
—— —— bovina P. = P. vaccina Fl. dan.
—— Messerschmidii. — [S. 351*.]
—— micropus P. — [S. 349.] — Bisch. f. 3344. — Berk. Out. t. 22. f. 5.
—— miliaris. — Kl. 1621.
—— millepunctata. — Lib. 128.
—— minima. — [S. 354.]
—— mirabilis. — Borcz. fg. ingr. t. 4. 5.
—— misella Rob. — Dsm. 1039.
—— mollissima. — Kl. II. 708.
—— mortuaria Ces. (Tapezia). — Kl. II. 18.
—— Mougeotii P. — Biatora campestris Fr. (ex Nyland.).
—— mundula. — Kl. 1530.
—— mussiva. — [S. 350.]
—— mycophila. — [S. 353.]
—— Neesii. — Kl. 1419.
—— neglecta. — Lib. 29. — Wstd. 688.
—— nervicola. — Dsm. 467.
—— nervisequa P. — Dsm. 1612. — Voges. 786.
—— Nidulus S. K. — [S. 352.] — Kl. 412; it. Cent. XVI. — Kl. II. 19. — Fuck. s. 828. — Dsm. 71. — Voges. 588. — Lib. 25. — Wstd. 691.
—— nigra Sow. — cf. Pez. Clavariarum.
—— —— Schum. = nigrella Fl. dan. — Voges. 197. (Bulgar. inq.). — Wstd. 191.
—— nigrella. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1788. 2. — Krbh. t. 16. f. 17. a. — Dsm. 70. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Kl. 1314; 1921. — Kl. II. 309. — R. f. 219. — ?Schnzl. t. 16. f. 1—3.
—— nigripes P. — Kl. 827.
—— nigro-caesia Schum. = albo-violascens v., Fl. dan.
—— nivea. — [S. 351.] — Kl. 1023. — Kl. II. 705. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms).
—— —— Schum. = albo-violascens Fl. dan. — Wstd. 397.
—— obvelata Lacr. — R. f. 422.
—— occulta. — Kl. 1922.
—— ochracea. — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino).
—— —— Schum. = P. Tuba Fl. dan.
—— Oedema (Phialea). — Dsm. 1607.
—— olivacea. — [S. 353.]
—— Olla Batsch. — Wstd. 282.
—— ollaris. — [S. 350.] — Kl. 337. — Kl. II. 423.
—— omphalodes. — [S. 350.] — Kl. 1015.
—— —— Bull.: Fuck. s. 847.
—— onotica P. — [S. 349.] — Fl. dan. XI. 1970. 1. — Fuck. s. 864. — Loud. f. 16212. — Bisch. f. 3355. — R. f. 215.
—— Oxyacanthae P. — Wstd. 189.
—— palearum. — Voges. 1473. — Wstd. 190. — (Lachnea) R. f. 519. — Dsm. 917.
—— pallescens P. — Kl. 526. — Kl. II. 226.
—— —— Fr. = P. elongata Fl. dan.
—— palustris Rob. — Dsm. 1043.
—— papillaris. — [S. 352.]
—— papillata Schum. = diversicolor v., Fl. dan. — P. [S. 351.]
—— parvula. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 2. (Notar.).
—— patula. — [S. 351.] — Dsm. 1034. — Fl. dan. XI. 1854. 3. — R. f. 425. — Lib. 225. — Wstd. 143.
—— paulula. — Dsm. 1610.
—— pedunculata Schum. = repanda Fl. dan. — [S. 349.]


Peziza pellucens. — Kl. 1620.
—— —— Schum. = Bulgaria pel., Fl. dan.
—— perlata. — [S. 348.]
—— Persoonii Moug. — [S. 353.] — Kl. 725. — Kl. II. 229. — Dsm. 73. — Fuck. s. 816. — cf. Pez. Equiseti et P. laetissima. — Lib. 329.
—— petiolorum. — [S. 353.] — Kl. II. 223. — Dsm. 658.
—— phacidioides Fr. — Kl. 1226. — Kl. II. 305.
—— phaeoloma Lév. — Démid. Russ. t. 4. f. 7.
—— phaeotricha. — Alger. t. 28, 5.
—— phellophila. — Alger. t. 28, 6.
—— Phragmitidis. — [S. 355. 18.]
—— phyllophila. — Dsm. 659.
—— pilosa (Schum.) Fr. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2032. 3.
—— Pinastri. — Voges. 587.
—— Pineti Batsch. — [S. 352.] — Kl. 631.
—— —— v. Abietis. — R. f. 31.
—— pinicola. — [S. 365.] — Kl. II. 508. — R. f. 124.
—— pithya P. — Bisch. f. 3340. — Bail S. t. 20. — Voges. 298.
—— placentaeformis. — Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. t. 8. f. 3. (Niessl).
—— Platani. — [?S. 367. 5.]
—— platealis. — Kl. 1617. b.
—— plumbea. — [S. 349.]
—— pocula. — [S. 349.]
—— Polygoni Lasch. — Kl. 1127. — Dsm. III. 266.
—— polymorpha Fl. dan. — Wstd. 191.
—— Polytrichi Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 1. — Kl. 1316. — Kl. II. 310. — Ann. Mg. n. h. 1851. XIII. t. 16. f. 14. p. 464. (Fructif. B. B.).
—— polytrichina P. = rutilans Fl. dan.
—— populnea. — cf. P. fascicularis.
—— porioides A. S. — [S. 352.] — Bisch. f. 3479.
—— protracta Fr. — Nov. Act. 1852. XXIII. II. t. 61. (Microst. hy.).
—— pruinata. — Carol. I. 38.
—— Prunastri. — Letell. 613. 1.
—— —— β A. S. — cf. Dermatea Prun. Fr. — [S. 362. 7.]
—— Pruni Avium. — [S. 352***.]
—— Prunorum. — [S. 352.]
—— Pteridis. — [S. 354.] — Kl. 1615. — R. f. 424. — Dsm. 919.
—— puberula. — Kl. 1529.
—— pulchella. — Lib. 327. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 15. — Wstd. 189.
—— pulverulenta. — Lib. 125. — R. f. 514.
—— punctata Grev. — Loud. f. 16267.
—— punctiformis. — [S. 352.] — Kl. 826. — Fuck. s. 824.
—— punicea. — Purton. I. t. 25.
—— pura. — [S. 357.]
—— purpurea. — [S. 362.] — Fl. dan. XIII. 2274. 1. — Bisch. f. 3339.
—— pusilla. — [S. 353.]
—— pustulata. — [S. 349.]
—— pygmaea. — [S. 351.]
—— Pyri P. — cf. Tympanis conspersa.
—— pyriformis. — [S. 353.] — Act. Turin. 1805. XIV. t. 3. (Cumino). — Bisch. f. 3362.
—— Pyxis Batsch. — Wstd. 481.
—— quercina P. — Wstd. 189.
—— Rabenhorstii Awd. — Kl. 920. — Kl. II. 222.
—— radiata. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 16.
—— radiculata Sow. — [S. 341*.] — Loud. f. 16230.



Peziza Radula. — [S. 349.]
—— Rapulum Bull. — [S. 348.] — Bisch. f. 3342.
—— Ravenelii. — Carol. II. 46.
—— relicina. — [S. 352.] — R. f. 216. — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms).
—— repanda. — [S. 349.] — Fl. dan. XII. 2031. 1. u. 2081. 1. — Fuck. s. 859. — Grev. t. 59.
—— —— v. Fr. = P. alutacea, Fl. dan.
—— Resinae. — [S. 354.] — Kl. II. 706. — Lecidea, Biatorella M. Fr.
—— reticulata. — [S. 349.] — Berk. Out. t. 22. f. 6. — cf. venosa, p. 362. — Grev. t. 156! — Huss. II. 7.
—— retincola. — R. f. 225.
—— rhabarbarina B. (Lachnella). — [S. 365.] — R. f. 223. — cf. ardenn. a Rosae Wstd. — Pez. u. Patell. Rubi Lib.? — Brit. f. 271. — Wstd. 1281.
—— rhizopus. — [S. 350.] — Fuck. s. 846. = Sphaeria monocarpa Fl. dan.
—— Rhododendri. — Kl. 1814.
—— —— Ces.: R. f. 428. — Ital. 586.
—— rhodoleuca Fr. — Kl. 1221.
—— Ribesia P. — cf. Cenang. Ribis Fr.
—— Robergei. — Dsm. 916.
——, rorida W. — Fuck. s. 831.
—— Rosae P. — [S. 352.] — Kl. 527. — cf. Tympanis obtexta v. pezizaeform. W. — Brit. f. 157; 286. (cf. fusca). — Letell. 615, 2.
—— rosea Schum. = onotica Fl. dan. — (Niptera) Chile n. 10. f. 7.
—— roseola. — [S. 352.]
—— rubella. — [S. 353.] — Wstd. 495. = vinosa (Dsm.).
—— Rubi Lasch. — Kl. 635. — Kl. II. 421. — R. f. 518.
—— Rubi Lasch. v. herbicola. — R. f. 218.
—— rubicunda Saut. — Kl. 1618! P. Urticae Awd.).
—— rubiginosa. — [S. 362.]
—— rubricosa. — [S. 350.]
—— rudis. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 6. f. 13. p. 183. (B. B.).
—— rufo-nigra Saut. — Kl. 914.
—— rufo-olivacea. — [S. 351.] — Kl. II. 629.
—— rugosa Sow. = anomala Fl. dan.
—— rutilans. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 2. — Fuck. s. 853. — Kl. 1418.
—— salicaria P. — Dsm. 921.
—— salicella. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 3. (Notar.). — R. f. 520.
—— salicina P. — Kl. 919.
—— sanguinea. — [S. 352.] — Kl. II. 624. — R. f. 226.
—— sanguinolenta. — Bisch. f. 3348.
—— saniosa. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 2. (Berk.).
—— sarcoides. — cf. Bulgaria sarc.
—— Sceptrum B. — Bisch. f. 3354.
—— Schumacheri. — [S. 352.] — Fl. dan. X. 1785. 1.
—— —— v. coerulescens Fr. — Fl. dan. X. 1786. 1.
—— Scirpi Rbh. — Kl. 730.
—— sclerotiacea. — Kl. 1532. — Ital. 339.
—— Sclerotii Fuck.: Bot. Zt. 1861. t. X. f. 1. p. 249. (dazu Sclerot. compact. DC.).
—— Sclerotiorum. — Lib. 326. — ic.: Coemans, in Bull. ac. belg. 1860. IX. p. 79; dazu Sclerot. varium (Münt. in lit.); it. aus Scler. compactum DC., tectum Fr., bullat. DC., sphaeriaeforme Lib., varium P. (Coems.).

Peziza Sclerotium P. — Wstd. 690.
—— Scrophulariae. — Kl. 1816.
—— scutellata. — [S. 351.] — Schnzl. t. 16. f. 4. 5. — Kl. 1621? — Bot. Zt. 1862. t. 11. (F. z. Solms). — Wstd. 141. — Ital. 585 (macrochaeta). — Krypt. Bad. 54.
—— scutula. — [S. 353.] — Letell. 615, 4.
—— scybalorum Schum. = Myrothec. sc., Fl. dan.
—— semipurpurea Horn. = P. purpurea Fl. dan.
—— sepium (Phialea). — Dsm. 1606.
—— sepulta. — [S. 564.]
—— sericea. — [S. 353.] — Wstd. 282.
—— serotina. — Fuck. s. 800.
—— sessilis Sow. — Wstd. 690.
—— setosa. — Cd. Anl. t. G. f. 64: 17. — Bisch. f. 3373. — Kl. 634.
—— smaragdina. — Voges. 1345.
—— Solani P. — Fuck. s. 814.
—— Solenia DC. — Voges. 96. (Solenia cand.).
—— spadicea. — [S. 365.]
—— sphacelata Schum. = P. Catinus Fl. dan.
—— sphaerioides P. — Dsm. 124.
—— sphaerocephala. — Kl. 1421. — Kl. II. 230.
—— Spiraeae. — Dsm. III. 453.
—— spumosa. — [S. 351.]
—— squamosa Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1915. 1.
—— stercoraria Bull. = Ascobol. furf. Fl. dan.
—— stercorea P. — [S. 351.] — Kl. 731. — Crypt. Bot. antarct. voy. Erebus. 1854. t. 163, 4. — Norweg. 98.
—— stipata. — [S. 352.]
—— stipitata Huds. — Wstd. 991.
—— Stitzenbergeri R. — R. f. 427. (cf. P. umbon. v. epiph.). — Krypt. Bad. 558.
—— striata Ns. — R. f. 221. — Fuck. s. 813.
—— strigosa. — [S. 367.] — v. hysteriiformis. [S. 367. 3.] — cf. Vermicularia str. u. Graminum Lib. — Wstd. 184.
—— strobilina. — [S. 353.] — Kl. 1925. — R. f. 222. — Fuck. s. 819.
—— subcarnea Schum. — Fl. dan XII. 2081. 1.
—— subhirsuta. — [S. 350.] — Fl. dan. X. 1788. 1. — Fuck. s. 851.
—— —— v. rubro-cinnabarina Fr. — Fl. dan X. 1787. 2.
—— sublicia Holmsk. — Wstd. 991.
—— subplana Schum. = chrysocoma Fl. dan.
—— subtilis Fr. — Fuck. s. 803. (Helotium).
—— subtorta. — [S. 356**.]
—— succosa. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 10. (Berk.).
—— sulcata P. — [S. 348.] — Kl. 1721. — Kl. II. 627. = Acetabulum.
—— sulphurata. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1915. 2.
—— sulphurea P. — [S. 352.] — Fl. dan. XI. 1918. 2. — Kl. 726; Cent. XV, Suppl. — Kl. II. 707. (cf. 708.).
—— —— v. leucophaea. — Dsm. 121. — Brit. f. 156.
—— sulphureo-caesia Schum. = sulphurea Fl. dan.
—— sylvatica. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 12. (R. Ludwig).
—— syringea. — Kl. 1422. — R. f. 32.
—— Tami Ly. — Dsm. 27.
—— tegularis. — [S. 362†.]
—— testacea. — [S. 359. 366**.]
—— theleboloides. — [S. 351.] — Bisch. f. 3364. — ? Kl. II. 704.

Peziza tomentosa Schum. — [S. 350.] — Fl. dan. XI. 1916. 3.
—— trechispora B. B. — R. f. 26.
—— triblidioides Rbh. (Lachnella). — Kl. 1130.
—— tricholoma. — Ann. sc. n. 1831. II. t. 4.
—— Trifoliorum. — Lib. 321. (Ascobol.). — — Wstd. 399.
—— triformis. — [S. 352.]
—— Tuba Bolt. — Fl. dan. XI. 1971. 2. — Bisch. f. 3360. — cum Sclerotio: Ann. sc. n. 1813. XX. t. 7. f. 6. (Lév. ex Micheli).
—— tubaeformis. — [S. 353.]
—— tuberosa. — [S. 348.] — Bisch. f. 3361. — Fuck. s. 867. — Dsm. 1339. — Loud. f. 16220? (16225). — Kl. 1522. — Kl. II. 308. — Voges. 397. — Brit. f. 153. — Huss. II. 10. — Wstd. 990.
—— tumida. — [S. 362†.]
—— tumidula. — Dsm. 1611.
—— uda. — [S. 359.]
—— Ulmariae. — Kl. 1723.
—— umbilicata. — Voges. 788. (Hymenula umb.).
—— umbonata. — [S. 354.]
—— —— v. epiphylla A. S. — R. f. 427.
—— umbrata. — [S. 351.]
—— umbrinella. — Dsm. 922.
—— umbrorum Fr. S. (Ind.). — [S. 351. 71.]
—— umbrosa Fr. — [S. 351. 71.] — Kl. 1011. — Kl. II. 626. — R. f. 217.
—— —— Schrad. [?S. 349. 39.]
—— —— v. pubescens. — Kl. 1012.
—— undella. — [S. 350.]
—— urceolus. — [S. 362.]
—— urnula. — [S. 353.]
—— Urticae P. — R. f. 221. (non Kl. 1618. cf. Hedw. 1853. n. 4.).
—— uveata Schum. — [S. 353.] — Fl. dan. XII. 2034. 1.
—— vaccinea Schum. — Fl. dan. XI. 1971. 1.
—— varia. — [S. 349.]
—— varians Saut. — Kl. 916.
—— variecolor. — [S. 352.]
—— velutina. — Wstd. 397. — P. albo-violascens v. alba Fr., fallax P.
—— venosa. — cf. reticulata Berk. Out. [S. 349.]
—— venustula. — Dsm. 458.
—— vernalis Schum. — [S. 351.] — Fl. dan. XII. 2034. 2.
—— Veronicae Lasch. — Kl. 632.
—— versatilis. — [S. 353*.]
—— versicolor (Phial.). — Dsm. III. 15.
—— versiformis. — [S. 359. 366**.] — Brit. f. 274. — Wstd. 297.
—— vesiculosa Bull. — [S. 359.] — Loud. f. 16217. — Cd. Ic. V. t. 9. f. 65. (Asc.). — Kl. 829. — Sturm h. 31—. t. 19. (Szl.). — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 18. (Asc. Hoffm.). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 25. (Keimg. Hoffm.). — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 35. (Hoffm.). — Vent. mi. 76. f. 7. 8; 97. f. 10. — Ital. 773.
—— villosa P. — [S. 352.] — Kl. 331. — Kl. II. 225. — Wstd. 690. — Fuck. s. 826. — Dsm. 1311.
—— Vincae. — Lib. 325.
—— vinosa. — [S. 359.] — Dsm. III. 18. — Carol. IV. 19. — cf. rubella Wstd.
—— violacea. — [S. 349.]
—— virescens Schum. — [S. 352.] — Fl. dan. X. 1785. 2.
—— virginea Batsch. — [S. 351.] — Fl. dan. XIII. 2274. 3. — Fuck. s. 839. — Kl. 1722. — R. f. 517.
—— viridi-atra. — [S. 353.]
Peziza viridi-brunnea (Humaria). — Kl. 1919.
—— viridis Bolt. — Wstd. 919.
—— vogesiaca. — Voges. 584.
—— Volutella Fr. — Bisch. f. 3366.
—— vulgaris Fr. — [S. 354.] — Dsm. 465. — Loud. f. 16272. — Kl. 1017. — Carol. IV. 18.
—— Weinmanni. — [S. 351.]
—— xantholoma. — Kl. II. 218; cf. xanthomela.
—— xanthomela P. — R. f. 315. — Kl. II. 218. (xantholoma Rbh. Handb.).
—— xanthostigma. — [S. 357. 2.]
Phacellium inhonestum Bon. — R. f. 288.
Phacidium. — [S. 369.] — cf. Triblidium, Trochila.
—— abietinum. — [S. 370.]
—— acerinum. — [S. 370.]
—— alneum. — [S. 369.]
—— Andromedae. — [S. 369.]
—— Aquifolii. — Voges. 562. — Wstd. 32.
—— Arctii. — Lib. 369.
—— Ari (in Aro pertenue): Palaeont. VIII. t. 63. f. 7. (R. Ludwig).
—— arundinaceum Ces. — Hedw. I. t. 14. f. C. p. 102.
—— Astrantiae. — Kl. II. 258.
—— Buxi — ?Kl. 1154. — Kl. II. 717. — Wstd. 119. — Septoria phacidioides Dsm.
—— calyciiforme Rebt. — Kl. 980. — R. f. 231.
—— carbonaceum. — [S. 369.] — Kl. 1346.
—— —— Fr. = Discella carb. B. B. — Brit. f. 44. — Lib. 160.
—— commodum Rob. — Dsm. 1242.
—— compactum. — [S. 369.]
—— congener. — Kl. 1727. — Kl. II. 163.
—— coronatum. — [S. 370.] — Dsm. 416. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 15. f. 5. a. b. p. 513. (Fruct., Berk.). — Fl. dan. XIII. 2340. 1. — Fuck. s. 731. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 25—29. — Bisch. f. 3578. — Loud. f. 16474. — Fres. t. 8. f. 22. 23. — Kl. II. 716. — Kl. 770. (non 376. cf. Dothid. betul.). — Voges. 559. — Brit. f. 195. — Lib. 175. (Xyloma pezizoides P.). — Wstd. 919. — Ital. 236. — Sturm h. 4. t. 63.
—— craterium Mt. — cf. Sphaeria crat. — Voges. 986.
—— —— Fr.: Wstd. 45.
—— Delta. — Berk. In. p. 284. f. 66. b.
—— dentatum. — [S. 370.] — Fres. t. 8. f. 12—16. — Fuck. s. 724. — Bail S. t. 18. — Kl. 558; — it. Cent. XV. — Dsm. 417. — Voges. 561. — Brit. f. 93. — Carol. III. 44. — Lib. 368. — Wstd. 177. — Ital. 345.
—— divergens Rob. — Dsm. 1241.
—— elegans. — Carol. V. 47.
—— Friesii. — Kl. 1538. — Dsm. 1243.
—— geographicum. — Dsm. III. 699.
—— Ilicis. — Fres. t. 8. f. 17—21. — Lib. 367. — Wstd. 32.
—— Juglandis. — Palaeont. VIII. t. 63. f. 5. (R. Ludwig).
—— lacerum. — [S. 370.] — R. f. 464. — Lib. 70.
—— laciniatum Fr. — Bisch. f. 3577.
—— laevigatum. — [S. 369.]
—— Laurocerasi. — Kl. 1465. — Fuck. s. 757. (Trochila). — R. f. 156. — Dsm. 292 (Eustegia). Voges. 985. — Brit. f. 45. — Wstd. 75. — Ital. 490.
—— —— f. Hederae (Trochila). — Fuck. s. 757. b.
—— Ledi. — [S. 369.] — Bisch. f. 3579. — Kl. II. 520.
—— leptideum. — [S. 370.] — Bisch. f. 3580. — Voges. 984. — P. quadr. Schm.
—— litigiosum Rob. — Dsm. 1239.





Phlyctum. Vagab. Desm. 14e not. p. 16. —


Pho. Concentricum Desm. = Popularia Exsic. No 1085.

— Equiseti Léveil. Champ. Mus. pag. 282. —

— Pinastri Léveil. Champ. Museum pag. 282 No 408.

Ph. Strobiligena Desm. 17e Not. p. 8. No 11.

Phyl. hederacola Dur. et Mont. Fl. Alg. p. 611. –
Syllog. II. n. 1025. –



Piptostomum Leveil. Champ. Exot. p. 65. N° 316.

Pleococcum Roberg. Montg. 6a Cent. N° 44.
Syllog. pag. 250. —

Pleospora herbarum Rbh. — Tul. Select.
Fung. Carp. ii. pag. 261. Tab. 32 et 33. f. 10.
et Pl. Sarcinula, P. alternaria, Epicoccum
Phoma (Gibelli et Griffini. Sul Polimorfismo
della Pleosp. herb. — 1873)

Picoa. — [S. 438.]
—— Juniperi Vitt. — Vitt. t. 2, 8. — Cd. Ic. VI. t. 10. f. 98. — Bail S. t. 13. f. 1. — Alger. t. 24. f. 12—21.
Picrostoma. — cf. Sphaeria.
Piggotia. — cf. Dothidea, Asteroma.
—— astroidea. — Asteroma Ulmi Grev. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 95. t. 5. f. 1. a—c. (B. B.). — Dsm. III. 84.
Pilacre. — [S. 361.]
—— faginea. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 5. p. 365. (B. B.).
—— Petersii B. C. — R. f. 268. — Carol. III. 39.
Pileolaria. — [S. 514.]
—— brevipes. — Carol. III. 91.
—— Terebinthi. — [S. 514.] — Dsm. 1085. — Cd. Ic. VI. f. 3. — Bon. t. 3. f. 76. — Kl. 1067. 1996. — Kl. II. 84; 199. — cf. Uredo Decaisneana. — Castagne, Marseille t. 3.
Pilidium. — [S. 370. Phacid.
—— acerinum. — Dsm. III. 85.
—— carbonaceum. — cf. Phacidium c.
—— disseminatum. — Lib. 359.
—— dryophyllum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 11—13.
—— hemisphaericum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 11—16.
—— myrtinum. — Alger. t. 26. 8.
Piligena. — cf. Onygena.
—— lycoperdoides Schum. — Fl. dan. X. 1740. 2. — Onygena piligena Fr.
Pilobolus. — [S. 487.] — Proceed. Linn. Soc. 1857. I. c. ic. (Currey). — Bot. Zt. 1862, p. 178.
—— anomalus. — Kl. 1512. — Ascophora Cesatii Coems.
—— crystallinus. — [S. 487.] — Cd. Ic. VI. f. 32. — Cd. Anl. t. C. f. 25: 1. 2. — Bisch. f. 3724. — R. f. 270. — Bull. ac. belg. 1859. VIII. p. 770. (216?). f. 1—16. (Coems.). — Loud. f. 16349. — Nov. Act. XXIII. I. t. 51. 52. — Cohn = P. Oedipus R. f. 382, Coems. — Bon. t. 10. f. 203; Oedipus, Coems. — Kl. 1630. — Kl. II. 78.
—— —— Lév. (sub P. rorid.): Mém. Soc. Linn. Par. IV. t. 20. (ex Coems.).
—— —— Coemans Monogr. Pilob. 1861. t. 2. f. 1—20. (Ac. roy. Belg., mém. cour. XXX.). — Fuck. rh. 49.
—— lentigerus Cd. R. — cf. P. Oedipus M.
—— Oedipus Mont. — ? R. f. 270. — R. f. 382. (Mucor obliquus Scop., Pycnopod. lentig. Cd., Pilobol. lentig. R., Pil. crystallin. Cohn.) — Mém. Soc. Linn. de Lyon. 1828. p. 1—7. c. ic.
—— —— Coemans Mon. Philob. 1861. t. 1. f. 1—20.
—— roridus. — [S. 487.] — Coemans Mon. Pilob. 1861. t. 2. f. B. (nach Bolton). — Linn. Journ. 1856. I. t. 2. (Currey) = crystallinus (Coems.).
—— —— Lév.: crystall. (Coems.). — Bisch. f. 3725: crystall. (Coems.). — R. f. 270.
—— urceolatus Purt. = crystall. (fide Berk.). — Purton. I. t. 31.
Pilopeza. — [S. 356.]
Pilophora. — [S. 488.]
—— rorida Wllr. — cf. Ascophora Mucedo.
Pionnotes. — [S. 480 ***. 481.]
Piptostroma. — [S. 409.]
Pirostoma. — [S. 395.]
Pisomyxa. — [S. 406: Bry.]
—— racodioides. — Cd. Anl. t. F. f. 53: 11—13. — Lindl. v. K. p. 43. f. 27. — Pay. b. cr. p. 55. f. 240. — p. 98. f. 456.
Pistillaria. — [S. 340.] cf. Scleromitra. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.).
Pistillaria aciculata. — Alger. t. 32, 4.
—— Acrospermum. — Bail S. t. 27.
—— coccinea. — Kl. 1625.
—— culmigena. — [S. 340.] — Dsm. 453. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12. — Kl. 1520. — Wstd. 1082.
—— —— Fr. = Typhula, Bail S. p. 19. — Brit. f. 152.
—— diaphana. — [S. 340.] — Fl. dan. X. 1783. 1.
—— inaequalis. — Kl. 1930.
—— incarnata. — Dsm. 710.
—— micans. — [S. 340.] — Bisch. f. 3438. — Kl. 342. — Kl. II. 126. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 14. (Fructif. Lév.). — cum Sclerotio: Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 3. (Lév.). — Dsm. 1815.
—— muscicola. — Kl. 1626.
—— ovata P. — [S. 340.] — Kl. 643. — Kl. II. 236.
—— —— Fr. = Typhula, Bail S. p. 19.
—— puberula. — [S. 340.]
—— pusilla. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 1—3. — Cd. Ic. II. f. 123!
—— quisquiliaris Fr. — [S. 340.] — Loud. f. 16196. — Kl. 1312. — Kl. II. 127. — Typhula Todei Fr. (Tul.). — Brit. f. 25.
—— rosella. — [S. 340.]
—— sclerotioides. — Dsm. 1814.
—— Syringae. — Fuck. Nass. f. 24. — Fuck. s. 891.
Pittocarpium. — [S. 521.]
Placentaria depressa. — Kl. 1446.
Plecostoma. — [S. 441.] cf. Geaster.
—— fornicatum. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 43. — Cd. Anl. t. D. f. 43: 12—15. — Pay. b. cr. p. 63. f. 280.
Plecotrichum. — [S. 495 ***.]
—— fuscum. — Sturm h. 13. t. 44.
—— Lauri. — Kl. 1484.
Plegmatium. — [S. 523.]
Pleuodomus Rabenhorstii Pr. — Kl. 1282. — Sturm h. 36. t. 12.
—— sclerotioides Pr. — Kl. 1281.
Pleococcum Robergei. — Dsm. 1338.
Pleosphaeria scirpicola. — Kl. II. 256.
Pleospora. — cf. Sphaeria.
—— Asparagi. — Kl. II. 750.
—— Dianthi R. — R. f. 451.
—— herbarum Rbh. — Ital. 496.
—— —— v. Allii. (Sphaeria herbarum Autt.) — Kl. II. 517. a. — Fuck. s. 517.
—— —— f. Salicorniae. — R. f. 145.
—— Leguminum Rbh. — Kl. II. 518.
—— pellita. — Kl. II. 749.
Pleurage. — [S. 418 **.]
Pleurobotrya indica. — Berk. In. p. 314. f. 71. b.
Pleuroceras ciliatum. — Hdw. I. t. 4. f. 5. — Kl. 1822. — Kl. II. 746.
Pleurocystis adscendens. — Bon. t. 9. f. 182.
—— Fresenii Bon. — cf. Mucor racemos.
Pleuropyxis. — [S. 407.]
—— microsperma. — Cd. Anl. t. F. f. 53: 8—10. — Pay. b. cr. p. 98. f. 455.
Podaxis. — [S. 440.]
Podaxon. — [S. 440.]
—— carcinomale. — Berk. In. p. 8. f. 5. c. (fila).
—— pistillare. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 10.
Podisoma. — [S. 474.] — Flora. 1842. II. t. 3. (C. Müller).
—— foliicolum. — Fuck. rh. 414.
—— fuscum. — Cd. Anl. t. G. f. 69: 17—22. — Berk. In. p. 10. f. 6. a. — Kl. 75. — Kl. II. 678. — Voges. 1347. — Wstd. 339.


Podisoma Juniperi Lk. — Wstd. 339.
—— —— communis. — [S. 474.] — Dsm. 1016. — Bisch. f. 3880. — Pay. b. cr. p. 76. f. 351. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 10. f. 1—12. (Tul.). — Brit. f. 106. — Ital. 657. — Fuck. rh. 415.
—— —— Sabinae Lk. — [S. 474.] — Bisch. f. 3882. 3883. — Berk. Out. t. 2. f. 4. — Brit. f. 107. — Fuck. rh. 416.
—— macropus. — Hook. Lond. J. 1845. IV. p. 315. t. 12. f. 6. — Carol. I. 85.
Podocystis. — [S. 512.] cf. Uredo.
—— aecidioides. — [S. 512.] — Kl. II. 392.
—— angulosa. — Bon. Con. t. 1. f. 11.
—— Capraearum. — [S. 512.]
—— Lini. — [S. 512.] — Kl. II. 391.
—— pustulata. — Fuck. s 85.
—— —— v. Ptellariae. — Kl. II. 689.
—— Ranunculacearum:
—— —— f. Anemones. — Kl. II. 690.
Podosphaera. — cf. Erysiphe.
—— clandestina. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 5. (Lév. ; Erys. Oxyacanthae Tul.
—— Kunzei. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 6. (Lév.).
—— —— v. B. = Erys. tridactyla Tul.
—— —— v. myrtillina. — R. f. 566.
—— —— f. Pruni. — Fuck. s. 489. a. b. — R. f. 565. bis.
—— myrtillina. — [S. 106.]
—— Schlechtendalii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 6. f. 7. (Lév.).
Podospora fimicola Ces. — Hedw. I. t. 14. f. A. — Kl. II. (257). 259.
Podosporium. — [S. 166. 512.]
—— Lini Lév. — Wstd. 1179.
—— rigidum. — Berk. In. p. 314. f. 71. a.
—— Vaccinii. — [S. 466.]
Podostrombium. — [S. 484. 518.]
Polistophthora Antillarum. — Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. t. 17. f. 18. ff. (Lebert).
Polyactis. — [S. 490.] — cf. Botrytis.
—— cana. — Bon. t. 7. f. 156.
—— coerulescens. — Fres. t. 8. f. 51—53.
—— divaricata. — Sturm h. 35. t. 6.
—— epigaea. — Bon. t. 7. f. 161.
—— fulva. — Bon. t. 5. f. 128; t. 7. f. 159.
—— geophila. — Bon. t. 7. f. 163.
—— Mucedo. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 6. f. 17; — p. 104. f. 472.
—— nigra. — Bon. t. 7. f. 162.
—— repens. — Bon. t. 8. f. 173.
—— sclerotiophila. — Kl. 1668. = Bot. cinerea (Ces.; cf. Tul. Scl. I. 228.). — Kl. II. 167.
—— simplex. — Sturm h. 25—. t. 24. (Preuss.).
—— vulgaris. — Letell. 668. 1. — Wstd. 196.
Polyangium. — [S. 439.]
—— umbrinum Fr. — Fl. dan. XI. 1980. 1.
—— vitellinum. — [S. 439.] — Cd. Anl. t. C. f. 40: 1—3. — Loud. f. 16346. — Bisch. f. 3628.
Polycystis. — [S. 515.] — cf. Caeoma, Urocystis, Uredo, Ustilago, Sporisorium. (P. est Algarum genus: Rbh.).
—— Anemones. — [S. 516.]
—— Colchici S—l. — [S. 516.] — Sturm h. 34. t. 11. (Strauss). — Fuck. s. 113. — Wstd. 1181.
—— Ficariae. — [S. 516.]
—— Holci. — Bull. ac. belg. 2. Sér. XI. p. 660. f. 1. (Wstd.).
—— Lolii. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI. 2. p. 246. f. 1.
—— occulta. — Dsm. III. 653.
Polycystis opaca. — Sturm h. 34. t. 12. (Strauss).
—— parallela. — [S. 516.]
—— pompholygodes Lév. — ? Wstd. 678. 1181.
—— Ranunculacearum. — [S. 516.] — Wstd. 678. 1182.
Polydesmus. — [S. 491. 505*.] — cf. Sporidesmium.
—— elegans. — Alger. t. 20. 5.
—— exitiosus. — Kühn. Krkh. t. 6. — Fuck. rh. 79.
Polygaster. — [S. 443.]
Polymorphus fagin. querc. Chev. — Wstd. 924.
Polymyces phosphorus Batt. — Agaric. olearius.
Polynema. — [S. 367.] — cf. Conoplea, Excipula.
—— Betulae. — Fuck. rh. 205.
—— hispidulum. — Fuck. rh. 206.
—— strigosum. — [S. 367. 475*.] — Fuck. rh. 204.
Polyplocium. — [S. 439.]
—— inquinans. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 6. 7. — Lindl. v. K. p. 42. f. 26. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 1—9.
Polyporus. — cf. Boletus, Trametes, Poria. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8—11. (Fructif. Lév.). — cf. Icones Rostkovianas apud Sturm h. 5. 10. 16. 17. t. 1—64; h. 27. 28. t. 1—24. et Fries Summa p. 318—324.
—— abietinus. — [S. 321.] — Fl. dan. XII. 2079. 2. — Fuck. s. 975. — Dsm. II. 662. — Carol. I. 12.
—— acanthoides. — Sturm h. 27—. t. 19. (Rostk.).
—— adustus. — [S. 320.] — Dsm. 159. — Fl. dan. XI. 1850. 1. — Fuck. s. 996. — Kl. 620. — Kl. II. 412. — R. f. 212. — Sturm h. 16. t. 38. et h. 17. t. 57. (murin.).
—— affinis. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 4. (Blum. et Ns.).
—— Afzelii (Suberosi). — Afzel. t. 2. f. 5.
—— agilis. — Viv. 37. 38: v. rubesc.
—— albidus Trog. — Fuck. s. 987.
—— alligatus. — [S. 319.]
—— alutaceus. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 27. (destructor).
—— —— Rostk. — [S. 320. 42.]
—— alveolaris Bosc. — Sturm h. 27 —. t. 15. (Rostk.).
—— amboinensis Fr. (Pleuropus). — Rumph. Hb. amboin. XI. t. 57. f. 1. — Bisch. f. 3312. — Kl. Cent. IX. Append.
—— amorphus. — [S. 320.] — Dsm. III. 189.
—— ancirinus. — [S. 322.]
—— annosus Fr. — R. f. 405.
—— annulatus. — Jungh. pr. t. 12. f. 28.
—— apiarius Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
—— apophysatus. — Sturm h. 27—. t. 4. (Rostk.).
—— applanatus. — [S. 321.]
—— arcularius Fr. — Bisch. f. 3320.
—— argenteus. — [S. 320.]
—— armeniacus. — [S. 322*.]
—— asper. — Jungh. pr. t. 14. f. 31.
—— Auberianus Mont. — Sagra, Cuba. t. 16. f. 1. = Bolet. microporus Swartz.
—— aurantiacus. — [S. 320. 45.] — Kl. 1714. — Sturm h. 17. t. 58. (nidulans).
—— Auriscalpium. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1.
—— australis (Apus) Fr. — Ann. Mg. n. h. 1839. III. t. 8. (Berk.). — Kl. Cent. XII. Append.
—— barbulatus. — Carol. II. 19.
—— bathyporus. — [S. 321. 82?] — Sturm h. 17. t. 59. (?subspadic.).



Polyporus betulinus. — [S. 321.] — Bisch. f. 3296. — Kl. 32. — Fuck. s. 992. — Ital. 229. Sturm h. 10. t. 22.
—— bibulus. — Letell. 690. 1. — Wstd. 1287. — P. = medulla panis Fr.
—— biformis. — Carol. II. 18. (carolinensis B. C.).
—— Boltoni. — Sturm h. 27 —. t. 24. (Rostk.).
—— bombycinus. — [S. 321.]
—— borealis. — [S. 320.] — Kl. 716. — Fuck. s. 993; Theleph. mollissima.? — Sturm h. 16. t. 40.
—— Boucheanus. — [S. 319.]
—— brumalis. — [S. 319.] — Loud. f. 16071. — Kl. 204. — Sturm h. 5. t. 5. (ciliat.).
—— —— Rostk. — [S. 319. 8.] — Carol. I. 9.
—— brunneus. — [S. 322. 89.]
—— byrsinus Mont. — Sagra, Cuba. t. 15. f. 3.
—— byssogenus. — Jungh. pr. t. 8. f. 23.
—— caesarius. — [S. 319.]
—— caesius. — [S. 320.] — Fl. dan. XI. 1963. 2. (sup.).
—— callosus. — [S. 322.]
—— carneus. — Carol. V. 11. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 3. (Blum. et Ns.).
—— carolinensis B. C. — cf. biformis Fr.
—— castaneus. — [S. 321. 76.] — Sturm h. 16. t. 47. (zonat.).
—— cellaris. — Lib. 223.
—— Cerasi Fr. — Bisch. f. 3292. — Sturm h. 17. t. 61.
—— cervino-gilvus. — Jungh. pr. t. 9. f. 21.
—— cervino-plumbeus. — Jungh. pr. t. 15. f. 32.
—— chioneus. — [S. 320.]
—— ciliatus. — [S. 319.] — Bisch. f. 3314.
—— cinctus Berk. — [S. 322.] — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 2. f. 3. p. 44. (Berk.).
—— cinnabarinus Jcq. (Trametes). — Kl. 224. — Carol. II. 17. — Vent. mi. 61. f. 3—5. — Ital. 770.
—— cinnamomeus. — [S. 321.]
—— cochlear. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 6. (Blum. et Ns.).
—— conchifer. — Carol. V. 15.
—— confluens. — [S. 319.] — Sturm h. 16. t. 34. (resinos.).
—— —— Rost. — [S. 321. 59.] — Staude t. 3. f. 1.
—— conglobatus B. — cf. graveolens.
—— contiguus. — [S. 321.] — Sturm h. 27 —. t. 8. (Rostk.). — Kl. 1007. — Carol. I. 16.
—— coronatus. — Sturm h. 27 —. t. 17. (Rostk.).
—— corruscans. — [S. 320.]
—— corylinus. — Viv. 1.
—— crispus. — [S. 320.] — Sturm h. 16. t. 37. (adust.).
—— —— Rostk. — [S. 320. 48.]
—— cristatus. — [S. 319.] — Bisch. f. 3297. — Fuck. s. 1002. — Vent. mi. 12. f. 1; 100. f. 1. 2. — Sturm h. 5. t. 16.
—— croceus. — [S. 320.] — Sturm h. 27 —. 1. (Rostk.).
—— cryptarum Fr. — Fl. dan. XI. 1963. 1. — Bisch. f. 3289.
—— cubensis Mont. — Sagra, Cuba t. 16. f. 3.
—— cupulaeformis. B. C. — Carol. I. 10. (Cyphella pendula Fr., Sphaeria Pocula Schw.).
—— cuticularis. — [S. 320.] — Kl. 33. — Sturm h. 10. t. 32. (rubiginos. Rbh., ?applan. Fr.).
—— —— Rost.: [?S. 321. 66.]
—— cyliscus. — Chile n. 7. f. 7.
—— cytisinus. — [S. 322*.]
—— dealbatus. — Carol. III. 10.

Polyporus Demidoffii Lév. — Démid. Russ. t. 3.
—— dermatodes Lév. — Bonite t. 138. f. 2.
—— dermoporus Gaud. = Favolus brasiliensis Fr.
—— destructor. — [S. 320.] — Bisch. f. 3422. — Kl. 225.
—— dichrous. — [S. 320.] — Sturm h. 16. t. 39.
—— dryadeus. — [S. 322*.] — Sturm h. 27—. t. 9. (Rostk.). — Huss. I. 21.
—— echinatus. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 8; t. 11.
—— elegans. — [S. 319.]
—— epileucus. — [S. 320.]
—— epixanthus. — [S. 320. 33. alut.] — Sturm h. 10. t. 30.
—— expansus (Stuposi). — Afzel. t. 5. f. 12.
—— farinellus. — [S. 322.]
—— fatiscens. — Carol. II. 21.
—— ferruginosus. — [S. 321.] — Fuck. s. 973. Sturm h. 27—. t. 6. (Rostk.).
—— Flabellum Mont. — Sagra, Cuba t. 15. f. 2.
—— flavescens. — Sturm h. 27—. t. 23. (Rostk.).
—— flavus (Resupinatus) Jungh. — Jungh. t. 10. f. 25. 26. (c. var. orbiculari).
—— floccopus. — Sturm h. 27—. t. 13. (Rostk.). — Fuck. s. 1013.
—— floccosus. — Jungh. pr. t. 11. f. 27.
—— floridanus. — Carol. I. 11.
—— fomentarius. — [S. 321.] — Loud. f. 16093. — Schnzl. t. 16. f. 28. — Kl. 222. — Sturm h. 17. t. 52.
—— fragilis. — [S. 320.]
—— fraxineus. — [S. 322*.]
—— Friesii Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 11. — Bisch. f. 3127.
—— frondosus. — [S. 319.] — Kl. 512. — Badham t. 15, 3. — Viv. 36. — Vent. mi. 82. f. 4. — Ital. 43. — Fries Sv. t. 41. — Sturm h. 10. t. 18.
—— fuligineus. — [S. 319.]
—— fumosus. — [S. 320.] — Fl. dan. XI. 1963. 2. (inf.). — Bail S. t. 31. — Fuck. s. 997. — Kl. 320. 621. — Wstd. 997. — Sturm h. 16. t. 42.
—— funalis (Funales). — Afzel. t. 1. f. 3.
—— fuscidulus. — [S. 319.]
—— fusco-carneus. — Carol. I. 18.
—— Gaudichaudii Lév. (Apus). — Bonite t. 140. f. 2.
—— gibbosus. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 5. (Blum. et Ns.). — Bisch. f. 3260.
—— —— P.: Wstd. 997.
—— giganteus. — [S. 319.] — Huss. I, 82.
—— —— Fl. dan. X. 1793 = P. intybaceus Fr. Ep. — Fuck. s. 1001. — Bisch. f. 3321. — Hrz. t. 32 = P. squamosus. — Loud. f. 16079. — Sturm h. 10. t. 19.
—— graveolens. — Carol. III. 8. (conglob. B.).
—— haematodus. — [S. 322. 89.] — Sturm h. 17. t. 62. (violaceus).
—— helveolus. — Sturm h. 16. t. 36.
—— helvolus (Stuposi). — [S. 320.] — Afzel. t. 6.
—— Herbergii. — Sturm h. 27—. t. 18. (Rostk.).
—— heteroclitus. — [S. 322*.] — Loud. f. 16069.
—— hirsutus. — [S. 321.] — Kl. 810. — Fuck. s. 985. — Sturm h. 16. t. 44. (zonat.).
—— —— Rost. — [S. 321. 76.] — R. f. 510. — Schweiz. 23. — Ital. 230.
—— hispidus. — [S. 320.] — Kl. 1913. — Fuck. s. 995. — R. f. 406. — Sturm h. 10. t. 31.
—— —— Rost. [S. 323**.] — Huss. I. 29. 31. — Ital. 42.
—— hydnoides Fr. — cf. Boletus hydnaticus.
—— igniarius. — [S. 321.] — Kops Fl. bat. X.

744. — Fuck. s. 991. — Loud. f. 16091. — Kl. 36. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 2. f. 13. — Dsm. 1806. 1807. — Sturm h. 17. t. 54.
Polyporus igniarius v. Caryae. — Carol. IV. 5.
—— ilicincola. — Carol. V. 17.
—— imbricatus. — [S. 319.] — Sturm h. 10. t. 21.
—— impuber. — [S. 323**.]
—— incanus Lév. (Trametes). — Bonite t 137. f. 2.
—— incarnatus. — [S. 322.]
—— incomtus (Hornotini). — Afzel. t. 5. f. 11.
—— infundibulif. — Sturm h. 10. t. 17.
—— intermedius. — [S. 319. 7.] — Sturm h. 16. t. 33. (brumal.).
—— intybaceus. — [S. 319.] — Huss. I. 6.
—— Inzengae. — Ital. 636.
—— kymatodes. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 21.
—— laceratus Berk. — cf. pergamenus Fr.
—— lacteus. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t 23.
—— lanatus (Coriacei). — Afzel. t. 7. f. 15.
—— lentus. — [S. 322*.] — Berk. t. 16. f. 1.
—— lepideus. — [S. 319.]
—— Leprieurii. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 6. (Mont.).
—— leprodes. — [S. 561.] — Sturm h. 5. t. 15.
—— leptocephalus. — [S. 319.]
—— leptopus. — Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
—— licnoides Mont. — Sagra, Cuba t. 16. f. 2.
—— Lingua. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 3. (Blum. Ns.).
—— lobatus. — [S. 320.]
—— Lonicerae. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 12. (Mont.).
—— lucidus. — [S. 319.] — Roq. t. 2. f. 1. — Berk. Out. t. 16. f. 2. — Loud. f. 16076. — cf. Bolet. dimidiat. Thb. — Vent. mi. 17. f. 2. 3; t. 21. — Ital. 769. (estipitatus). — Sturm h. 5. t. 13.
—— —— monstrum. — Borcz. fg. ingr. 1857. t. 7. 8.
—— lutescens P. — Fuck. s. 986.
—— luteus. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 1. (Blum. Ns.).
—— macraulos. — Sturm h. 17. t. 55.
—— marginatus. — [S. 321.] — Sturm h. 16. t. 43.
—— mastoporus (Pleuropus) Lév. — Bonite t. 137. f. 1.
—— medulla panis. — [S. 322.] — Kl. II. 5. — Carol. III. 12. — Wstd. 1287. — Fl. dan. XII. 2028. 1. — Kl. 814. — Fuck. s. 970. — Letell. 628. — cf. bibulus.
—— melaleucus. — [S. 319.]
—— melanopus. — [S. 319.] — Sturm h. 5. t. 4.
—— membranaceus. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 7. p. 378. (Berk.).
—— merismoides. — Sturm h. 17. t. 63.
—— micans. — [S. 322.] — Bisch. f. 3288. — Fuck. s. 971. — Kl. 322. — Sturm h. 17. t. 63. (nitid.).
—— —— Rost. — [S. 321. 86.]
—— Michelii. — Sturm h. 5. t. 1.
—— micromegas Mont. — Sagra, Cuba t. 17. f. 5.
—— microporus. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 6. p. 376. (Berk.).
—— mollis. — [S. 320; cf. 336: Hyp. m.] — Sturm h. 10. t. 25.
—— molluscus. — [S. 322.] — Loud. f. 16099. — Fuck. s. 967. — Sturm h. 17. t. 64.
—— mons Veneris. — Jungh. pr. t. 15. f. 33.
—— Montagnei. — Alger. t. 33, 2.
—— Mori. — Viv. 58.
—— mucidus. — [S. 322.] — Carol. I. 17.
Polyporus murinus. — [S. 323. 11.? — 320. 48. b.] — Sturm h. 17. t. 57. (adust., argent.).
—— myrrhinus Kickx. — Bull. ac. belg. 1838. V. p. 370. t. 15.
—— nidulans. — [S. 320.] — Kl. 809; 1914.
—— niger. — Carol. I. 20.
—— nigricans. — [S. 321.] — Bisch. f. 3426. — R. f. 15. — Sturm h. 17. t. 51.
—— nitidus. — [S. 321.] — Sturm h. 17. t. 63. (mic.).
—— Nordmanni Lév. — Démid. Russ. t. 1. f. 1.
—— nubilus (Laevigati). — Afzel. t. 1. f. a.
—— nummularius. — [S. 319.] — Sturm h. 5. t. 12.
—— obducens P. — [S. 322.] — Bisch. f. 3291.
—— obliquus. — [S. 321.] — Sturm h. 27—. t. 7. (Rostk.).
—— occidentalis. — Carol. V. 18.
—— occultus Lasch. — Kl. II. 617.
—— ocellatus (Pleuropus). — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 3.
—— officinalis. — R. f. 211. — Ital. 291.
—— ovinus. — [S. 319.] — Cd. Anl. t. H. f. 75: 13—15. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 87. (Fructif.). — Hrz. t. 57. — Fries Sv. t. 8. — Kl. 116. — Fuck. s. 1009. — Staude t. 4. f. 1.
—— pachyus. — Sturm h. 27—. t. 5. (Rostk.).
—— pallescens. — [S. 321.]
—— partitus (Mesopus). — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 1.
—— parvulus Kl. — Carol. I. 8.
—— passerinus (Pleuropus). — Hook. J. 1856. VIII. t. 10. f. 2.
—— pediformis (Fomentarii). — Afzel. t. 1. f. 2.
—— perennis Fr. — Loud. f. 16072? — Kl. II. 117. — Bisch. f. 3257. — Fuck. s. 1008. — (Trametes) Kl. 31. — Dsm. 253. — Voges. 295. Huss. I. 51. — Wstd. 429. — Sturm h. 5. t. 6.
—— —— v. fimbriatus. — Dsm. 160.
—— pergamenus. — Carol. I. 13. (lacerat. Bk.).
—— pes Caprae P. — Vent. t. 10. f. 95. 96. — Bisch. f. 3262. — Sturm h. 5. t. 14.
—— —— Fr. Ep. — cf. scrobinaceus. — Vent. mi. t. 23; 34. f. 3. 4.
—— petalodes. — [S. 319.]
—— picipes. — [S. 319.] — Sturm h. 27—. t. 20. (Rostk.).
—— Pini. — [S. 323. 8.] — Sturm h. 17. t. 50.
—— pinicola. — [S. 321.] — Kl. 324.
—— Pisachapani. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 1. (Ns.).
—— politus. — [S. 319.]
—— polyc. — [S. 319. 19.]
—— polygrammus Mont. (Favolus). = Hexagonia p. M.
—— polymorphus Fr. — Kl. 115. — Sturm h. 17. t. 56.
—— populinus Fr. — Fl. dan. X. 1791.
—— poripes. — Carol. IV. 4.
—— pterygodes (Discipedes). — Afzel. t. 3. f. 7.
—— pubescens. — [S. 321.] — Fl. dan. X. 1790. 1. — Sturm h. 27—. t. 21. (Rostk.).
—— pulcher (Hornotini). — Afzel. t. 8. f. 19.
—— purpureus. — [S. 322.] — Sturm h. 27—. t. 3. (Rostk.).
—— quercinus. — [S. 320.] — Huss. I. 52.
—— radians. — Dsm. III. 800.
—— radiatus Scop. — [S. 321. 77.] — Kl. 622. (an hirsutus?). — R. f. 509. — Sturm h. 16. t. 48. (versicolor).
—— Radula. — [S. 322.] — Kl. 718. — Kl. II. 414. — Dsm. III. 799.





Polyporus ramosus. — Letell. 626.
—— resinosus. — [S. 321; cf. n. 60.] — Sturm h. 10. t. 29. (rubiginos.); — Sturm h. 16. t. 31. (confl.).
—— reticulatus. — [S. 322.] — Bisch. f. 3421. — Loud. f. 16101.
—— Rhipidium. — Carol. III. 9.
—— rhodellus. — [S. 322.]
—— Ribis Fr. — Fl. dan. X. 1790. 2. — Fuck. s. 989. — Dsm. 566. — Kops Fl. bat. X. 745. (Trametes) Kl. 118. — Sturm h. 14. t. 62. u. h. 17. t. 53.
—— rigidus. — Carol. I. 15.
—— roseo-poris. — Sturm h. 27—. t. 12. (Rostk.). — Fuck. s. 978.
—— roseus. — [S. 321.] — Kl. 717.
—— Rostkovii. — [S. 319.] — Bisch. f. 3305.
—— rubiginosus. — [S. 321. 561.] — Sturm h. 10. t. 32. (cut.); t. 29. (res.).
—— rubripes. — Sturm h. 27—. t. 16. (Rostk.).
—— rufescens. — [S. 323. f.] — Letell. 618. (Sistotr. r. P.). — Sturm h. 5. t. 7.
—— rufus Schrad. — Kl. 323. — Kl. II. 413.
—— —— Fr.: Fuck. s. 972.
—— —— f. lilacina. — R. f. 308.
—— rugosus. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 7. (Blum. Ns.).
—— rugulosus Lasch. — R. f. 16.
—— rutilans. — [S. 320. 31. Rostk.; — 320.] — Sturm h. 16. t. 36. (testac.).
—— rutrosus. — Sturm h. 27—. t. 22. (Rostk.).
—— saccatus. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1.
—— sacer (Hornotini). — Afzel. t. 9.
—— Sagraeanus Mont. — Sagra, Cuba t. 16. f. 4.
—— salebrosus. — Kl. 1606.
—— salicinus. — [S. 323**.] — Fuck. s. 988.
—— salignus. — [S. 320.] — Sturm h. 27—. t. 2. (Rostk.). — Fuck. s. 980.
—— sanguineus Fr. (Pleuropus). — Swartz, Obs. bot. t. 11. f. 4. — (Discipedes): Afzel. t. 2. f. 4. — Krbh. t. 5. f. 6. 7. — Carol. II. 16.
—— sanguinolentus. — [S. 322.] — Kl. 1213.
—— scaber. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 9. f. 4. (Berk.).
—— Schweinitzii Fr. (Trametes). — Kl. 513; Cent. IX, Suppl. p. pte. — Cd. Ic. V. t. 10. f. 88. (Fructif.).
—— scrobinaceus P. — R. f. 407. (P. pes Caprae Fr. Ep.).
—— sector. — Ehrenb. hor. phys. berol. t. 18. f. 6.
—— serialis. — [S. 321. 76.] — Sturm h. 17. t. 49. (zonat.).
—— serpens. — Gaudich. Voy. 1826. t. 2.
—— setiporus. — Hook. Lond. J. 1847. VI. t. 20. f. 2. p. 505.
—— sinuosus. — [S. 322.] — Kl. II. 303.
—— spadiceus. — Jungh. pr. t. 13. f. 30.
—— spongiosus Fr. — Kl. 808.
—— spumeus. — [S. 320.] — Berk. Out. t. 16. f. 1.
—— squamaeformis. — Hook. J. VI. t. 7. f. 2.
—— squamosus. — [S. 319.] — Kops Fl. bat. X. 730. — Fuck. s. 1007. — Loud. f. 16068. — Hrz. t. 32! — Kl. 30. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 40. (Hoffm.). — Huss. I. 33. — Vent. mi. 27. f. 4—6; t. 28. — Ital. (38.) 88. — Sturm h. 5. t. 2.
—— Stephensii (Resupinatus) B. B. — R. f. 117. — Carol. IV. 7.
—— stereoides. — [S. 321.] — Fuck. s. 976. — Sturm h. 16. t. 46. (versicol.).
—— —— Rostk. — [S. 321. 77.]

Polyporus Steveni Lév. — Démid. Russ. t. 2.
—— strobiliformis Dicks. — Loud. f. 16073.
—— stypticus. — [S. 320.]
—— suaveolens Fr. — Fl. dan. XI. 1849. — Hrz. t. 49. — (Trametes) Kl. 31. — Huss. I. 43. (Daedal.). — Vent. mi. 58. f. 5. 6. — Sturm h. 16. t. 41.
—— subfuscus-flavidus. — Sturm h. 27—. t. 11. (Rostk.).
—— subpileatus Weinm. — Kl. 117.
—— subspadiceus. — [S. 321.]
—— subsquamosus Fr. — [S. 318.] — Kl. 119. — Sturm h. 5. t. 3.
—— substriatus. — Sturm h. 5. t. 9.
—— sulphureus. — [S. 319.] — Bisch. f. 3287. — Berk. Out. t. 16. f. 3. — Kl. 1005. — Huss. I. 46. — Vent. mi. 41. f. 1. 2; 59. f. 4. 5. — Ital. 143. — Sturm h. 10. t. 20.
—— tabacinus. — Chile n. 7. f. 6.
—— tenerrimus. — Carol. III. 13.
—— tephroleucus. — [S. 320.] — Sturm h. 10. t. 26.
—— testaceus. — [S. 320.]
—— tomentosus Fr. — Bisch. f. 3258. — Sturm h. 5. t. 8. (brumalis).
—— tornatus Gaud. = australis Fr. (Gaud.).
—— torridus (Coriacei). — Afzel. t. 7. f. 17.
—— trabeus Rost. — Fuck. s. 998. — Sturm h. 10. t. 28.
—— trachypus. — Sturm h. 27—. t. 14. (Rostk.).
—— Tricholoma Mont. — Sagra, Cuba t. 17. f. 1.
—— tropicus Jungh.? = lucidus Fr.
—— Tuberaster Fr. — Bisch. f. 3178. — Badham t. 11, 3. — Viv. 55. — Vent. mi. 36. f. 3. 4.
—— udus. — Tijdschr. v. nat. Geschied. 1840. VII. t. 8. f. 5. u. 6. p. 289. (Jungh.).
—— ulmarius. — [S. 322*.] — Kl. II. 616. — Berk. Out. t. 16. f. 5. — Huss. I. 64. — Ital. 11.
—— umbellatus. — [S. 319.] — Cd. Anl. t. II. f. 75: 16—18. — Viv. 28. — Bisch. f. 3273.
—— undulatus. — Brit. f. 294.
—— ungulatus Fr. — Vent. mi. 19. f. 3. 4.
—— unitus. — [S. 321.]
—— Vaillantii. — [S. 322.] — Lib. 321.
—— valenzuelianus Mont. — Sagra, Cuba t. 15. f. 4. = Bolet. resupinatus Swartz.
—— vaporarius. — [S. 322.] — Carol. I. 19.
—— variabilis (Pleuropus). — Hook. J. VIII. t. 9. f. 1.
—— varius. — [S. 319.] — Kops Fl. bat. X. 755. — Kl. 223. — Sturm h. 5. t. 11. (elegans).
—— vegetus. — [S. 321. 322*.]
—— velutinus. — [S. 321.] — Kl. II. 701. — Fuck. s. 984. — Carol. IV. 6.
—— —— v. Fr. — R. f. 15. u. 16.
—— versatilis (Trametes) Berk. — Bonite t. 138. f. 1.
—— versicolor. — [S. 321.] — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 8. f. 11; t. 11. f. 28. (Fructif. Lév.). — Cd. Anl. t. II. f. 75: 19—22. — Loud. f. 16089. — Fuck. s. 982. — Kl. 120; Cent. IV, Suppl. — Kl. II. 209. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 39. (Keimg. Hoffm.). — Carol. I. 14. — Huss. I. 24. — Wstd. 156. — Krypt. Bad. 59. — Sturm h. 16. t. 45.
—— violaceus. — [S. 322.] — Kl. 715. — Kl. II. 502.
—— virgineus. — Carol. III. 11.
—— vitreus. — [S. 322.]
—— vulgaris. — [S. 322.] — Kl. 619. — Berk. Out. t. 16. f. 6. — Fuck. s. 968. — Carol. V. 16. — Letell. 690. 2. — Sturm h. 17. t. 60.

Polyporus Weinmanni. — [S. 320.]
—— Wightii Kl. — Linn. 1832. VII. t. 10. (Scenidium Kl.) = Hexagonia Wightii Fr.
—— xanthopus (Hornotinus). — Afzel. t. 3. f. 6.
—— xanthus. — [S. 321.] — Carol. II. 20.
—— xoilopus Rst. — Bisch. f. 3269. — Sturm h. 5. t. 10.
—— zonalis. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 10. f. 5. p. 375. (Berk.).
—— zonarius. — Vent. mi. 90. f. 5.
—— zonatus. — [S. 321.] — Fl. dan. XII. 2028. 2. — ? Fr.: Sturm h. 27—. t. 10. (Rostk.).
—— —— Ns.: Kl. 321?
—— —— var. Fr. — Fl. dan. XII. 2079. 1.
Polysaccum. — [S. 444.] — Ann. sc. n. 1842. XVIII. t. 5. 6. (Fructif. Tul.).
—— arenarium. — Dsm. 1223.
—— australe. — Ann. sc. n. 1848. IX. t. 9. f. 4. (Lév.).
—— crassipes. — Dsm. 1627. — Cd. Ic. V. t. 4. f. 41. — Cd. Anl. t. D. f. 41: 7—14. — Bisch. f. 3608. — Pay. b. cr. p. 8. f. 32. (p. 9. f. 39.); p. 110. f. 503. — Sturm h. 34. t. 5. 6. (Strauss). Vent. mi 8. f. 1.
—— —— v. clavatum. — Kl. 644.
—— degenerans. — [S. 444***.]
—— pisocarpium. — [S. 444.] — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 13. (Vittad.). — Bisch. f. 3606. 3607.
—— tinctorium. — Canar. t. 5. f. 1.
Polyschismium Trevelyani. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 23—26. (Diderma).
Polyscytalum. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 14. 15. (Riess.).
—— fecundissimum. — Fresen. t. 12. f. 1—4. p. 95. (Fusispor. gris. Kl.).
—— —— v. macrosporum. — Kl. 1873.
Polystigma. — [S. 387*.] v. Dothidea, Sphaeria.
—— aurantiacum. — Bon. t. 3. f. 63; Aecidiol. exanth. Ung. (Tul. Sel. I. 221.). — Wstd. 825.
—— fulvum. — Cd. Anl. t. F. f. 51: 14—16. — Kl. II. 69. — Voges. 271. — Norweg. 90. — cf. Dothidea.
—— —— f. ascigera. — Kl. II. 579.
—— —— ascus. — Nov. Act. 1861. XXVIII. t. 1. f. 9. (Bail).
—— —— v. maculare. — cf. Dothidea fulva.
—— pertusarioides. — Dsm. III. 72. — Wstd. 642. (Septoria Calystegiae).
—— rubrum DC. — Kl. II. 580. — Voges. 270. — Letell. 656. 4. (Dothidea). — Purton. I. t. 33. — cf. Ascochyta rubr., Lib. — Ital. 240.
—— typhinum DC. — (Dothidea typh. Fr.) Kl. II. 578. — Fuck. s. 703. (Cordyceps!). — Wstd. 522.
—— Ulmi. — Fuck. s. 667.
Polythecium. — cf. Micropora.
Polythrincium. — [S. 504.]
—— polysporum. — [S. 504.]
—— Trifolii. — [S. 504.] — Dsm. 560. — Bisch. f. 3721. — Fuck. s. 150. — Loud. f. 16607. — Krypt. Bad. 326. — Cd. Anl. t. B. f. 10: 6. — Kl. 70. — Cephalothecium Tr. Bon. — Voges. 688. — Brit. f. 97. — Carol. V. 93. — Wstd. 1295. — Fuck. rh. 58. — Sturm h. 11. t. 9.
Pompholyx. — [S. 460.]
—— sapidum. — Cd. Anl. t. C. f. 38: 1—5. — Sturm h. 19—. t. 15. (Corda).
Poria. — cf. Polyporus.
—— cerea. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 11. f. 3.
—— Encephalum. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 12. f. 1.
Poria faveginea. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 12. f. 3.
—— scutata. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 9. 10.
—— Spuma. — Hoffm. v. hercyn. subt. t. 13. f. 2
Poronia. — [S. 382.] — Bail S. t. 17. (cf. Sphaeria Poronia).
—— macropoda.
—— —— v. cladonioides. — Kl. 1916.
—— Oedipus.
—— —— v. cladonioides. — Comm. soc. crit. it. 1861. 2. t. 4. f. 4. (Ces.).
—— pezizoides. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 1—4.
—— pilulifera. — [S. 382***.]
—— punctata. — [S. 382.] — Kops Fl. bat. XI. 815. 3. — Bail S. t. 17. — Kl. 255. — Kl. II. 15. — Nov. Act. 1861. XXIX. t. 2. f. 11. 12. (Evolut. Bail). — Müller, Pflanzenstaat 270. (Copie). — Dsm. III. 375.
—— scutellata. — [S. 382.]
Porothelium. — [S. 325.]
—— fimbriatum. — [S. 325.]
—— lacerum. — [S. 325.] — Carol. V. 19.
—— rugosum (Pleuropus). — Hook. J. VIII. t. 9. f. 2.
—— subtile. — [S. 325.] — Cd. Anl. t. H. f. 75: 23.
Prismaria alba. — Sturm h. 35. t. 7. (Preuss.).
Propolis. — [S. 372.] — cf. Stictis.
—— alba. — [S. 372.]
—— Berkeleyana. — Dsm. III. 14.
—— farinosa. — [S. 372.]
—— hysterina. — [S. 372.]
—— nivea. — [S. 372.]
—— phacidioides. — [S. 372.] — Cd. Anl. t. G. f. 61: 1—4. — Pay. b. cr. p. 86. f. 386. — Bail S. t. 19.
—— Pinastri Lacr. — R. f. 371. — Dsm. III. 791.
—— quadrifida. — Chile n. 8. f. 8.
—— rhodoleuca. — [S. 372.]
—— versicolor. — [S. 372.]
—— viridis. — [S. 372.]
Prostenium Guepinianum M. — cf. Pestalozzia Guep. — Wstd. 337.
Prosthecium ellipsosporum. — Fres. t. 7. f. 18—23.
Prosthemium. — [S. 416.]
—— betulinum. — [S. 416.] — Cd. Anl. t. F. f. 58: 10—12. — Bisch. f. 3868. — Fuck. s. 417. — Pay. b. cr. p. 78. f. 368. — Bail S. t. 15. — Kl. 1386. — Voges. 1481.
—— stellare. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 28—31. (Riess). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 10. p. 380.
Proteus. — cf. Amoeba.
Protomyces. — [S. 517.]
—— endogenus. — [S. 517.] — Ung. Ex. t. 5. f. 27. — R. f. 400. — Bisch. f. 3901. — Bon. t. 1. f. 21.
—— Galii Rbh. — Fuck. s. 1. — P. endogenus Ung.: R. f. 400. — Fuck. rh. 48.
—— macrosporus. — Physoderma gibbosum Wllr. — Ung. Ex. t. 6. f. 28. — Cd. Anl. t. B. f. 2: 1. 2. — de Bary, Br. t. 1. f. 9—12; t. 2. f. 1. — Bon. t. 1. f. 26. — Kl. 2000. — ? zu Peronosp. Umbell.: Casp. Schimmel f. 33—37. — R. f. 600.
—— Menyanthis. — de Bary, Br. t. 2. f. 2.
Psathyra. — cf. Agaricus.
Psecadia. — [S. 414.]
Pseudo-Erineum. — cf. Erineum.
Pseudographis elatina Nyl. — Hysterium el. P. (Dub.).
Pseudovalsa cf. Sphaeria.


Propolis Berkeleyi. — Tulas. Select. fung. 3 pag. 227. —
Durieu et Léveil. Fl. Alger. tab. XXIX. fig. 8.
Comycea Berkeleyana Tuter Classif. pag. 22.

Puc. compositarum De Bary Champ. Parasit. in Ann. Sc. nat. 4e Ser. XX. Pl. 11. f. 11-12. – 1863.

f. 40. B. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 22—27. (Tul.). — Fuck. s. 56. — Dsm. 172. — Kl. 271. — Kl. II. 191. — Brit. f. 219. — Wstd. 757. — Fuck. rh. 314. 345.
Puccinia Compositarum f. Bellidis. — Brit. f. 225.
—— —— f. Cardui. — Kl. 790.
—— —— f. Crepidis. — Kl. 1091.
—— conglomerata. — [S. 511.] — Ung. Ex. t. 7. f. 38. — Schweiz. 2.
—— Convallariae Schum. = Macrosporium Conv. Fl. dan.
—— Convolvuli. — Dsm. 1154. — Kl. 1692; 1988.
—— coronata. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 28. (Tul.). — Fuck. Nass. f. 3. — Fuck. s. 42. — de Bary, Br. t. 4. f. 2. — Dsm. 1152. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 43—45. — Landw. Annal. d. mecklenb. patriot. Ver. 1862. no. 2. (Kühn). — Dsm. III. 253. — Wstd. 759. — Fuck. rh. 322.
—— —— v. Lolii. — Bull. ac. belg. 1. Sér. 1854. XXI. 2. p. 216. f. 2. (Wstd.). — Wstd. 1076.
—— —— v. sertata. — Kl. II. 681. — cf. P. sert.
—— Corrigiolae. — Dsm. 1158.
—— cristata Schmid. — Wstd. 339.
—— Crucianellae. — Dsm. 1155.
—— Cynodontis. — Dsm. III. 655.
—— Dianthi. — Kl. 191. — Kl. II. 342. — Wstd. 292.
—— didyma. — Bon. t. 1. f. 23.
—— difformis. — Bon. Con. p. 216. t. 3. f. 39.
—— Discoidearum Lk. — [S. 513.] — Kl. 190. — Kl. II. 685. — Dsm. 1275. — Wstd. 422; ? 851.
—— Discoidearum Lk. f. Asparagi. — Wstd. 423.
—— —— f. Millefolii. — Kl. 1188.
—— Dracunculi. — Kl. 1488.
—— Elymi. — Wstd. 291.
—— Epilobii. — [S. 513.] — Dsm. 1159. — Kl. 1184. — Kl. II. 337. — Fuck. s. 51. — R. f. 488. — Brit. f. 348. — Wstd. 682. — Ital. 596. Fuck. rh. 339.
—— Eryngii DC. — Dsm. 1157. — Wstd. 1273.
—— Fabae. — [S. 514.] — Ung. Ex. t. 7. f. 39. B. — Wstd. 128.
—— fasciata. — Bon. Con. p. 218. t. 3. f. 42. (= P. Lychnidear. Cd.).
—— Favi Ardst. — Robin. v. p. t. 14. f. 13.
—— ferruginea Lév. — Bonite t. 140. f. 5.
—— Ficariae. — Voges. 294. — Wstd. 88.
—— Fragariastri DC. — Wstd. 859.
—— Frankeniae. — Cd. Ic. VI. f. 9.
—— Galii Lk. — Kl. 470.
—— —— Cruciatae. — Wstd. 584.
—— —— verni Ces. — Kl. 1092. — Kl. II. 161. — cf. Vaillantiae. — Ital. (19). 99.
—— Galiorum. — [S. 513.] — Kl. II. 792. — Fuck. s. 66. — Fuck. rh. 351.
—— Gentianae Lk. — Kl. 166. — Kl. II. 338.
—— Geranii. — [S. 513.] — Fuck. s. 74. — Fuck. rh. 373.
—— Gladioli. — Dsm. 1529.
—— Glechomatis DC. — Kl. 272. — Kl. II. 195. — Fuck. s. 47. — Dsm. 236. — Wstd. 121. — Fuck. rh. 329.
—— globosa Gr. — Loud. f. 16711.
—— Globulariae DC. — Wstd. 1075.
—— glomerata. — Brit. f. 220.
—— Glycyrrhizae. — Kl. 1396.
—— Gonolobi. — Carol. IV. 91.
—— Graminis. — [S. 514. 515, 15.] — Bisch. f. 3877. — Loud. f. 16710. (p. 1017. u. 1048. 1049.). — Ann. sc. n. 1851. II. t. 9. f. 1—8. (Tul.). — Bon. t. 1. f. 40. — Berk. Out. t. 1. f. 4. — Lindl. v. K. p. 35. f. 24. — de Bary, Br. t. 4. f. 1. — Kühn, Krankh. t. 5. f. 37—42. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 21. (Currey). — Kl. 79. — Kl. II. 347. — Fuck. s. 39. — Pringsh. Jahrb. II. t. 28. f. 15. (Hoffm.). — Landw. Annal. d. mecklenb. patr. Ver. 1862. no. 2. (Kühn). — Voges. 675. — Carol. I. 99. — Letell. 661, 4. — Oekonom. Neuigk. v. Hlubeck, 1846. t. 2. f. 9—11. — Wstd. 91. 186. 582. (v. epiphylla et spiculor.). — Krypt. Bad. 113. — Fuck. rh. 319. (c. Ured. linear.).
Puccinia Graminis f. Avenae. — R. f. 392.
—— —— v. Arundinis. — Voges. 292.
—— Graminum. — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 2. (Hedwig fil.).
—— granulata. — Kl. II. 499.
—— Helianthorum. — Carol. II. 90.
—— Heraclei Grev. — Loud. f. 16699.
—— Herniariae. — Ung. Einfluss d. Bodens. f. 17. — Kl. 1397.
—— heterochroa. — Dsm. 1532. — cf. Vaillantiae.
—— Hieracii T. — Fuck. s. 55. — Fuck. rh. 342.
—— hysterioides. — [S. 513.]
—— Jasmini. — Dsm. 1530.
—— Impatientis. — [S. 514.]
—— incarcerata Lév. = Ustilago Cissi DC.
—— inquinans Wllr. — [S. 514.] — Bon. Con. p. 215. t. 3. f. 11. — R. f. 492.
—— —— f. Aegopodii. — Wstd. 679; 680: Betonicae; 756. u. 855: Compos.; 754. u. 854: Labiat.; 755: Polygon.
—— inquinans Wllr. f. Epil. — R. f. 493.
—— —— v. Umbellifer. — Wstd. 418. 853.
—— Junci. — Dsm. 170. — Wstd. 585.
—— Juniperi P. — Wstd. 339.
—— Lamyi S. = P. Valantiae P., punctata Lk., clavuligera v. Galiorum Wllr.
—— Lapsanae. — Fuck. Nass. f. 6. 7. — Fuck. s. 58. — Wstd. 855. — Fuck. rh. 347.
—— lateripes. — Berk. In. p. 325. f. 73. f. — Carol. II. 89.
—— lateritia. — Carol. III. 93.
—— Liliacearum. — [S. 513.]
—— —— f. Muscari comosi. — Kl. II. 686.
—— —— f. Ornithogali umbellati. — Kl. II. 794.
—— Liliorum. — Cd. Ic. V. p. 50. t. 2. f. 12.
—— Limonii DC. — R. f. 494.
—— Linckii Kl. — Linn. 1833. VIII. t. 12.
—— linearis. — Dsm. III. 152. — Wstd. 91.
—— lineolata. — Dsm. 1527.
—— Luzulae. — Lib. 94. — Kl. 1691. — Kl. II. 341. = gracilis Bon. Con. 51.
—— —— Lib.: R. f. 393. — Dsm. III. 339. — Wstd. 583. — Fuck. rh. 327.
—— Lychnidearum. — [S. 513.] — Kl. 472. — Kl. II. 683. — Ung. Ex. t. 6. f. 33. — Microsc. Journ. 1857. V. t. 8. f. 22. (Currey).
—— —— Cd. = P. fasciata Bon. — Brit. f. 221. Wstd. 292. — Ital. 656. — Fuck. rh. 366—369.
—— —— Lk. — cf. Frankeniae Lk.
—— —— f. Dianthi. — Kl. 1147.
—— —— f. Lychnidis. — Kl. 1147.
—— —— f. Saginae. — Kl. 593.
—— macrospora Spr. — Wstd. 575.
—— Malvacearum. — Cd. Ic. VI. f. 12.
—— Maydis Poetsch. — R. f. 183.
—— Menthae. — [S. 513.] — Dsm. 171. — Fuck. s. 50. — Kl. II. 353. — Brit. f. 217. — Letell. 661, 3. — Wstd. 754. — Fuck. rh. 335—338. (Clinop., Calam., Thym.).
—— Millefolii. — Fuck. rh. 319.
—— mixta. — Fuck. rh. 377.


Fuc. Gladioli Castag. Catal. Massil. p. 199. _ Montag
Fl. Alger pag. 319. .

— Stramineis Fuck. Comp. Nlle Observations sur les Urédinées par De Bary. trad. par Tulasne in Ann. sc. nat. 5e Sér. T. v. Cahier 5. 4. 262. (1866)



Sacidium Natricis Montg. Syll. pag. 269. — Cent. Supp.


Robergia albifrons Tul. Sel. Fung. ii. p. 258, 259.




Schizophyllum flabellare. — Afzel. t. 11. f. 25.
—— umbrinum Berk. — Hook. J. 1851. III. t. 1. f. 1.
Schizopogon luteolus. — Kl. II. 320.
Schizostoma. — [S. 441.]
—— fimbr. Lév. — cf. Tulostoma fimbr.
Schizothecium. — [S. 418.]
—— fimicolum. — Cd. Anl. t. F. f. 60: 7—10. — Bail S. t. 16. — Kl. II. 257. cf. Sordaria fimiseda.
—— —— Not. — Kl. II. 259.
Schizothyrium acerinum. — Dsm. III. 560.
—— Ptarmicae. — Wstd. 375.
Schizoxylon sepincola. — Démid. Russ. t. 4. f. 6. — Dsm. III. 429. — Voges. 174. — Alger. t. 27. 4.
Schmitzomia. — [S. 363.] — cf. Stictis.
Schweinizia. — [S. 364. 440.]
Sciniatosporium. — [S. 402***.]
Sclerangium. — [S. 441.]
—— polyrhizon. — Ann. sc. n. 1848. XI. t. 7. f. 1—4. (Lév.).
Sclerococcum. — [S. 480.]
—— sphaerale Fr. — [S. 480.] — Kl. 958.
Scleroderma. — [S. 444.] — Ann. sc. n. 1842. XVII. t. 1. 2. (Fructif. Tul.). — Flora. 1843. I. t. 2. (Tul.).
—— album. — Carol. IV. 76.
—— Bovista. — [S. 444.]
—— Cepa Grev. — Loud. f. 16501.
—— cervinum P. — Elaphomyc. granul., Fl. dan.
—— citrinum. — Cd. Anl. t. C. f. 38: 8. 9. — Loud. f. 16505. — cf. S. vulgare var.
—— Geaster. — Act. Turin. 1843. V. t. 3. f. 14. (Vittad.). — Bisch. f. 3675.
—— —— Fr. — cf. Sclerang. polyrhiz Lév.
—— sinnamariense. — [S. 444*.] — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 12. (Mont.).
—— spadiceum Grev. — Loud. f. 16506.
—— verrucosum. — [S. 444.] — Loud. f. 16503. (cf. S. vulgare). — Fuck. s. 301. (p. pte.). — Cd. Anl. t. C. f. 38: 6. 7. — Huss. I. 17.
—— vulgare. — [S. 444.] — Kops Fl. bat. IX. t. 720. 1. — Fuck. s. 303. — Schnzl. t. 14. f. 46—48. — Tul. F. hyp. t. 21. f. 7. — Pay. b. cr. p. 111. f. 506. — Kl. 174. — R. f. 213. — Vent. mi. 10. f. 6; 61. f. 6. 7; 71. f. 1. 2; 76. f. 5. 6.
—— —— v. squamosa Fr. — Fl. dan. XI. 1969. 2.
—— —— v. verrucosa P. — Kl. 419.
Scleroglossum conicum. — Voges. 672.
—— lanceolatum. — Clavaria herbarum.
Sclerographium aterrimum. — Hook. J. 1854. VI. t. 8. f. 4.
Scleromitra. — [S. 521**.]
—— cinereo-alba. — Bon. t. 10. f. 213.
—— coccinea. — Sturm h. 7. t. 27.
—— micans. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 4—8. — Typhula m. Fr. (Bail).
Sclerotium. — [S. 477.]; cf. Claviceps, Cordyceps, Sphaeria, Spermoedia, Melampsora. — Tul. Scl. I. — Acgerita. [S. 477.]
—— albidum. — Dsm. III. 567.
—— anthodiophilum. — Kl. 1550.
—— areolatum. — [S. 482.] — Fuck. s. 213. — Voges. 883. — Lib. 239.
—— aurantiacum Lasch. — Kl. 1234.
—— aurantio-fuscum Rbh. — Kl. 936.
—— Betuli. — Lib. 336. — Wstd. 545.
—— betulinum Fr. — cf. Melampsora bet. D. — Letell. 636. 2. — Wstd. 279.
—— cum Botrytide erythropode. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 5. (Lév.).
Sclerotium Brassicae P. — [S. 479.]
—— —— f. Georginae Lasch. — Kl. 1233.
—— bullatum DC. — Kl. 832. — Wstd. 732. — zu varium P. (Coems.).
—— carneolum. — Dsm. III. 162.
—— carneum. — [S. 478.]
—— Castaneae. — Wstd. 739.
—— Cepae. — Brit. f. 276. — cf. Mucor subtil. — Lib. 238.
—— cepivorum. — [S. 478.] — Dsm. III. 569.
—— Circaeae. — [S. 479.]
—— Clavus. — [S. 479**. 519.] — Lib. 142. — cf. Sphacelia segetum, Claviceps purpurea. — Phöb. Gift. t. 9. f. 3—52. — Berk. Out. t. 23. f. 7. — Loud. f. 16321. — Fuck. s. 209. a. c—l. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. (5.) p. 430. — Kl. 56. — Dsm. 581. — Voges. 1089. — Oekonom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 21—30. — Wstd. 327. 379: v. Enodii. — Schweiz. 17.
—— —— conidia. — Linn. Trans. 1838. XVIII. t. 32. 33. (F. Bauer). — Démid. Russ. t. 6. f. 7. — Linn. Trans. XVIII. t. 33. B. p. 460. 471. (Quckett). — Bot. Zt. 1858. t. 4. B. (Bonord.).
—— —— f. Clavicipitis purp. — Fl. dan. X. t. 1781. f. 1. (Sphaer.). — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 23—29. (Tul.). — cf. Claviceps p.
—— —— v. Agrostidis. — Kl. 1791. g.
—— —— v. Alopecuri bulbosi. — Dsm. III. 167. C.
—— —— v. Ammophilae. — Kl. 1791. c. — Dsm. III. 166. B.
—— —— v. Arundinis. — Kl. 1117.
—— —— v. Avenae. — Dsm. 1628.
—— —— v. Baldingerae. — Kl. 1791. d.
—— —— v. Brachypodii sylvat. — Dsm. III. 167. B.
—— —— v. Bromi gigantei. — Dsm. III. 166. C.
—— —— v. Calamagrostidis. — Dsm. III. 166. a.
—— —— v. Dactylidis glomeratae. — Dsm. III. 167.
—— —— v. Glyceriae. — Kl. 1791. a. — Dsm. III. 165.
—— —— f. Holci mollis. — Kl. 1791. e.
—— —— f. Lolii. — Kl. 1791. f. — Wstd. 1256.
—— —— f. Moliniae. — Kl. 1148.
—— —— f. Phragmit. comm. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 4. f. 12—14. (Tul.).
—— —— f. Poae. — Kl. 1148.
—— —— —— pratensis. — Dsm. III. 572.
—— —— f. Scirpi. — Kl. 935.
—— —— f. (Secalis). — Pay. b. cr. p. 58. f. 245.
—— —— f. Tritici juncei. — Dsm. III. 161.
—— compactum. — [S. 479.] — Dsm. 1637—1639. — Lib. 34. — Fuck. s. 216. — cf. Peziza Sclerotii Fuck. — zu S. varium P. (Coems.).
—— —— Althaeae. — Wstd. 1257.
—— —— Cucurbitae DC. — Bisch. f. 3480.
—— —— Helianthi DC. — Bisch. f. 3481. 3482. — R. f. 586.
—— —— Zeae. — Wstd. 1257.
—— complanatum Tode. — [S. 478.] — Bisch. f. 3397. — Dsm. 574. — Kl. 387. — Fuck. s. 220. — vix Schnzl. t. 14. f. 12. — Brit. f. 72. — Wstd. 378.
—— —— huc: Typh. phac.: R. f. 418. (Wstd.) et ? Typh. gyrans (Bail S. 76.); — Clavaria juncea (Tul.).
—— —— c. Clavaria juncea. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 1. (Lév.).
—— —— f. Cucurbitae. — Kl. 428.
—— —— f. Helianthi. — Kl. 1030.
—— concavum. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 2. f. 6. — Dsm. 81.

Sclerotium Convallariae. — Kl. 1552.
—— cornutum. — Acrospermum corn.
—— crustuliforme Rob. — Dsm. 1646. — zu Typhula erythropus P. (Bail S. p. 76; Tul.).
—— dorsale. — Dsm. 1611.
—— durum P. — [S. 479.] — Loud. f. 16315. — Fuck. s. 210. — Bail S. t. 18. — Kl. 150. — Dsm. 577. — Voges. 489. — Brit. f. 74. — Lib. 35. — Wstd. 483. 739. (Zeae, echinophila, Scolymi, Hippocast.).
—— —— echinophilum. — Dsm. 1640.
—— echinatum. — Fuck. s. 215.
—— elongatum Chev. — zu varium P. (Coems.).
—— emergens. — [S. 478.]
—— epixylon. — [S. 476.]
—— Erysiphe. — cf. Erysiphe Coryli. — Wstd. 407. 408. 413.
—— Erythrinae. — Lotos 1857. VII. t. 1.
—— Euphorbiae. — Wstd. 973.
—— eurotioides. — Lib. 138.
—— Evonymi. — Dsm. 1643.
—— excentricum. — [S. 478.]
—— fibrillosum. — Lib. 139.
—— figuratum. — [S. 479.]
—— floccipendulum. — [S. 478.]
—— fructuum. — Wstd. 735.
—— fulvum. — [S. 478.]
—— fungorum. — [S. 478.] — c. Clavaria minore. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 2. (Lév.).
—— glauco-album. — Dsm. 1634.
—— Graminum. — Dsm. 1645.
—— granulatum. — Lotos 1857. VII. t. 2.
—— herbarum Fr. — [S. 482.] — Kl. 430. — Voges. 990. — Melampsora h. Dsm.
—— immersum. — [S. 478.]
—— inclusum S. K. — [S. 398.] — Kl. 1028. — Wstd. 545.
—— —— f. pyricola Lasch. — Kl. 1029.
—— juncinum. — Dsm. 1632. 1633.
—— lacrymabundum Chev. — cf. varium.
—— lacunosum P. — ? zu Peziz. tuberosa Bull. (Bail S. p. 76.).
—— leiodermum. — Dsm. III. 568. — Wstd. 1386.
—— Liliacearum. — Wstd. 826. (Scill. et Amaryll.).
—— Linnaeae. — [S. 479.]
—— Lycopodii. — [S. 479.]
—— maculare. — [S. 478.] — Dsm. 1631.
—— —— innocuum. — Dsm. III. 161. — Wstd. 545.
—— medullare. — [S. 478.] — Brit. f. 75. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 5. p. 47. (Berk.).
—— medullosum Dsm. — zu durum ? (Tul.). — Dsm. III. 160.
—— minutum. — Dsm. 80. 578. (zu varium P. Lév. [Tul.]). — Voges. 1192.
—— muscorum. — [S. 478. 479***.] — Grev. sc. t. 101. — Loud. f. 16309. — R. f. 370. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 4. (Lév.). — Kl. 833.
—— mycetosporum. — Lib. 334. — Kl. 425. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 5. (Ns.).
—— neglectum. — [S. 478.] — Dsm. 1644. — Brit. f. 165.
—— nervale Tod. — Bisch. f. 3398. — Kl. 1551.
—— —— A. S. — Kl. 831.
—— nervorum. — Schnzl. t. 14. f. 13—16.
—— nitidum. — Voges. 674. (Leptostroma vulgare Fr.). — Wstd. 1125.
—— nudum. — [S. 478.]
—— occultum. — Hoffm. Ic. t. 16. f. 3.
—— olivaceum. — [S. 478.]

Sclerotium Orobanches. — [S. 179.]
—— ovatum Schum. — durum (Lév.). — Wstd. 182.
—— palliolatum. — [S. 478.]
—— Paspali. — Carol. II. 100.
—— perpusillum. — Kl. 1320.
—— persicinum. — [S. 361.]
—— pezizaeforme. — [S. 478.] — Lib. 140.
—— populinum P. — [S. 482.] — Dsm. 580. — Kl. 424. — Perisporium pop. Wllr.
—— —— Rbh. — cf. Melampsora pop. — Letell. 636. 1. — Wstd. 77.
—— populneum. — Voges. 385.
—— protuberans. — [S. 479.]
—— Pteridis Moug. = Leptostroma litigosum Dsm. — Voges. 672. (Leptost. filicinum Fr.). — Wstd. 76. 180.
—— pubescens. — [S. 478.] — Kl. 1477. — Fuck. s. 221.
—— Punctum. — Lib. 37. — Wstd. 659.
—— Pustula. — [S. 479.] — Dsm. 579. 1612. — Wstd. 731. 1258. (petiolor.).
—— —— cum Peziza Candolleana. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 7. f. 4. (Lév.). — Fuck. s. 214. — Letell. 636. 4.
—— —— DC. : zu Typhula sclerotioides (Bail S. p. 76).
—— pyrinum. — [S. 479.] — Brit. f. 166. — Wstd. 735.
—— quercinum P. — Voges. 575. — Loud. f. 16317. — Wstd. 734. 919.
—— radicatum Tod. — [S. 445. Anix.] — Bisch. f. 3395.
—— Renovii. — Dsm. III. 566.
—— rhizoctonioides. — [S. 478.]
—— rhizodes Awd. (Sarcidium). — Kl. 1232. — Dsm. III. 571.
—— Rhizomorpha. — [S. 479***.]
—— rimosum Lasch. — Kl. 1149.
—— roseum. — [S. 478.] — Kl. 386. — zu Peziza Curreyana (Journ. Proc. Linn. Soc. 1857. I.). — Voges. 884.
—— Rubi. — [S. 479.]
—— rugulosum. — [S. 478.]
—— salicinum. — [S. 482.] — Kl. 1476.
—— —— DC. — cf. Melampsora salicina. — Fuck. s. 28. d. — Dsm. 953. — Voges. 386. — Brit. f. 28. — Letell. 636. 3. — Wstd. 736.
—— sanguineum. — [S. 478.]
—— scutellatum. — [S. 478.] — Loud. f. 16313. — Dsm. 1630. — Brit. f. 27.
—— Selaginellae. — Lotos 1857. VII. t. 2.
—— Semen Tode. — [S. 478.] — Dsm. 575. — Bisch. f. 3394. — Loud. f. 16307. 16307, β. — Kl. 426. — Kl. II. 507. — Fuck. s. 219. — cf. Tul. Sel. I. 118. 2. — Wstd. 78.
—— —— v. Brassicae. — ? zu Typhula variabilis Riess (Bail S. p. 75.). — Brit. f. 73.
—— —— f. depressa. — Kl. 1031.
—— Semini affine. — Ann. sc. n. 1843. XX. t. 6. f. 3. (Lév.).
—— speireum. — [S. 479. 519.]
—— spermoides. — [S. 478.]
—— sphaeriaeforme Lib. — zu varium (Coems.). — Lib. 237. — Wstd. 547.
—— sphaeroides. — [S. 419.]
—— stercorarium. — [S. 478.] — Dsm. 576. — Kl. 1790. — Fuck. s. 218.
—— —— DC. — zu Peziza tuberosa Bull. (Bail S. p. 76.).
—— stipatum. — [S. 478.]
—— strobilinum. — [S. 478.]





Sclerotium subterraneum a T. — cf. S. muscorum.
—— —— trunc. — zu Agar. cirrat. P. (Tul.).
—— succineum. — Dsm. III. 163.
—— sulcatum Dsm. — zu Pez. Duriaeana (Tul.). — Dsm. 1629.
—— tectum Fr. — [S. 478.] — Kl. 429. — Fuck. s. 212. — Lib. 335. — Wstd. 182.
—— Tiliae Lk. — Kl. 575.
—— tomentosum Td. — Wstd. 43.
—— Trientalis. — [S. 479.]
—— truncorum. — [S. 478. 479 ***.]
—— Tulipae. — Lib. 36. — Kl. 1321.
—— umbilicatum Lasch. — Kl. 531.
—— —— Rob. — Dsm. 1635.
—— vaporarium. — [S. 478.]
—— varium. — [S. 479.] — Schnzl. t. 14. f. 41. — Kl. 417. — Fuck. s. 211. — Dsm. 79. 1636; III. 570. — zu Pez. Sclerotiorum Münter in lit.). — huc lacrymab. Chev. et Pez. Sclerotior. Lib. (Tul.). — Voges. 989. — Wstd. 182. 731.
—— velutinum. — Wstd. 516. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XVIII. p. 417. f. 5. (Wstd.).
—— vestitum. — Norweg. 183. (Acinula candicans Fr.).
—— Vitis. — Lotos. 1857. VII. t. 2. — Kl. 1319.
—— vulgatum. — [S. 478.]
Scoleciocarpus. — [S. 443.]
Scolicotrichum. — [S. 503.]
—— Graminis. — Fuck. rh. 130.
—— olivaceum. — Kl. 1678.
—— smaragdinum. — Bon. t. 8. f. 176.
—— tomentosum Bon. — Bot. Zt. 1853. t. 7. f. 12.
—— venosum Bon. — R. f. 582. (c. ic.).
—— virescens. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 3. — Bon. t. 4. f. 93.
Scopularia venusta Preuss. — Sturm h. 36. t. 4.
Scopulina. — [S. 396.]
Scorias. — [S. 466.]
—— spongiosa. — Carol. I. 81. (Botrytis? spongiosa). — Journ. hort. soc. 1849. IV. p. 257. 1. (B. D.).
Scorzonera pulverifera Mor. — Ustilago recept. Scorz.
Secale cornutum et luxurians. — cf. Sclerot. Clav.
Secotium. — [S. 440.]
—— acuminatum. — Alger. t. 22, bis. 1.
—— Basserrianum. — Alger. t. 22, bis. 5.
—— coarctatum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 3.
—— —— Berk. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 25—30.
—— erythrocephalum. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 9. f. 5—17. (Tul.). — Pay. b. cr. p. 8. f. 33; p. 115. f. 536.
—— Gueinzii. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 5. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 10—18.
—— melanospermum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 1. f. 2.
—— melanosporum Berk. — Cd. Ic. VI. t. 6. f. 19—24.
—— olbium. — Ann. sc. n. 1845. IV. t. 9. f. 1—4. (Tul.).
—— Queintzii. — cf. Gueinzii.
Seimatosporium. — [S. 402 ***. 471 **.]
—— Rosae. — Sturm h. 13. t. 40.
Seiridium. — [S. 401 ***. 507.]; cf. Siridium, Coryneum.
—— marginatum. — [S. 402 ***. 471 **.]
Selenosporium. — [S. 473 **.] — cf. Fusisporium.

Selenosporium Asperifoliarum. — Bull. ac. belg. 2. Sér. XI. p. 660. f. 2. (Wstd.).
—— fuscum. — Bon. t. 10. f. 220.
—— herbarum. — Cd. Anl. t. G. f 69: 1—3. — Pay. b. cr. p. 76. f. 359.
—— lateritium. — Dsm. III. 796.
—— minutissimum. — Dsm. III. 456.
—— pallens. — Wstd. 336.
—— pyrochroum. — Dsm. 1547; III. 22.
—— sarcochroum Dsm. — Wstd. 685.
—— tubercularioides. — Bon. t. 11. f. 230.
—— Urticarum Cd. — R. f. 388. — Dsm. III. 658.
Sepedonium. — [S. 497.]; cf. Mycobanche.
—— agglomeriferum. — Letell. 667. 4.
—— angulatum Kl. = Nyctalis asterophora Fr.
—— caseorum. — Wstd. 300.
—— cervinum. — [S. 497.] — Bisch. f. 3807.
—— chrysospermum. — [S. 497.] — Bisch. f. 3806. — Bon. t. 4. f. 103. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 1.
—— fuscum. — Bon. t. 4. f. 106.
—— mycophilum. — [S. 497. myc.] — Berk. In. p. 298. f. 68. d. — Fuck. s. 183. — Loud. f. 16567. — Dsm. 103. — Schnzl. t. 12. f. 39. 40. — Kl. 66; Cent. X., Suppl. — Kl. II. 184. — Wstd. 436. — Fuck. rh. 141.
—— osteophilum. — Bon. t. 5. f. 109.
—— roseum. — [S. 497.]
Septaria. — cf. Septoria.
Septocolla adpressa. — Bon. t. 12. f. 247.
Septonema. — [S. 504.]
—— alba. — Sturm. h. 29 —. t. 37. (Preuss.).
—— elongatispora. — Sturm h. 29 —. t. 36. (Preuss.).
—— irregulare B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 15. f. 13. p. 381.
—— radicans. — Carol. II. 87.
—— secedens. — [S. 504.] — Kl. 1981.
—— spilomeum. — Hook. Lond. J. 1845. IV. t. 12. f. 5. — Carol. IV. 87.
—— strictum. — Cd. Ic. VI. f. 22.
—— virescens. — [S. 504.]
—— viride. — Cd. Anl. t. B. f. 6: 3. — Pay. b. cr. p. 69. f. 302.
Septoria. — [S. 426.]; cf. Ascochyta, Spilosphaeria, Sphaeria, Depazea.
—— Aceris. — Kl. 1860. — Fuck rh. 499.
—— —— Berk. Br.: (S. incondita v. acericol. Ds., Ascochyta Ac. Lib.): Kl. II. 565. — Fuck. s. 329.
—— Aegopodii. — Dsm. 143. — Wstd. 95.
—— Aesculi. — R. f. 550.
—— aesculicola. — Wstd. 1384.
—— Anemones. — [S. 426.] — Fuck. s. 326. — Dsm. 240. — Wstd. 645.
—— Antirrhini. — Dsm. 1825.
—— Ari. — Dsm. 1307.
—— Astragali Rob. — Dsm. 737.
—— Badhami. — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. p. 460. t. 15. f. 9. (B. B.).
—— bellidicola. — Dsm. 1833.
—— Bellidis. — Dsm. 1832.
—— Betae. — Wstd. 296.
—— Brassicae. — Wstd. 294.
—— Bupleuri. — Dsm. 1317. — Wstd. 1144.
—— Calamagrostidis. — Wstd. 1055.
—— Calystegia. — Wstd. 642. = Polystigma pertusarioides Dsm.
—— Capreae Wstd. — Depazea salicicola Fr. Rb.
—— Carthusianorum. — Wstd. 939.
—— Castaneae Lév. — Wstd. 725.
—— castaneaecola. — Dsm. 1332. — Kl. 1957. — Wstd. 725.

— Naegui Cast. Cat. marseil. p. 178 (sub Sphaeria)

Sept. Lituus Berk. Notices Brit. Fung. N° 744.

Sept. Macularis Lévil. Champ. Musée. N° 390.

— Rosae var. Sempervirens Dur. Mtg. Fl. Alger. p. 595.

— Scabiosaecola Desm. 21e Not. p. 12.

Sorosp. Saponariae. de Bary Champ. parasit. in Ann. S. nat. 4e Sér. XX. Pl. 12. f. 8.

Septoria Stellariae Rob. — Dsm. 1325. — Wstd. 918.
—— sylvicola. — Dsm. III. 690.
—— Tiliae. — Wstd. 956.
—— Tormentillae Rob. — Dsm. 1326. — Wstd. 1147. (Potent.).
—— Tritici Rob. — Dsm. 669.
—— Tussilaginis. — Wstd. 640.
—— Ulmi. — [S. 426.] — Cd. Anl. t F. f. 54: 10. 11. — Loud. f. 16461. — Kl. 455. — Kl. II. 562. — cf. Phloeospora W. — Voges. 893. — Brit. f. 214. — cf Ascochyta, Lib. — Wstd. 137.
—— Umbellatarum. — Kl. 1861.
—— Uredinis Rob. — Dsm. 1313.
—— Urticae Rob. — Dsm. 1309. — Wstd. 489.
—— Verbenae Rob. — Dsm. 1311. — Wstd. 1145.
—— Veronicae Rob. — Dsm. 1310. — R. f. 361.
—— Viburni. — Wstd. 1150.
—— Viciae. — Wstd. 1151.
—— Villarsiae. — Dsm. 673. — Wstd. 945.
—— Vincae. — Dsm. 730.
—— Vincetoxici. — Wstd. 1146.
—— Violae. — Kl. 1457. — Wstd. 91. (Cheilaria V., ex Dsm.).
—— Virgaureae. — [S. 426.] — Dsm. 1314.
—— Vitis Lév. — Wstd. 728.
—— Xanthii. — Dsm. 1315.
Septosporium. — [S. 501.]
—— atrum. — R. f. 273; Sturm D. Fl. III. 12. p. 33. t. 17. (cf. Macrosporium).
—— bifurcum. — Fres. t. 6. f. 1—8.
—— bulbotrichum. — [S. 501.] — Cd. Anl. t. B. f. 10: 7. — Pay. b. cr. p. 73. f. 332.
—— caricinum. — cf. Macrospor. c.
—— curvatum. — Verh. Ver. z. Beförd. des Gartenbaues in Preussen. 1851. I. t. 1. A. (Braun, Casp., de Bary). — Kl. 1779.
—— Graminis. — Ökonom. Neuigk. v. Hlubeck. 1816. t. 3. f. 16—20.
—— instipitatum.— Sturm h. 25—. t. 12. (Preuss.).
—— myrmecophilum. — Fres. t. 6. f. 29—32.
—— nitens. — Fres. t. 3. f. 30—39. (Form von Cladospor.: = Sporidesm.; Bail).
Septotrichum. — [S. 519.] — pili degenerati. — cf. Erineum, Phyllerium. — Cd. Ic. IV.
Simblum. — [S. 431.]
—— gracile. — Hook. Lond. J. 1846. V. t. 17. f. 1. (Berk.).
—— periphragmaticum. — Cd. Anl. t. E. f. 51: 12. 13. — Bail S. t. 23.
—— sphaerocephalum S—l. — Linn. 1861. XXXI. t. 1. p. 154.
Siridium marginatum. — Bon. t. 4. f. 88. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 1—3. cf. Seiridium.
Sirodesmium. — affine Phragmotricho.
—— granulosum. — Kl. 1962. — Act. Tur. 1849. X. Dec. 5. f. 10. (Notar.). — Ital. 45.
Sistotrema. — [S. 328.]
—— carneum Bon. — Bot. Zt. 1857. t. 5. B.
—— cinereum Schum. = Daedalea unicol. Fl. dan.
—— —— P.: Wstd. 1285.
—— confluens P. — [S. 328.] — Hydnum sublamellosum Bull. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 20—22. — Fuck. s. 941. — Loud. f. 16125. — Bail S. t. 29. — Kl. 1117. — R. f. 310. a. b.
—— fimbriatum P. — Odontia f. Fr.
—— occarium. — Cd. Anl. t. G. f. 74: 23.
—— pes Caprae. — Pay. b. cr. p. 107. f. 488.
—— rufescens. — Letell. 648.
—— spongiosum Schwtz.— Polypor. labyrinth. Fr.
—— violaceum P. — Voges. 678.
Skepperia convoluta. — Linn. Trans. 1859. XXII. t. 25. (Berk.).
Soleciocarpus tener. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 22. f. 3. (Berk.).
Solenarium Mühlenbergii. — Bail S. t. 18. — cf. Glonium stell. (Dub.).
Solenia. — [S. 357.]
—— candida P. — [S. 357.] — Kl. 922. — Voges. 96. — Bisch. f. 3391.
—— —— M. N.: Pez. Solenia DC., Solenia fasc. Tul. Sel. I. 136.)
—— epiphylla. — Alger. t. 29, 1.
—— fasciculata. — [S. 357.] — Bail S. t. 20. — Pez. Solenia DC. — Carol. IV. 21.
—— ochracea Hoffm. — [S. 357.] — Bisch. f. 3392. Fuck. s. 790. — Kl. II. 232. — Cd. Ic. III. t. 6. f. 96. (P. K.). — Pez. anomala P., P. Hoffmanni Spr., Cyphella Hoffmanni Tul.
—— villosa. — [S. 357.] — Carol. V. 42.
Solenodonta Cast. — [S. 514.] — Puccinia sertata Pr.
—— Flotowii. — Kl. 1395. (Cent. XVIII.).
—— Graminis. — Castagne, Marseille. t. 2. — Wstd. 759.
Sophronia. — [S. 434*.]; cf. Hymenophallus.
—— brasiliensis. — Gaudich. Voy. 1826. t. 1: 2.
Sordaria. — cf. Sphaeria.
—— fimiseda. — Not. Sfer. 19. p. 22. (Schizothec. fimicol. Cd. et Podospora fimicola Ces.).
Soredospora. — [S. 501*. 505.]
—— Graminis. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 6.
Sorocybe. — [S. 468.]
Sorosporium. — [S. 516**.]
—— Saponariae. — Linn. 1829. IV. t. 2. f. 1. (Rudolphi). — Fuck. s. 114. — Bisch. f. 3878. — Kl. 1479; — 1480 (v. Gypsophilae). — Kl. II. 92. — Fuck. rh. 253.
—— schizocaulon Ces. — Kl. 1083. — Kl. II. 93.
—— —— v. Violae. — Kl. II. 190.
—— Scleranthi. — Kl. 1481.
Spadonia. — [S. 360.]
Sparassis. — [S. 337.]
—— brevipes. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 21.
—— crispa. — [S. 337.] — Bail S. t. 27. — Kl. 517. — Fries Sv. t. 17. — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 112—122. (Fructif. Phöb.).
—— foetida. — Pay. b. cr. p. 107. f. 483.
—— laminosa. — [S. 337.]
—— spathulata. — [S. 337*.]
Spathularia. — cf. Spathulea.
Spathulea. — [S. 347.]
—— crispata. — [S. 347.]
—— flavida. — [S. 347.] — Cd. Anl. t. G. f. 66: 6—10. — Loud. f. 16188. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 51. (Spor. Berk.). — Pay. b. cr. p. 7. f. 21; p. 85. f. 375. — Wstd. 1085. — Bail S. t. 21. — Berk. t. 21. f. 7. — Kl. 815. — Kl. II. 28. — Krypt. Bad. 337. — R. f. 126. — Fuck. s. 871. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 23. (Keimg. Hoffm.). — Dsm. III. 455. — Voges. 1477.
—— rufa Ns. — R. f. 235.
Speira. — [S. 523.]
—— toruloides. — Cd. Anl. t. B. f. 5: 7. — Pay. b. cr. p. 68. f. 295.
Spelaeomyces Heydeni. — Fresen. t. 13. f. 43—48. p. 106.
Spermodermia. — [S. 480. 519.]
Spermoedia. — [S. 479**.] cf. Sclerotium.
—— Clavus. — Kops Fl. bat. VIII. 626. — Wstd. 327.
—— —— v. Scirpi. — Kl. 935. (Cent. XVIII.).

Sphacelia seget. — [S. 479**.] — Wstd. 327; cf. Sclerot. Clav.
Sphaerella. — [S. 395.]; cf. Sphaeria.
—— conglomerata Rbh. — (alnicola) R. f. 150.
—— maculaeformis f. Carpini. — R. f. 512.
—— myriadea Rbh. — R. f. 149.
—— punctiformis. — Kl. II. 261.
—— recutita. — Kl. II. 659.
Sphaeria. — [S. 388.] — Pay. b. cr. p. 97. f. 449. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 13. (Fructif.). — cf. Bertia [S. 395.], Bombardia, Camillea, Ceratostoma [S. 396.], Cryptosphaeria, Cucurbitaria, Depazea, Diatrype [S. 384.], Diplodia [S. 416.], Discosia, Dothidea [S. 386.], Endothia [S. 385.], Gibbera [S. 402.], Halonia [S. 397.], Hercospora [S. 397.], Hypocopria [S. 397.], Hypocrea [S. 383.], Hypospila, Hypoxylon [S. 383.], Leptospora, Malinvernia, Massaria [S. 396.], Melogramma [S. 386.], Microstoma, Nectria [S. 387.], Nodulosphaeria, Oncomyces, Oomyces, Ophiobolus, Picrostoma, Pleospora, Poronia, Pyrenophora, Rabenhorstia, Rhaphidospora (= Ophiobolus), Sphaerella, Sphaerolina, Sphaeropsis, Spilosphaeria, Sporormia, Staurosphaeria, Stromatosphaeria, Valsa [S. 410.], Vermicularia, Xylaria.
—— Abietis (Valsa). — Kl. 1331. — Linn. Tr. XXII. t. 48. f. 147. 146.? p. 279. (Curr.).
—— acclinis (Valsa). — Not. Sfer. 39.
—— accumulata. — Voges. 665. (Vaccinii Sow.).
—— acericola (Diatrype). — Not. Sfer. 27. p. 28.
—— acervalis M. (Nectr.). — Linn. Tr. XXII. t. 49. f. 182. (Curr.). — Dsm. 760. 1408. 1409.
—— acervata Fr. — [S. 391.] — Fuck. s. 638. — (caespit.) Fr.: Linn. Tr. XXII. t. 49. f. 184. 185. (Curr.). — Brit. f. 174.
—— Achilleae. — Kl. 1448. — R. f. 534.
—— achroa DC. — Kl. 1960. — S. dubia P.
—— acinosa. — [S. 416. 1.] — Voges. 769.
—— aculeans. — Carol. I. 55.
—— acuminata Sow. — [S. 393.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 26. p. 328. (Spor., B. B.). — Ophiobolus Riess. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 133. (Curr.).
—— Acus Trog. — cf. Claviceps microcephala.
—— —— Blox.: Linn. Tr. XXII. t. 58. f. 93. p. 325. (Curr.).
—— acuta Hoffm. — [S. 394. 376.] — Fl. dan. XII. 2040. 3. — Cd. Anl. t. F. f. 55: 12—14. — Kl. II. 14. — Kl. 153. — Fuck. s. 550.
—— —— P.: cf. Phoma complan. — Voges. 181. — Letell. 686. 2. — Wstd. 170.
—— adpressa. — [S. 410.]
—— adunca. — Dsm. 1771.
—— Aegopodii P. — [S. 425.] — Kl. 257. — Fuck. s. 599. — Voges. 281. — Wstd. 95.
—— Aesculi Schum. — maculaeformis v., Fl. dan.
—— aesculicola. — [S. 423.]
—— affinis Grev. — Loud. f. 16423.
—— Agaves. — [S. 377.] — Voges. 1177. (Depazea). — (Pleospora) Not. Sfer. 78.
—— aggregata Lasch. — Kl. II. 541.
—— agnina Rob. — Dsm. 1415.
—— agnita. — Kl. 1935. — Wstd. 1111.
—— alba Schum. — S. ovina v. glabrata, Fl. dan.
—— albicans P. — Fuck. s. 564.
—— —— v. confluens. — Wstd. 166.
—— albo-punctata. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 16. (Wstd.). — Wstd. 1216.
—— Alismatis (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 154. (164). (Curr.).
—— Alliariae. — R. f. 261. — cf. Bilimbiospora.
Sphaeria allicina. — [S. 394.]
—— alligata Fr. — [S. 388.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 10. (Curr.).
—— Allii Rob. — Kl. 838. — Wstd. 719.
—— alnea. — [S. 394. 423.] — Lk.: cf. Discosia alnea Not. — Wstd. 477. — R. f. 539.
—— Alopecuri Fr. — [S. 419.] — R. f. 311. (Dilophospora Graminis Dsm.). — Wstd. 717.
—— alutacea. — cf. Cordyceps al.
—— ambiens P. — Dsm. 967. — Fl. dan. XII. 2039. 1. — Kl. 1325. — (Valsa): Linn. Tr. XXII. t. 48. f. 138. (Curr.). — Voges. 872. — Brit. f. 80. — Wstd. 367.
—— amblyospora. — Berk. In. p. 281. f. 65. b. = Massaria s. Sph. foedans Fr. (ex Berk.).
—— —— B.: R. f. 41. — cf. Splanchnonema pustulatum Cd. bei Sturm h. 9. t. 51. — Kl. 1830. — (Subtectae): Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 10. p. 322. (B. B.). — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 46. — u. IV. t. 11. f. 10—25. (Curr.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 99. (Curr.). — Fresen. t. 7. f. 24—33. — Fl. dan. 2160. 2.
—— Ammophilae. — Kl. 1340.
—— amoena Ns. — Dsm. 789. — Voges. 1251.
—— Amorphae. — Kl. 1844. — Kl. II. 732. — Fuck. s. 576. — Hedw. I. t. 5. f. 7.
—— anarithma (Foliicolae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 37. (B. B.).
—— Andromedarum. — Carol. I. 58.
—— andurnensis (Rosellinia). — Not. Sfer. 17. p. 19.
—— aneirina (Diatrype). — Not. Sfer. 29. p. 29.
—— Anemones DC. — Kl. 847. — Voges. 487. — Lib. 167. (Sphaeronema).
—— Anethi (Dothidea) P. — Dsm. 764. — Kl. 262.
—— —— v. Petroselini. — Dsm. 1411.
—— Angelicae. — [S. 393.] — Brit. f. 88. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 7. p. 48. (Berk.).
—— angulata Fr. — Bisch. f. 3503. — (Valsa) Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 122.
—— —— Schum.: Fl. dan. XII. 2160. 1.
—— angustata. — [S. 391.] — Kl. 1241. — Fl. dan. XII. 2154. 1.
—— angustilabra (Platystom.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 27. (B. B.).
—— annulata M. — Linn. Tr. XXII. t. 45. f. 31. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 47.
—— anomia Fr. — Fuck. s. 643. — (Valsa): Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 115. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 784. — Wstd. 472.
—— anserina P. — Bisch. f. 3595. — Malinvernia ans.
—— anthracina S. K. — cf. Hypoxylon nummul. Not.
—— Aparines Cast. — R. f. 538.
—— apiculata Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 96. p. 326. (Fruct.). — R. f. 250. (cf. S. Curreyi Rbh.).
—— apiospora. — Alger. t. 25, 1.
—— appendiculosa B. B. — R. f. 52. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 20. p. 189. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 97. (Fruct., Curr.). — Wstd. 474. — R. f. 331. (clyp.).
—— applanata. — [S. 390.]
—— aquifolia. — cf. Nectria inaurata.
—— Aquifolii Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 183. (Fruct., Curr.). — Voges. 879. — Lib. 146.
—— Aquila Fr. — [S. 388.] — Bisch. f. 3598. — Fuck. s. 618. — Kl. 157. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 4. (Fruct., Curr.). — Voges. 965.

—amoena Ns. – Gnomonia Ces. & De Not. Schema.

– argyrostigma Dec. of Fung. XIV. N° 140. Ohio.

— Carol. V. 65. — (Rosellin.) Not. Sfer. 18. p. 21.

Sphaeria aquilina Fr. — [S. 417.] — R. f. 249. — Hdw. I. t. 11. f. A. a—k.

—— araneosa Schum. = S. atrostoma Fl. dan.

—— —— P.: [S. 390.]

—— Arbuti. — [S. 417. 423, 9.]

—— arbuticola (Diplodia) Fr. — Kl. 443. — Dsm. 276.

—— Archangelicae Lasch. — Kl. 552.

—— Arctii Lasch. — Kl. 1046.

—— arcuata. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 167. p. 281. (Fruct., Curr.).

—— Arecae. — [S. 422**.]

—— arenula (Denudat.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 5. p. 320. (Fruct., B. B.).

—— areolata Fres. Mey. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 11. (R. Ludwig).

—— argillacea. — R. f 247. (Hypoxylon). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 15. f. 35. (Fruct., Curr.).

—— —— P. = multiformis, Fl. dan. — Wstd. 530. 713. 905.

—— Argus (Hercospora). — Kl. 1831. — (Subtectae) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 9. p. 322. (B. B.). — R. f. 259. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 95. (Fruct., Curr.).

—— Artocreas Tode. — [S. 423.] — Fl. dan. XII. 2100. 1. — Bisch. f. 3570. — cf. Discosia faginea Lib., u. clypeata Not. — Kl. 360. — Fuck. s. 363. — (Discosia) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 143. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 61—64. (Discos. Art. Rob.). — Wstd. 27.

—— arundinacea Sow. — [S. 391. 419.] — Fuck. s. 608. — Dsm. 762. 973. — (Seriat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 200. (Fruct., Curr.). — Voges. 1165. — Brit. f. 82. — Carol. III. 57.

—— Arundinis Fr. — [S. 391.] — Kl. 1037. — Kl. II. 641. — Fuck. s. 590. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 121. (Curr.). — Voges. 1172. — Brit. f. 87.

—— Asari Kl. — Kl. 250.

—— Ashwelliana (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 107. p. 327. (Fruct., Curr.).

—— Aspegreenii Fr. — [S. 390. 389**.] — Fl. dan. XIII. 2334. 3. — (Pertusae) Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 26. (B. B.).

—— aspera. — ? Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 114. p. 275: 117. (Diatryp.). Fruct. Curr. — Wstd. 167. 368. — Ital. 494. (Melogr.). — Hoffm. Ic. t. 18. f. 3. — Not. Sfer. 51.

—— Aspidiorum. — Lib. 342.

—— Asteroma. — [S. 425.] — Ascospora Fr. Su.

—— —— f. Polygonati. — Kl. 1153.

—— —— f. Saponariae. — Kl. 1454.

—— —— f. Violae. — Kl. 846.

—— asteromorpha. — Lib. 43.

—— Astragali. — Kl. II. 639. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 132. p. 331. (Fruct., Curr.).

—— astroidea. — [S. 392.]

—— Atomus. — Wstd. 277. — Dsm. 793. — R. f. 532.

—— atramentosa — [S. 389.]

—— atrata Dsm. = Diplodia melaena Lév. — R. f. 348. — Dsm. 778. — Voges. 1270.

—— atriseda. — [S. 390.]

—— atrofusca. — [S. 388.]

—— atropunctata (Diatry.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 70. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 62.

—— atropurpurea T. (Hypoxy.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 44. (Fruct., Curr.). — Voges. 765. (vogesiaca).

—— atrorubens. — [S. 408. 2.]

Sphaeria atrostoma Schum. — Fl. dan. XIII. 2333. 2.

—— atrovirens A. S. — Bisch. f. 3596.

—— —— v. Rusci. — Brit. f. 86. — Wstd. 535.

—— —— f. Visci. — Dsm. 42. — Kl. 535. — Voges. 486. — Wstd. 1231.

—— —— var. b. — Kl. II. 540.

—— —— v. Taxi. — Brit. f. 180.

—— —— v. Mirebili Fr. — Wstd. 26.

—— Aubertii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 10. (Wstd.).

—— aucta B. B. — R. f. 143. — (Obtect.) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 11. p. 323. (Fruct., B. B.).

—— Aucubae. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 14. (Wstd.). — Wstd. 1217.

—— aurantia P. — Bisch. f. 3601. — Fuck. s. 621. — Carol. V. 64.

—— —— v. fulgens. — R. f. 138. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 6. 7.? (Fruct., Curr.).

—— Aurantii. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 3. (Notar.).

—— Avellanae. — [S. 394.] — Brit. f. 182.

—— baccata. — [S. 390.]

—— Badhami. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 80. p. 270. (Fruct., Curr.).

—— Balsamiana. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 7. (Notar.). — Ital. 649.

—— barbara Fr. S. — [S. 401. cin.] — cf. Ostropa cinerea Not. — (Platysto.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 63. (Fruct., Curr.). — Voges. 966.

—— barbata P. — Bisch. f. 3561.

—— Barbierii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 11. (Wstd.).

—— barbula (Caespitos.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 20. (B. B.).

—— bellula. — Dsm. 774. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 4.

—— Bellynckii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 13. (Wstd.).

—— Berberidis P. — [S. 395.] — Bisch. f. 3571. (Gibberidia) P.: Kl. 155; — it. Cent. XIX. — Fuck. s. 632. — (Caespitos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 177. (Fruct., Curr.). — Voges. 874. — Wstd. 1203.

—— Berengeriana (Botryosph.). — Ital. no? — (Diatry.) Not. Sfer. 26. p. 27. — (Botryosph.) Not. Sfer. 90.

—— Berkeleyi. — Dsm. 1419. — Wstd. 912.

—— Betulae Schum. = S. lanciformis Fl. dan.

—— —— nanae. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 3.

—— Betuli. = Valsa Carpini Fr. — R. f. 322. — Dsm. 966. — Wstd. 1206.

—— betuligna Chev. — cf. S. favacea.

—— bicolor DC. — Wstd. 903.

—— biconica (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 142. p. 279. (Fruct., Curr.).

—— biformis P. — [S. 389.] — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 8. b. (Berk.). — (Denudat.) S. non Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 41. (Fruct., Curr.).

—— —— v. terrestris. — Kl. 668.


—— bifrons. — [S. 421. 1.] = Hypospila populina Fr. Su. — (Confert.) S. K.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 204. (Curr.). — Bivona t. 3. f. 3. — Wstd. 527. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 15.

—— biturbinata. — Alger. t. 26, 7.

—— blepharodes B. B. (Subtect.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 31. p. 454

—— bolbitia. — [S. 390.]

Sphaeria Bombarda Batsch. — Bisch. f. 3527. — Fuck. s. 558. — Berk. Out. t. 24. f. 5. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 5. (Mont.). — (Denudat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 29. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 268. — Ital. 876. (Bertia).
—— botryosa Fr. — [S. 389.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 46. (Fruct., Curr.).
—— Brachycladii Lacr. = S. Papaveris Tul. Sel. I. 43. u. 223; pellita Kl., Wstd., Walls. — Dsm. III. 786. — Kl. 1246; II. 719. — Voges. 1456.
—— brachytele (Pertusae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 24. (B. B.).
—— Brassicae. — [S. 391. 87.] — Kl. 550. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 23. (Fruct., Curr.). — (Foliic.) Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 42. (Fruct., B. B.).
—— Braunii. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 2. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 2. (R. Ludwig).
—— brevirostris Fr. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2010. 1. — (Ceratost.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 68. (Fruct., Curr.).
—— brunneola Fr. — [S. 425.] — Dsm. 286. — Kl. 662. — Voges. 1253. 970. — Brit. f. 38.
—— bryophila. — Dsm. 1758.
—— bufonia (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 13. p. 323. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 102. (Fruct., Curr.).
—— bulbosa P. — Bisch. f. 3484.
—— bullata. — Voges. 866. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 2. (Notar.). — cf. Diatrype. — Dsm. 961. — Bisch. f. 3501. — Kl. 719. — Wstd. 68.
—— Buxi (Diplodia) DC. — [S. 417. 419, 8.] — Dsm. 780. — Kl. 549. — (Caesp. B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 186. (Fruct., Curr.). — (Dothid.) Carol. I. 73. — Wstd. 26. — R. f. 531.
—— byssiseda Tode. — [S. 388.] — Bisch. f. 3597. — Kl. 1043. 1237.
—— caelata. — [S. 409: Lév.]
—— caesia. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 17. (Fruct., Curr.).
—— caespitosa T. — [S. 399 ***.] — cf. Cenang. Aucup. u. Cytispora Aucup.
—— callicarpa (Pertus.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 62. p. 321. (Fruct., Curr.).
—— callimorpha Mont. — Wstd. 1110.
—— callista. — Carol. V. 67.
—— Callunae (Sphaerella). — Not. Sfer. 100.
—— calostroma. — Dsm. III. 368.
—— calva Tode. — [S. 389.] — Bisch. f. 3574.
—— calvescens (Diplodia) Fr. — [S. 394.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 134. (Fruct., Curr.).
—— calvula. — Wstd. 367. — Wahlenb. Fl. lappon. 1812. t. 30. f. 4.
—— Calycanthi (Conflu.) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 195. (Curr.).
—— Calyculus. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 2. (Mont.).
—— Campanulae DC. — Kl. 670.
—— campylospora. — [S. 386.] (Melogr.)
—— cancellata Td. — Wstd. 473.
—— candida. — [S. 399 *.]
—— canescens P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3593. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 14. (Curr.). — Brit. f. 301.
—— capillata Ns. — Bisch. f. 3575. — Schnzl. t. 15. f. 34.
—— capillifera (Villos.). — Linn. Tr. 1859. XXII t. 57. f. 26. p. 317. (Fruct., Curr.).
—— capistraria (Valsa). — Not. Sfer. 40. p. 36.
—— capitata. — [S. 392.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 10. (Fruct., Curr.) cf. Cordyceps. — Voges. 763. — Wstd. 21.
Sphaeria capitellata Kl. — Kl. 161. — Fuck. s. 576. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 1—22. p. 377. (Evolut., Sollmann).
—— capnodes B. (Diatry.). — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 73. (Fruct., Curr.).
—— Capreae. — Lib. 245. — Kl. 1740.
—— Caprifoliorum. — Dsm. 794.
—— caprina Fr. — Fl. dan. XI. 1859. 2.
—— Carduorum. — [S. 393 *.] — Dsm. 784. — Kl. 1560.
—— —— Wllr. — cf. S. acuminata (B. B.). — Wstd. 325.
—— Caricae (Diatry.). — Not. Sfer. 28. p. 28.
—— Cariceti (Foliicol.) B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 35. p. 455.
—— caricina. — cf. Neottiosp. car.
—— Caricis. — Dsm. 1757. — R. f. 535.
—— carnea (Nectr.). — Dsm. III. 373.
—— carneo-alba. — Lib. 241. — cf. Oomyces c.
—— carpinea (Foliicol.) Fr. — [S. 425.] — Dsm. 281. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 41. (Fruct., B. B.). — Wstd. 275. — cf. Ascospora.
—— Carpini. — [S. 397.] — Kl. 158. — cf. Valsa: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 118. (Fruct., Curr.).
—— —— Hoffm. — cf. S. fimbriata Not.
—— —— Fr.: R. f. 322. — Wstd. 467. 1206.
—— carpophila P. — Brit. f. 76. — Fl. dan. XI. 1858. 1. — cf. Xylaria, Hypoxylon. — Linn. 1843. XVII. t. 15. (Schmitz). — Dsm. 260. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 23. (Fruct., Curr.). — Voges. 1245. — Wstd. 114.
—— Castagnei. — Dsm. 1768.
—— Castaneae Schum. — Fl. dan. XIII. 2333. 3.
—— castorea Td. — Wstd. 219.
—— caudata Schum. — Fl. dan. XII. 2155. 2.
—— —— (Denudat.) Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 50.
—— caulifraga. — [S. 391.]
—— caulincola. — Voges. 1452. — Wstd. 221.
—— —— Wllr. = modesta Dsm. (ex Wstd.).
—— caulium Fr. — [S. 391.] — Fuck. s. 591. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. f. 2. a. p. 116. — (Lophiostoma). — Not. Sfer. 70.
—— cellulata Fr. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 120. (Curr.).
—— Celtidis. — Carol. IV. 59.
—— cenisia (Valsa). — Not. Sfer. 44. p. 38.
—— cenobitica (Valsa). — Not. Sfer. 41. p. 37.
—— Cerasi Schum. — Fl. dan. XII. 2153. 1.
—— Cerasorum (Obtect.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 80. p. 323. (Fructif.).
—— —— Fr. — [S. 393.]
—— cerastis. — Hdw. I. t. 3. f. 2. m—o. — Kl. 1711. — R. f. 337. (petiolor.).
—— ceratosperma Tode. — Bisch. f. 3500. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 93. (Fruct., Curr.). — Voges. 567. — Lib. 38. — Wstd. 67.
—— ceriospora (Subtectae). — Kl. 1937.
—— cerviculata (Valsa). — Not. Sfer. 33.
—— Cesatii Mont. — Not. Sfer. 5. (Nectria).
—— ceuthocarpa (Confert.) Fr. — [S. 421.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 213. (Fruct., Curr.). — Dsm. 270. — Wstd. 534. — cf. Hypospila populina.
—— ceuthocarpoides. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 1.
—— ceuthosporoides Berk. — Dsm. 1413. — Wstd. 1116. 1211. (Berber., Ilicis).



— Conglomerata Wallr. Fl. crypt. p. 814.

Sphaeria Chaetomium (villosa) Cd. — [S. 405. 7. pus.] — Dsm. 1759. — Lib. 341. (Sphaeria comata Tode?, Chaetomium elat. auct.?). — Ann. Mg n. h. 1852. IX. t. 9. f. 3. p. 319. (B. B.).
—— Chamaemori. — [S. 394.]
—— chionea. — [S. 377.] — Kops, Fl. bat. XI. 855. 3. — Kl. 361. — (Ceratost.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 22. (Fruct., Curr.).
—— chlorospora Ces — R. f. 48. — Ital. 296. — (Sphaerella) Not. Sfer. 97.
—— chondrospora. — Hdw. I. t. 11. f. II. — Kl. 1932. b.
—— chrysentera Curr. (Conflu.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 198. a. p. 281. (Fruct.).
—— chrysites. — [S. 387. 1.] — Wstd. 365.
—— chrysostroma (Valsa) M. — Linn. Tr 1859. XXII. t. 48. f. 160. (Fruct., Curr.).
—— Cibostii. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 8. (Notar.).
—— Cicutae. — Kl. 1848.
—— ciliaris Curr. —. Journ. microsc. Soc. 1859. VII. p. 231. t. 11. f. 15.
—— ciliata P. — Bisch. f. 3534. (cf. Valsa).
—— cilicifera. — [S. 391.]
—— cincta Curr. (Incus.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 135. p. 277. (Fruct.).
—— cinereo-fusca = multiformis Fl. dan. — Wstd. 713.
—— cinereo-nebulosa. — Dsm. III. 370.
—— cingulata. — Ann. sc. n. 1831. I. t. 12. (Mont.).
—— cinnabarina Td. — Dsm. 970. — Bisch. f. 3510. — Schnzl. t. 15. f. 29. 30. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 175. (Fruct., Curr.). — Kl. 156; Cent. XV, Suppl. — Voges. 570 (decolorans). — Wstd. 364.
—— circinans. — [S. 395. 421, 3.] — cf. Coniosporium c. Fr.
—— circinata. — [S. 405.]
—— circumclusa. — Not. Sfer. 63.
—— circumscissa P. — [S. 397.] — Fl. dan. XII. 2010. 2.
—— circumscripta. — [S. 414*.] — Kl. 811. — (Valsa) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 132. (Fruct., Curr.).
—— cirrhata Sow. — Wstd. 323.
—— cirrhosa P. — [S. 392.] — Fuck. s. 620. — (Ceratost.) Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 71. (u. 72.?) p. 322. (Fruct.).
—— citrina. — Lib. 311. — Kl. 1841. — (Hypocrea) P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 51. (Fruct., Curr.). — (Hypocr.) Not. Sfer. f. 2.
—— citrino-aurantia (Nectr.). — Dsm. III. 778.
—— Citrum Wllr. = Nectria citrina Fr.
—— clandestina. — [S. 410.]
—— clara (Seriat.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 203. p. 285.
—— clausa Schum. — Fl. dan. XIII. 2335. 2. = circumscissa Fl. dan.
—— clavaeformis. — [S. 395.]
—— Clavariae Dsm. — R. f. 252.
—— clavata Sow. — cf. Cordyceps alutacea.
—— Clavus. — [S. 409.]
—— clivensis (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 379. t. 11. f. 29. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 135. (Fruct., Curr.).
—— clivulosa. — Ann. sc. n. 1855. III t. 6. f. 4. (Mont.).
—— clypeata Ns. — [S. 417. 423. 3.] — cf. Diplodia. — (Sordaria) Not. non alior.: Not. Sfer. 22. p. 24.

Sphaeria clypeata Moug.: R. f. 331. (clypeiformis Lacr.).
—— —— Ns.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 83. (Fruct., Curr.). — Voges. 1448.
—— clypeiformis. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 8. (Notar.). — Kl. II. 645. — R. f. 331 (Sph. appendiculosa B. B.).
—— coarctata Schum. — Fl. dan. XII. 2153. 2.
—— coccinea. — Lib. 242. — Fl. dan. XII. 2100. 2. — (Nectria): Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 173. 174. (Fruct., Curr.). — Kl. 538. — Dsm. 1407; III. 777. — Voges. 180. — Letell. 649. 1. — Wstd. 366. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 10.
—— coenopus (Hypoxyl.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 11. (Fruct., Curr.).
—— cohaerens P. — (Hypoxyl.) Kl. 253. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 10. (Keimg. Hoffm.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 41. (Fruct., Curr.).
—— —— Schum. = fusca Fl. dan. — Voges. 761. — Wstd. 904. — (Hypoxyl.) Not. Sfer. 11.
—— —— var.? Fl. dan. XII. 2155. 1.
—— collabens Curr. (Denudat.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 51. (Fruct.).
—— collapsa Sow. — Wstd. 96.
—— Coluteae Rbh. — Kl. 1239.
—— comata. — [S. 405.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 328. t. 11. f. 25. a. (Fruct., B. B.). — Kl. 839. — Bisch. f. 3576.
—— —— v. capillata Fr. — Kl. 840.
—— commanipula (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 31. p. 380. (Fruct., B. B.).
—— complanata Td. — [S. 394.] — Bisch. f. 3545. — R. f. 342. (Phoma). — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 125. (Fruct., Curr.). — Voges. 82. v. minor: Brit. f. 288. — Letell. 686. 3. — Norweg. 199. — Lib. 244. (herbarum α. P.). — Wstd. 172; var. 36. 1111. — Micr. J. 1855. III. t. 12. f. 10. 11. (Curr.).
—— compressa P. — [S. 391.] — Fuck. s. 588. — Wstd. 1205.
—— compuncta. — Jungh. pr. t. 3. f. 11.
—— concamerata (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 134. (Fruct., Curr.).
—— concentrica. — [S. 384. 9.] — Fl. dan. XII. 2036. 2. — Bisch. f. 3493—3496. (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 32. (Fruct., Curr.). — Kl. 162. — Loud. f. 16360.
—— conferta. — [S. 421.]
—— confluens Td. — [S. 389.] — Bisch. f. 3596. — Fuck. s. 647. — Dsm. 959. — Kl. II. 432. — Wstd. 219. 166.
—— conformis (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 325. t. 11. f. 19. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 88. (Fruct., Curr.).
—— conglobata Fr. (Denudat.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 33. (Fruct., Curr.).
—— conglomerata. — [S. 391.] — Dsm. 1449. — Kl. 848. — Fuck. s. 598. — R. f. 150. — Wstd. 539.
—— conica. — [S. 400. 6*.]
—— coniformis. — [S. 394.] — Dsm. 983. — Kl. 1826. — Kl. II. 729. — (Caulicol.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 126. (Fruct., Curr.). — Wstd. 369.
—— conjugata. — Not. Sfer. 64.
—— conjuncta Ns. — Dsm. 758.
—— conorum. — Dsm. 1423. — Wstd. 913.
—— contecta (Depaz.). — Dsm. III. 361.
—— controversa. — [S. 411.] — Dsm. 755. — Wstd. 910.
—— convergens Td. — Bisch. f. 3557. — Pay. b.

cr. p. 8. 28, 29. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 155. (Fruct., Curr.).

Sphaeria cooperta. — Dsm. 1783.

—— coprophila (Hypoxyl.). — Hdw. I. t. 11. f. B. 2. — Sordar. Not. Sfer. 20. p. 22.

—— Corchori. — Dsm. 980. — Wstd. 512.

—— Corni. — [S. 398*.] — Fuck. Nass. f. 15. — Fuck. s. 591. — Wstd. 1108.

—— Corni suecicae. — [S. 391.]

—— cornicola DC. (Depazea, Hendersonia). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 146. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 185.

—— corniculata Ehrb. — cf. Valsa

—— corniformis. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 1. (Notar.). — (Xylaria) M.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 20. 21 ? (Fruct., Curr.). — Brit. f. 277.

—— cornu Damae. — Carol. I. 45.

—— cornuta Hoffm. — Wstd. 167.

—— coronata Hoffm. — Kl. 543. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 136. (Fruct., Curr.).

—— Coronillae. — [S. 391.] — Dsm. 779. — Wstd. 966.

—— Corrigiolae. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 1.

—— corticis. — [S. 393.] — Kl. 1336. — Wstd. 478. — Fuck. s. 578. — (Obturat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 108. (Fruct., Curr.).

—— —— Sow. — [S. 393 : 113.] — (Fraxini) Brit. f. 84.

—— Coryli. — [S. 391.] — Fl. dan. XIII. 2332. 1. — Kl. 845. — R. f. 333. — Dsm. 1412. — Voges. 877. — Lib. 141. — Wstd. 219. — Ital. 618.

—— crassicollis. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 2. (Notar.).

—— Craterium. — [S. 367.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 6. (Notar.). — Lib. 229. (Peziza Hederae Lib.). — Wstd. 15. 173. — R. f. 527. (Trochila).

—— crenata Fr. — [S. 391.] — Bisch. f. 3553. — Fuck. s. 585.

—— crenulata B. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 15. (Fruct., Curr.).

—— Crepini. — Wstd. 911. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 17. (Wstd.). — R. f. 441. (lycopodina Mont. ?).

—— crinita. — [S. 389.] — Fl. dan. XIII. 2334. 2. — Kl. 1242. — Wstd. 70. (hirsuta P., ex Dsm.).

—— cristata (Platyst.) P. (crenata Fr.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 67. (Fruct., Curr.).

—— —— v. fallax Fr. — R. f. 252.

—— Cruciferarum Fr. — [S. 422.] — Dsm. 285. — Wstd. 1115.

—— cruenta Kz. — Wstd. 649. (Depaz.).

—— crustacea Sow. = serpens Fl. dan.

—— crustata. — [S. 396.] — ? Hdw. I. t. 11. f. E.

—— crypta. — [S. 396.]

—— cryptoderis. — Dsm. III. 366.

—— Cryptosporii. — Microsc. Journ. IV. t. 12. f. 12—14. (Curr.).

—— cryptostoma. — Ann. sc. n. 1843. XIX. t. 7. f. 10. (Lév.).

—— cubicularis Fr. (Halonia). — [S. 397.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 76. (Fruct., Curr.). — Lib. 338.

—— cucurbitula Td. — Bisch. f. 3507. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 178. p. 282. (Fruct., Curr.). — Kl. 968. — ? Voges. 1455. — Wstd. 328. (v. nigrescens).

—— culcitella. — Carol. IV. 53.

—— culmicola. — [S. 393.]

Sphaeria culmifraga Fr. — [S. 391. 420.] — Dsm. 786. 1427. — Kl. 964; 1339. — Fuck. s. 567.

—— culmorum Wllr. — Wstd. 373.

—— cupressiformis Wood. — Wstd. 368.

—— cupularis P. — [S. 391. 399***.] — Fl. dan. XII. 2159. 2. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 1. (Mont.). — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 170. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 780. — ? Voges. 1155. 771. — Wstd. 528.

—— Curreyi. — R. f. 250. (apiculata Curr.).

—— curta. — [S. 391.]

—— curvirostra. — [S. 393.] — Letell. 686, 1.

—— cuspidata. — [S. 392.]

—— cyanogena. — Dsm. 1760. — Kl. II. 641. — Wstd. 406.

—— cyathoidea P. — Wstd. 75.

—— cytisporea. — [S. 393.]

—— Daldiniana (Nectria). — Not. Sfer. 7.

—— decedens Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 580.

—— decidua Td. — Wstd. 366.

—— decipiens Fr. — R. f. 144. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 8. (Wstd.). — (Diatry.) DC.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 196. (Fruct., Curr.).

—— decolorans (Nectria) P. — Wstd. 364. 366. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 176. (Fruct., Curr.).

—— —— Schum. = coccinea Fl. dan. — Voges. 570. (cinnab. Td.).

—— decorticans. — Wstd. 529. — cf. Valsa.

—— —— Sow. = S. Stigma Fl. dan. — Voges. 768. (Penic.); 373 (v. zu Stigma). — Wstd. 112.

—— decorticata. — Loud. f. 16368. — Wstd. 529.

—— defossa. — Alger. t. 26. 5.

—— dehiscens P. — Wstd. 909.

—— delitescens. — [S. 419. 8.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 9. (Notar.). — Kl. 1039.

—— Delphinii Rbh. — Kl. 747.

—— Dematium P. — [S. 420.] — Kl. 154. — cf. Vermicularia. — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 123. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 181. — Wstd. 578.

—— dendroides. — Carol. II. 61.

—— denigrans Curr. — (Diatry. s. Valsa). Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 78. p. 270. (Fruct.).

—— depazeaeformis. — Kl. 1641.

—— depazeoides. — [S. 395.]

—— depilata. — [S. 389.]

—— deplanata. — [S. 394.] — Kl. 1737. (cf. Valsa).

—— depressa. — Wstd. 68. — Diatrype bullata, R. f. 536.

—— Desmazieri. — Dsm. III. 369. — (Nectr.) = coccinea v. cicatric. Dsm., Not. Sfer. 4.

—— deusta Whlb. — Wstd. 713. — Carol. V. 70.

—— devexa. — Dsm. III. 367.

—— Dianthi. — [S. 426.] — Ital. 647. — (Depaz.) Brit. f. 187. — Wstd. 293. 646. 954. — (Cucurbit.) Not. Sfer. 59. — (Pleospora) Not. Sfer. 80. — (Venturia) Not. Sfer. 82.

—— dichroa. — Alger. t. 26, 6.

—— digitata Bolt. — Wstd. 167.

—— diminuens. — [S. 391.] — Wstd. 1205.

—— dioica. — [S. 391.]

—— diplasia. — Alger. t. 27, 8.

—— disciformis. — [S. 384*. 419**.] — Brit. f. 172. — Voges. 80. — Carol. I. 48. — Norweg. 195. — (Diatry.) Wstd. 1106. (grisea).

—— discreta. — Carol. II. 57. (Diatry.).

—— dispersa (Botryosph.) Not. Sfer. 92.

—— dissepta Fr. — Wstd. 910.

Sphaeria Cooperta Desm. 17e not. N° 44. – Sphaerella
Ces. et De Not. Schema pag. 63. –

Syn. = Svalonia ditopa Fries Summ. V. Sc. p. 397.

Sphaeria ditopa. — [S. 397.] — Voges. 1248. — Wstd. 477.
—— ditricha. — [S. 420.]
—— dolabriformis (Lophiostoma). — Not. Sfer. 69.
—— Doliolum. — [S. 391 **. 394.] — Voges. 571. — Letell. 686, 4.
—— —— conoidea. — Ital. 879.
—— dolosa. — [S. 392.] — et β. Massarae (Valsaria) Not. Sfer. 54.
—— Dothidea b. Rosae. — Voges. 971. — Brit. f. 32.
—— dryina. — [S. 392.]
—— dubia P. — Cenang. Ceras. Fr.
—— Dulcamarae. — [S. 391.]
—— duplex. — [S. 394.] — Voges. 1081. Nardi). Wstd. 1214.
—— Duriaei. — Alger. t. 25, 7.
—— Echinus. — Bivona t. 4. f. 1.
—— ectypa. — [S. 392.]
—— elliptica. — Loud. f. 16373. — (Stromatosph.) Grev.: Wstd. 713.
—— elongata. — [S. 391.] — Voges. 875. — Carol. III. 56. — Letell. 692, 3. (scabra S.). — Wstd. 715. — (Cucurbit.) Not. Sfer. 56.
—— emperigonica. — Auerswald, Bot. Unterhaltg. 1863. S. 379. — (Lizonia) Not. Sfer. 77.
—— Empetri. — [S. 417.]
—— endochlora. — [S. 389.]
—— entomorhiza. — [S. 381. 5.] — Wstd. 1201.
—— epidermidis. — [S. 390.] — Wstd. 374.
—— epimyces. — [S. 408.]
—— episphaeria. — cf. sanguinea.
—— equina. — [S. 389.]
—— Equiseti. — [S. 397.] Halon. — Wstd. 632.
—— Eres (Villosae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 4. p. 320. (B. B.).
—— Ericae. — [S. 391.]
—— errabunda Rob. — Dsm. 1441.
—— erubescens Rob. — Dsm. 1416.
—— eructans W. — Fuck. s. 574.
—— Eryngii. — Voges. 1082. — Dsm. 800. — Kl. 1639. — Fuck. s. 525. — Wstd. 118.
—— erysiphina. — Journ. hort. Soc. 1854. IX. p. 68. f. 8. (Berk.).
—— erythropyrenia. — [S. 397.]
—— erythrospora. — Kl. 1827.
—— erythrostoma P. — Fuck. s. 523.
—— escharoidea. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 19. p. 385. (Berk.). — [S. 386 *.] Melogr.
—— eucrypta (Foliicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 40. (Fruct., B. B.). — R. f. 49.
—— eumorpha. — [S. 389.]
—— eunomia Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 579.
—— euomphala. — Carol. IV. 54.
—— Euphorbiae. — Fuck. Nass. f. 23. — Fuck. s. 549.
—— eustoma. — [S. 395.]
—— eutypa (Obtect.). Fr. — Voges. 967. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 73. (Curr.). — Brit. f. 178.
—— Evonymi Kz. — Voges. 1450. — Kl. 756. — Fuck. s. 602. — Dsm. 797. — Wstd. 930.
—— examinans. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 172. (Fruct., Curr.).
—— excipuliformis Fr. S. (Platystom.). — [S. 391.] — Dsm. 1763. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 26 *. (B. B.). — Kl. 962. — Voges. 1164.
—— exosporioides Dsm. — R. f. 140. — Dsm. 769.
—— extensa (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 116. (Fruct., Curr.).

Sphaeria fagicola. — [S. 395.]
—— faginea (Valsa) Fr. — [S. 417.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 168. (Fruct., Curr.). — Wstd. 907.
—— fallax Whlb. — [S. 362. 6.] — Kl. 1960. — (Amphisphaeria) Not. Sfer. 72.
—— farcta (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 15. p. 324. (Fruct., B. B.).
—— fasciculata (Bombardia). — [S. 389.] — Kl. 1939.
—— favacea. — ? Kl. 1323. — cf. Diatrype. — Dsm. 1751. — Brit. f. 77. — Norweg. 92. — (Diatrypella) Not. Sfer. 30.
—— fenestrans (Caulicol.). — Kl. 1933. — Wstd. 1208.
—— ferruginea P. — Dsm. 1753. — Kl. 542. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 91. (Fruct., Curr.). — Voges. 377. 179. (cf. quaternata). — Letell. 703, 3. — Wstd. 218. 915. — (Melogr.) Not. Sfer. 52.
—— Festucae. — Lib. 246. — Wstd. 1220.
—— fibritecta. — Hook. J. 1853. V. t. 3. f. 14.
—— fibrosa (Concresc.). P. — Brit. f. 30. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 98. (Fruct., Curr.).
—— filicina Fr. — S. Pteridis Kz., rimosa b. A. S. — Dsm. 266. — Brit. f. 33. — Lib. 243. (Pteridis Sow.).
—— Filicum Dsm. — Kl. 1034. — Kl. II. 534. — Fuck. s. 531. — Dsm. 283.
—— filiformis A. S. — Bisch. f. 3490. — Carol. II. 55. (Xylar.).
—— Filum. — Bivona t. 3. f. 1. C. D. E. — cf. Ascochyta Convolvuli.
—— fimbriata P. — [S. 391.] — Bisch. f. 3562. — Krypt. Bad. 427. — Lib. 40. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 1. (Notar.). — Kl. 53. — Kl. II. 542. — Fuck. s. 601. — Dsm. 269. — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 212. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 36. — Wstd. 467. — Schweiz. 15.
—— —— Carpini. — Voges. 277.
—— fimetaria. — Kl. 1733. — cf. Sporormia.
—— fimeti. — [S. 397. 418 **.] — Hdw. I. t. 14. f. B. 1. — (Hypocopria; Massaria Berk.). — Fuck. s. 514. = S. stercoris DC. — [S. 397. Hypocopr.]
—— —— v. equina (Concresc.) P.: Linn. Tr. XXII. t. 47. f. 102. (Fruct., Curr.).
—— fimicola. — Dsm. 1761.
—— fissa. — [S. 402.]
—— flabelliformis. — Carol. II. 56. (Xylar.).
—— flacca W. — Fuck. s. 633.
—— flaccida A. S. — Kl. 551. — Voges. 1080. Wstd. 484.
—— flavescens. — [S. 388.]
—— flavovirens P. — Kl. 1243; 1643. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 65. (Fruct., Curr.). — Voges. 375. — Wstd. 112.
—— floccosa. — [S. 393.]
—— floriformis. — [S. 385. leiopl.]
—— foeda (Amphisph.). — Not. Sfer. 75.
—— foedans Fr. — [S. 396.] cf. S. amblyospora.
—— foraminosa. — Voges. 774 (lanciformis Fr.).
—— foraminula P. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 127. (Fruct., Curr.).
—— foveolaris Fr. [S. 419.] cf. Sphaeropsis.
—— Fragariae Lasch. — Kl. 1250.
—— fragariaecola Wllr. — Wstd. 175.
—— fragiformis P. — Wstd. 364. — Dsm. 957. — Voges. 273. — Wstd. 903. — Kl. 165. — Fl. dan. XII. 2149. 2. — Hypoxylon coccineum

Bull. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 30. (Fruct., Curr.). — Loud. f. 16366.

Sphaeria fragiformis v. radians Fr. — Fl. dan. XII. 2157. 2.

—— fraxinea Sow. — S. concentrica Fl. dan.

—— Fraxini. — [S. 417.] — Wstd. 932.

—— fraxinicola M. S. (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 118 (Fruct., Curr.).

—— fruticum Rob. — Dsm. 1770. — cf. Raphidospora Ononidis Awd. — Wstd. 1207.

—— fuliginosa P. — [S. 391.] — Kl. 1240. — Voges. 770.

—— fulva Fr. (Byssis.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 5. (Fruct., Curr.).

—— fulvo-pruinata B. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 125. (Fruct., Curr.).

—— furfuracea Fr. (Valsa). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 154. (Fruct., Curr.).

—— fusariispora. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 5. (Mont.).

—— fusca Pers. — Voges. 178. — Fl. dan. XII. 2151. 1; — XII. 2036. 3. (cf. Hypoxyl.). — Schnzl. t. 15. f. 21—25. — Bot. Zt. 1856. t. 5. f. 18. b. (Fruct., Hoffm.). — Bisch. f. 3498. — Kl. 247. — Pringsh. Jahrb. II. t. 31. f. 30. (Hoffm.). — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 38. 39. (Fruct., Curr.). — Wstd. 219. — Krypt. Bad. 151.

—— —— f. byssiseda. — Kl. 961. — Dsm, III. 779. — Carol. I. 46. — Norweg. 194.

—— fuscella (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 20. p. 325. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 103. (Fruct., Curr.).

—— fuscospora (Hypox. ?) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 58. (Curr.).

—— fusispora. — Kl. 1832. — [S. 386.] Melogr. — Ditopella) Not. Sfer. 48. p. 42.

—— futilis (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 23. p. 326. (Fruct., B. B.).

—— Gagliardi (Sordaria). — Not. Sfer. 21. p. 23.

—— galbula. — [S. 408.]

—— Galii. — [S. 391.] — Kl. 362. — Dsm. 1425. — Voges. 1171. — R. f. 538.

—— Galiorum Rob. — Dsm. 1435.

—— Gangraena Fr. — Dsm. 767. — cf. Dothidea (R. f. 350.). — Voges. 1166. — Carol. II. 59.

—— gastrina Fr. S. — Wstd. 266. = irregularis Sow. (Curr.). — Dsm. 754.

—— gelatinosa Td. — Fl. dan. X. 1782. — Fuck. s. 696. — Bisch. f. 3499. — (Hypocr.) Not. Sfer. 1.

—— genistalis. — Voges. 488.

—— geographica. — [S. 425.] — Kl. 1341. — Wstd. 265. — Fuck. s. 354. — (cf. Asteroma).

—— Geranii. — [S. 421.] — Wstd. 537.

—— gigantea. — Alger. t. 26. 3. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.). — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 206. (Fruct., Curr.).

—— gigaspora (Obtect.) Dsm. — Wstd. 1108. — Dsm. 1765. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 100. (Fruct., Curr.). — [S. 398. Saccothec. Corn.]

—— glaucina. — [S. 402.]

—— glauco-punctata Grev. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 144. (Fruct., Curr.).

—— Gleditschiae Schw. (Confluent.). — Kl. II. 41.

—— Glis (Byssised.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 1. p. 314. (Fruct.).

—— gloeospora B. C. (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 33. p. 454.

—— glomerata DC. — Wstd. 219.

Sphaeria Gnomon. — [S. 394.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 10. (Notar.). — Fuck. s. 534. — Dsm. 279.

—— —— Schum. = S. Coryli Fl. dan. — Voges. 379. — Brit. f. 38.

—— Godini Dsm. — Voges. 1217. — Sow. t. 336. (ex Berk. Out. p. 397.). — (Seriat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 202. (Fruct., Curr.). — Dsm. 974. — Wstd. 270.

—— graminicola B. (Depazea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 151. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 186.

—— Graminis P. — Lib. 143. — Bisch. f. 3591. — Dsm. 268; III. 781. — Kl. II. 647. — Fuck. s. 603. — (Confert.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 211. (Fruct., Curr.). — Voges. 876. — Wstd. 523.

—— grammodes. — [S. 391. 86.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 4. (Notar.). — Kl. 1940.

—— Granatum. — cf. Nectria.

—— granulosa. — Wstd. 713. — cf. Hypoxylon.

—— gregaria. — Lib. 145. — Wstd. 316.

—— grisea DC. — Wstd. 1106. — Kl. 539. — Sphaeria housed disciformis var. (Wstd.).

—— Grossulariae. — [S. 394.] — Kl. 1563.

—— Gunnii (Cordyc.) B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 1. 2. (Fruct., Curr.).

—— guyanensis (Xylar.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 9. (Fruct., Curr.).

—— Gypsophilae Lasch. — Kl. 1050. — Fuck. s. 547.

—— gyrosa. — [S. 385*.] — Carol. I. 19.

—— haematites. — Dsm. 1774. — Wstd. 914.

—— haematorhyncha. — [S. 392.]

—— hapalocystis (Circinatae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 12. p. 317. (B. B.). — R. f. 251.

—— Hederae Sow. — [S. 417.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 5. (Notar.). — Dsm. 790. — cf. Diplodia H. — Wstd. 173.

—— hederaecola Fr. — Bisch. f. 3602. — (Depazea) Dsm. III. 362. — Wstd. 28.

—— Helenae (Caulicol.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 137. p. 331. (Fruct., Curr.).

—— helicicola. — Dsm. 1785. — Wstd. 1113.

—— helicospora B. B. — R. f. 141.

—— Heliscus (Hypoxyl. s. Poronia) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 13. (Fruct., Curr.).

—— Hellebori Chaill. — ? Dothidea Prostii Dsm. (Wstd.).

—— helminthospora. — Kl. 1735. — Ital. 651. — (Leptosph.) Not. Sfer. 88.

—— hemitapha (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 30. (B. B.).

—— herbarum P. — [S. 394.] — Dsm. III. 363. — Voges. 81. — Letell. 649. 4. — Wstd. 271. 172; 717 (Allii), 1112 (Aspar. Eryng. tecta), 1213 (Dianthi). — Micr. J. 1855. III. t. 12. f. 1—9. (Currey). — Fl. dan. XII. 2158. 2.

—— —— Fr.: Dsm. 278. 1429—1433. 1772. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 4. (Notar.). — Schnzl. t. 15. f. 43. — (Diplodia) P.: Kl. 52. (cf. Pleospora). — Kl. 1564. — Microsc. Journ. IV. t. 11. f. 32. (Curr.). — Kl. II. 545—547.

—— —— Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 138. (Fruct., Curr.).

—— —— Fr.: Mesascium Stockii Berk. (Wstd.).

—— —— v. Anethi. — Kl. II. 547. d.

—— —— v. Brassicae. — Kl. II. 547. b.

—— —— v. Euphrasiae. — R. f. 258.

—— —— v. Fabae. — Kl. II. 547. c.

—— —— v. Hyoscyami. — Kl. II. 544.



— Intermixta Cast. Cat. Pl. mars. p. 168. —

Diplodia juglandis Fr. S. V. Sc. p. 417.

Sphaeria herbarum v. minor. — Brit. f. 267.
—— —— f. spermogonifera! — Kl. II. 516.
—— Herculea Schw. — Cauloglossum transversarium, Carol.
—— herpotricha. — [S. 393. 377.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 8. (Notar.). — Fuck. s. 617. — Dsm. 783; III. 790. — Kl. II. 652. — Voges. 1147.
—— herpotrichoides (Leptosphaeria). — Not. Sfer. 87.
—— heterospora (Pleospora). — Not. Sfer. 81; 65.
—— heterostoma. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.).
—— hians Wllr. — [S. 422. 3.] — Labrella Pomi Mont.
—— hiascens. — [S. 392.]
—— Hibisci. — Carol. I. 60.
—— Himantiae P. — Kl. 746. — Fuck. s. 358. (Asteroma).
—— Hippophaës. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 23. p. 378. (Sollmann).
—— hirsuta. — [S. 389.] — Loud. f. 16157. — Fuck. s. 613. — Dsm. 1114. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 18. (Fruct., Curr.). — Alger. t. 27, 1. (Spor.). — Wstd. 70. — (Lasioph.) Not. Sfer. 84.
—— hirta Fr. — [S. 393.] — Fuck. s. 609. — Wstd. 167.
—— hirtella. — [S. 395.]
—— hispida Td. — [S. 389.] — Bisch. f. 3535. — Fuck. s. 611.
—— hispidula. — Kl. 535.
—— Hoffmanni Fr. (Massar.). — Hdw. 1861. II. no. 9. t. 9. B.
—— holoschista B. B. (Subtect.). — R. f. 146. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 30. p. 351.
—— homalea. — [S. 386.] — Melogr.
—— Hügelii. — Cd. Ic. IV. t. 9. f. 129. = Sphaeria Robertsii. — Cd. Anl. t. F. f. 56: 21. (Cordyceps).
—— hyalina S. (Hypocr.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 49. (Fruct., Curr.).
—— hyalospora. — Hdw. 1859. II. t. 2. f. 11. (Ces.).
—— hydrophora Sow. — Loud. f. 16436.
—— hyetospilus Mart. — Wstd. 637.
—— Hyperici. — Carol. I. 59.
—— hypodermia Fr. (Valsa). — Brit. f. 81. — R. f. 320. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 156. (Fruct., Curr.).
—— hypotephra (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 7. p. 321. (Fruct., B. B.).
—— hypoxyloides (Diatry.). — Not. Sfer. 24. p. 26.
—— Hypoxylon. — Voges. 272. — Kops Fl. bat. VII. 510. — Bisch. f. 3189. — (Xylaria) Kl. 251. — Müller, Pflanzenstaat. 270. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 17. (Fruct., Curr.). — cf. Rhizomorpha subc., Hypox. vulg. — Carol. I. 44. — Wstd. 167. 368: v. cupressiformis.
—— hysteriformis Schum. — Fl. dan. XII. 2156. 2.
—— hysterina. — [S. 402. Di. fiss.]
—— Hystrix Td. — Voges. 959. — Bisch. f. 3502. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 92. (Fruct., Curr.). — (Mamiania) Not. Sfer. 50. p. 43.
—— janthino-velutina (Xylar.) M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 22. (Fruct., Curr.).
—— icterodes. — Hdw. I. t. 3. f. 2. (i—l). — Kl. 1739.
—— ? idaea Rob. — Dsm. 1446.
Sphaeria Jenynsii (Pertus.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 22. (B. B.).
—— Jerdoni B. B. (Platystomae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 28. p. 453.
—— ignavis (Cucurbit.). — Not. Sfer. 58.
—— Ilicis Fr. — [S. 417. 367,3.] — (Diplod.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 117. (Fruct., Curr.). — Carol. IV. 63. — Wstd. 273.
—— immersa. — Loud. f. 16376.
—— impressa. — [S. 423.]
—— inaequalis (Diatry.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 79. p. 270.
—— incarcerata. — Dsm. 1421.
—— inclinata. — Dsm. 1781.
—— inclusa Lasch. — Kl. 661.
—— inconspicua. — Dsm. 770.
—— incrustans. — [S. 389.]
—— incurva Schum. — Fl. dan. XIII. 2332. 3.
—— Innesii (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 166. p. 281.
—— inquilina. — [S. 393.] — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 3. (Notar.). — (Obtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 92. (Fruct., Curr.). — Dsm. 1766; III. 785.
—— inquinans. — [S. 396.] — Berk. In. p. 281. f. 65. c. — Fres. t. 7. f. 31. (Massaria). — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 10. u. t. 10. f. 2. — Kl. 511. — (Obtectae) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 101. (Fruct., Curr.). — Norweg. 200. — Wstd. 371.
—— insidens S.? (Conflu.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 193. (Fruct., Curr.).
—— insidiosa. — Dsm. 785. — Ann. sc. n. 1841. XV. t. 14. (Dsm.).
—— insitiva. — Hdw. I. t. 15. f. 8. — Bisch. f. 3523. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 1. (Notar.). — Auerswald, Bot. Unterhaltg. 1863. p. 391. f. 132. (Fruct.).
—— inspersa (Obturat.) Sz. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 112. (Curr.). — (Denudat.) B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 27. (Fruct., Curr.).
—— insularis W. — Fuck. s. 597. — (Diatry.?) B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 210. (Fruct., Curr.).
—— intermedia. — [S. 399*.]
—— intermixta (Subtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 327. t. 11. f. 24. (Fruct., B. B.).
—— interpungens. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 3.
—— interrupta. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.).
—— intexta (Valsa?) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 169. p. 279. (Fruct.).
—— inverecunda. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 7. (Notar.).
—— inversa. — [S. 391.]
—— involuta (Xylar.) Kl. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 8. (Fruct., Curr.).
—— irregularis (Diatry.) Sow. — gastrina Fr. S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 96. (Fruct., Curr.). — Wstd. 266. 472.
—— isariphora. — Dsm. 791. — Voges. 1453. — Wstd. 174.
—— ischnostyla. — Dsm. 1784. — Kl. 1834. — Fuck. s. 537. (petioli).
—— ischnotheca. — Dsm. 1798.
—— isiaca Ces. — Kl. II. 40.
—— juglandicola S. (Diplodia?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 121. (Fruct., Curr.).
—— juglandina (Botryosph.). — Not. Sfer. 89.
—— Juglandis (Obturat.) Fr. — [S. 417.] — Linn.

Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 110. 111. (Fruct., Curr.). — Kl. 1824.
Sphaeria Juglandis DC. (non Fr.). — Kl. II. 638. — (Valsa) S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 145. (Fruct., Curr.).
—— Junci (Seriat.) Fr. — Voges. 964. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 199. (Fruct., Curr.). — Kl. 666. — Fuck. s. 601. (Dothid.). — Dsm. 972. — Brit. f. 35. — Wstd. 220.
—— juncina. — Carol. V. 71.
—— Juniperi. — [S. 385. 22.] — Kl. 1833.
—— Kerriae. — Wstd. 542.
—— Ketmiae (Concresc.). — Kl. 1938.
—— Kretschmari Rbh. — Kl. 574.
—— Kunkleri. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 6.
—— Kunzei (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 133. (Curr.).
—— labiata. — Wstd. 713.
—— Laburni P. — [S. 390.] — Kl. 960. — Fuck. s. 639. — Dsm. 40. — (Cucurbitar.) Kl. II. 42. — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 179. (Fruct., Curr.). — Voges. 873. — Letell. 619. 2. — Wstd. 363. — Ital. 875.
—— lactea (Hypocrea) Fr. — Kl. 351. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 3.
—— Lactifluorum. — Carol. I. 54.
—— laevata. — [S. 390.]
—— laevis Sow. — Loud. f. 16429.
—— lagenaria. — Hdw. I. t. 15. f. 2. — (Ceratostoma P.: Kl. 967.
—— lageniformis. — Bot. Zt. 1862. t. 12. f. 24. p. 380. (Sollmann).
—— lampadophora. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 28. (B. B.). — R. f. 139.
—— lamprotheca. — Dsm. 1779. — cf. Dothidea populina Wstd.
—— Lamyi. — Dsm. 39. (Nectria). — Not. Sfer. 9.
—— lanata. — [S. 393.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 9. (Notar.).
—— lanciformis Fr. — Dsm. 1401. — Fl. dan. XII. 2156. 1. — Bisch. f. 3513. — Kl. 1323. — (Diatry. Fr. non Kl. 1323. an Sphaeria favacea?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 91. (Fruct., Curr.). — Voges. 774. (foraminosa). — Letell. 703. 2. (Betulae). — (Pseudovalsa) Not. Sfer. 53.
—— Landeghemiae. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 5. (Wstd.).
—— larvata. — [S. 389.]
—— lasioderma. — Alger. t. 27. 5.
—— lata. — Voges. 568. — Kl. 1565. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 110. (Fruct., Curr.).
—— —— polycocca Fr. — Bisch. f. 3505.
—— lateritia (Hypocrea) Fr. — Kl. 254. — R. f. 317. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 47. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 776. — Voges. 1334.
—— Laurocerasi. — Dsm. 782. — Wstd. 74. — Sphaeropsis epiphylla Lév.
—— Lebiseyi. — Voges. 1254. — Dsm. 773.
—— lecanodes (Nectria) Ces. — Kl. II. 525.
—— Lecythea Schw. (Diplod.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 55. (Fruct., Curr.).
—— Legum. — cf. Pleospora. — Kl. II. 548.
—— —— Wllr.: Wstd. 72.
—— Leguminis.
—— —— Cytisi. — Dsm. 792. — Wstd. 72. (Diplodia Lév.).
—— Leightoni (Foliicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 12. f. 43. p. 385. (Fruct., B. B.).
—— leioplaca Fr. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 101. (Fruct., Curr.).

Sphaeria leiphaemia Fr. — Voges. 961; u. 868. (= leiphaem. Fr., ex Tul.). — Kl. 1326. (= Cytispora l.). — Dsm. 756. — (Valsa) Fr. (= taleola?) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 137. (Fruct., Curr.). — Ital. 874.
—— lenta Td. — Bisch. f. 3514. — (Hypocrea) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 83. (Fruct., Curr.).
—— leprosa Fr. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 87. (Fruct., Curr.). — Dsm. 753.
—— leptidea Fr. — [S. 395.] — Kl. 1048. — Fuck. s. 522.
—— leptospora (Cucurbit.). — Not. Sfer. 61.
—— leptostyla Fr. — Kl. 1821. — Kl. II. 638. — Fuck. s. 538.
—— leucocephala P. — Wstd. 15.
—— leucoplaca. — Carol. IV. 61.
—— leucosticta DC. — Wstd. 173.
—— leucostoma. — Brit. f. 31. — Voges. 659. (pustul.). — Letell. 692. 2. — (Valsa) Not. Sfer. 38.
—— —— polypora Fr. — Bisch. f. 3521. — Wstd. 908.
—— lichenoides. — cf. Spilosphaeria (Chelidonii). — Kl. II. 552.
—— —— v. hederaecola. — Voges. 663. — Wstd. 424 (Chelidon.); 295 (Convolv.); 26 u. 1383 (hederaecola); 649 (Convallar.).
—— lichenopsis. — Flora. 1855. t. 3. f. 6. 7. (Massal.).
—— ligneola (Ceratostom.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 29. (B. B.).
—— ligniaria (Platystom.) Gr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 66. (Fruct., Curr.).
—— Ligustri Rob. — Dsm. 796. — Wstd. 654.
—— limaeformis S. (Sphaeria). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 107. (Fruct., Curr.). — Carol. III. 58.
—— Liminghii. — Wstd. 1202. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 3. (Wstd.). — R. f. 263.
—— limitata P. — Fuck. s. 571.
—— linearis. — [S. 391.] — Kl. II. 251.
—— lineata A. S. — [S. 392.] — Bisch. f. 3591.
—— lineolata (Seriatae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 8*. p. 318. (B. B.). — Dsm. 763.
—— Lingam Td. — [S. 394.] — Bisch. f. 3563. — Voges. 1271.
—— lintearia (Aposphaeria). — Chile n. 10. f. 6.
—— Lirella. — [S. 393.] — Kl. 1332. — Brit. f. 37. — Kl. II. 538. — Fuck. s. 607. — Dsm. 982. — Voges. 668. — Lib. 42.
—— Liriodendri S. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 72. (Fruct., Curr.).
—— Lisae. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 3. (Notar.). — Kl. 1846.
—— livida Fr. (Obtect.). — [S. 392.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 77. (Fruct., Curr.). — Alger. t. 26, 5.
—— lobata S. (Hypocrea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 52. (Fruct., Curr.).
—— longissima P. — [S. 419.] — Kl. 966. a. b. — cf. Sphaeropsis.
—— Lonicerae Fr. (Obtur.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 115. (Fruct., Curr.).
—— Lonicerarum (Depaz.). — Dsm. III. 360.
—— longispora Curr. (Ceratost.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 69. p. 322. (Fruct., Curr.).
—— longissima P. — Wstd. 1139.
—— lugubris Rob. — [S. 394: 180! cf. 197.] — Dsm. 1442. — Wstd. 1219.
—— Lunariae (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1859 III. t. 11. f. 36. (B. B.).

— Pseudovalsa lanciformis Ces. et De Not. Schema p. 32. — Sfer. Ital. p. 54. Tab. 53. a et b.

— Lineolata Rob. ap. Desmaz. 10e Not. p. 17. — Berk. et Bro. not. Brit. Fung. N° 616.

Sph. Lycopodina Montg. 6e cent. n. 95. — Syllog. 860. —

Sphaeria lutea A. S.! — Bisch. f. 3511. — (Hypox.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 56. (Fruct., Curr.).
—— luteola. — Dsm. 1778.
—— luteo-virens Fr. (Hypocrea). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 53. (Fruct., Curr.).
—— Luzulae Rbh. — R. f. 533.
—— lycoperdoides Weig. — Wstd. 219.
—— lycopodina Mont. — ? = Crepini Wstd.
—— macrospora. — Dsm. 1756. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 19. (Fruct., Curr.).
—— macrostoma. — [S. 391.] — Bisch. f. 3552. — Dsm. 772. — (Platystom.) Td.: Linn. Tr. 1859. XXII. f. 58. f. 64. 65? Fruct., Curr. . — Wstd. 909. 1205 (Aceris).
—— macrostomoides. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 6. (Notar.).
—— macrotricha (Villos.). — Ann. Mg. n. h 1852. IX. t. 9. f. 2. p. 319. (B. B.). — Berk. Out. t. 1. f. 12. (Spor.).
—— maculaeformis Fr — Dsm. 1787—1792. — Fl. dan. XIII. 2335. 1. — Voges. 661.
—— —— v. Aesculi Fr. — Fl. dan. XII. 2100. 3.
—— maculans Dsm. — Wstd. 531. — R. f. 330.
—— macularis. — Voges. 969.
—— —— Fr. — [S. 395.] — Dsm. 1131. — (Picrostoma) Fuck. s. 596.
—— maculiformis (Sphaerella) P. — [S. 395.] — Kl. 1040. — Dsm. 282. — Brit f. 338. — Wstd. 538. 1212. (Castan.).
—— Malorum B. (Diplod.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 205. (Fruct., Curr.).
—— Malvae Alceae Opitz. — ? Wstd. 1232.
—— mamillana Fr. — [S. 117.] — Dsm. 775. — Kl. 1334.
—— —— Fr. S. = S. Corni Fuck. Nass. p. 72; non Diplod. mam. Fr.
—— —— Fr.: Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 6. (Wstd.). — (Henders.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 85. (Fruct., Curr.). — Voges. 1250.
—— mammaeformis P. — [S. 389.] — Fuck. s. 557. — (Denud.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 37. (Fruct., Curr.). — Voges. 380.
—— mammillaris Schum. = S. umbrina Fl. dan.
—— mammosa. — Purton. II. t. 22.
—— marginata Fr. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 60. (Fruct., Curr.).
—— —— Schw.: S. annulata Fr. — Wstd. 908.
—— Massalongii Mont. — Flora. 1855. t. 3. f. 9. (Massal.).
—— Massarae (Hypox.). — Not. Sfer. 14.
—— Massariana (Valsa). — Not. Sfer. 37.
—— mastoidea Fr. — [S. 390.] — Dsm. 771.
—— Mathieui. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 12. (Wstd.). — Wstd. 1209.
—— Maydis Bk. — Diplodia Zeae Lév.
—— mediterranea. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 2. (Notar.). — (Valsa) Not. Sfer. 43. p. 38.
—— megalospora. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 4. (Mont.). — (Conflu.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 192. (Fruct., Curr.).
—— melaena Fr. — [S. 419.] — Kl. 533. — R. f. 344. (Phoma). — Voges. 1454. — Dsm. 766. — cf. Sphaeropsis.
—— melanaspis. — Ann. sc. n. 1840. XIII. t. 10. (Mont.). — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 74. (Fruct., Curr.).
—— melanoplaca. — Dsm. 1797.
—— melanostigma Lév. — Démid. Russ. t. 5. f. 6.
—— melanostoma Bernh. — Wstd. 1331.
Sphaeria melanostyla DC. — Fuck. s. 535. — Dsm. 1438.
—— melanotes (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 6. p. 321. (Fruct., B. B.).
—— melasperma Fr. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 9. (Wstd.). — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 123. (Fruct., Curr.). — ? Letell. 703. 4.
—— melastoma Fr. — cf. Valsa.
—— melastroma Fr. — R. f. 254.
—— Meliae Fr. (Diplod.). — Carol. IV. 56. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 162. (Fruct., Curr.).
—— melina (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1859 III. t. 11. f. 33. (B. B.).
—— melogramma P. — Kl. 842. — Fuck. s. 625. — Dsm. 971. — Voges. 274. — cf. Melogramma vagans Not.
—— —— Schum. = S. rhodomela, Fl. dan. — (Confl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 191. (Fruct., Curr.).
—— Mercurialis Lasch. — Kl. 1251. — Fuck. s. 532.
—— merdaria (Pertus.) Fr. — [S. 397. Hypocopr.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 56. (Fruct., Curr.).
—— merdarum Fr. — Dsm. 1767.
—— Mesascium. — Not. Sfer. 62.
—— Micheliana. — [S. 390**.] — (Hypox.) Not. Sfer. 13.
—— Michotii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 15. (Wstd.). — Wstd. 1218.
—— micraspis. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — (Pertus.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 59. (Fruct., Curr.).
—— microceph. Wllr. — cf. Claviceps micr.
—— microceras M. (Xylar.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 18. (Fruct., Curr.).
—— microscopica. — [S. 392.]
—— microspila B. B. (Foliicol.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 36. p. 155.
—— microstoma P. — Kl. 1041. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 130. (Fruct., Curr.). — R. f 253. (Microstoma vulg. Awd.).
—— Micula Fr. — [S. 391. 82.] — Kl. II. 636. — Dsm. 776. — (Cytispora) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 70. (Fruct., Curr.). — Voges. 1075.
—— militaris Ehrh. — Bisch. f. 3483. — (Cordyceps) L.: Kl. 47. — Müller, Pflanzenstaat. 270. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 3. (Fruct., Curr.). — Purton. I. t. 23.
—— millegrana. — Carol. IV. 58.
—— millepunctata. — [S. 393.] — Lib. 41. — Wstd. 475. — (Cryptosph.) Not. Sfer. 47. p. 40.
—— milliaria Kz. — Kl. 1565. — (Diatry.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 106. (Fruct, Curr.).
—— miniata Bolt. — Wstd. 90.
—— Mirbelii. — [S. 419.] — Voges. 972.
—— mixta Schum. = ambiens, Fl. dan. — Wstd. 367.
—— mobilis Td. — Bisch. f. 3544. — Tode II. t. 9. f. 71.
—— modesta (Caulicol.) Dsm. — cf. caulincola. — Dsm. 1436. 1773. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 30. p. 379. (Spor. B. B.). — Fuck. s. 548. — Wstd. 221.
—— molybdina. — Voges. 1451.
—— monadelpha. — Kl. 1248. — Dsm. 261. — cf. Valsa.
—— monocarpa Schum. — Fl. dan. XII. 2159. 1.
—— Montagnei. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.). — Alger. t. 27. 2. (Spor.).

Sphaeria Mori Sow. = coccinea, Fl. dan.
—— —— With: Wstd. 366.
—— —— albae Chaill. = Diplodia Mori Awd.
—— moricola. — Kl. 1561. — Ital. 511. — (Botryosph.) Nat Sfer. 91.
—— moriformis. — [S. 395. 377.] — Loud. p. 1030. f. 16148. — Bisch. f. 3537. — Fuck. s. 555. — Kl. II. 637. (Bertia). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 11. (Keimg. Hoffm.). — (Denud. T.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 30. (Fruct., Curr.). — Voges. 382. — Wstd. 25.
—— moroides (Denudat., Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 34. p. 318.
—— Mougeotii (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 97. (Fruct., Curr.).
—— mucida Fr. — Bisch. f. 3551.
—— Mülleri. — Kl. II. 642.
—— multiformis Fr. — Brit. f. 170. — Fl. dan. XII. 2149. 1. — Dsm. 751. — Kl. 163. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 28. (Fruct., Curr.). — Norweg. 193. — Wstd. 713.
—— —— v. coarctata. — Kl. 745.
—— —— v. rubiformis Fr. — Kl. 246.
—— multiplex Kz. (Xylaria). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 19. (Fruct., Curr.).
—— muscivora. — Carol. I. 57.
—— mutabilis P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3541. — (Villos.) S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 207. (Fruct., Curr.). — Sturm h. 4. t. 64.
—— mutila Fr. — [S. 417.] cf. Diplodia m. Fr. S. — (Conflu.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 191. (Fruct., Curr.). — Carol. III. 62.
—— mycophila. — [S. 390.]
—— myriadea (Sphaerella) DC. — [S. 396.] — Dsm. 794. 1440. 1786. — Kl. 1042. — Fuck. s. 600. — Voges. 1175. — Wstd. 73.
—— myriocarpa Fr. — [S. 390.] — Fuck. s. 543.
—— myrtillina Schub. — cf. Podosphaeria Kunzei. — [S. 406.] — R. f. 566.
—— Nardi. — [S. 394.] — Hdw. I. t. 15. f. 7. — Kl. 1337. — Kl. II. 640. — Wstd. 1214.
—— naucosa. — Kl. 1452.
—— —— Fr.: Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 27. p. 453. (Caespitos.).
—— navicularis Wllr. — Tharand. Jahrb. 1853. p. 111. c. ic. (Stein).
—— nebulosa (Sphaeropsis) P. — [S. 393. 419.] — Dsm. 267. 765. — Kl. 540. — (Seriat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 201. (Fruct., Curr.). — Voges. 1077.
—— nervisequa DC. — [S. 425.] — Kl. 849.
—— nidulans. — Carol. I. 50. — ? Wstd. 1110.
—— Nidulus. — [S. 391.]
—— nigerrima (Diatry.) Blox. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 95. p. 272. (Fruct., Curr.).
—— nigrans (Caulicol.). — [S. 393.] — Dsm. 1424. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 378. t. 11. f. 27. (Fruct., B. B.).
—— nigrella. — [S. 394.] — Kl. 1936. — Fuck. s. 582. — Dsm. 986. — (Caulicol.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 130. (Fruct., Curr.).
—— nigro-annulata. — Carol. V. 73.
—— nitens Holl. — Kl. 166.
—— nitida. — [S. 394.] — Schum. = foedans, Fl. dan. — Wstd. 901.
—— nivea Hoffm. — Voges. 278. — Fl. dan. XII. 2158. 1. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 126. (Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3520. — Kl. 161. — Kl. II. 635. — Krypt. Bad. 149. — (Valsa) Not. Sfer. 36.
—— Notarisii. — Alger. t. 25, 6.

Sphaeria nuclearia. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 4. (Notar.).
—— nucleata (Diatry.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 76. p. 270. (Fruct.).
—— nucula Fr. — [S. 390.] — Fuck. s. 563. — Schweiz. 16.
—— nummularia. — Voges. 371. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII t. 46. f. 59. (Fruct., Curr.).
—— obducens Schum. — [S. 389.] — Kl. 357. — Fuck. s. 553.
—— —— Fr.: [S. 389.] — Brit. f. 177. — Hoffm. Ic. t. 18. f. 4. — Not. Sfer. 66.
—— obesa. — Alger. t. 27. 3. (Fruct.).
—— obliqua. — [S. 392.]
—— obliquata. — [S. 392.]
—— obliterans (Obturat.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 34. (B. B.).
—— oblitescens (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 32. (B. B.).
—— obstrusa Rbh. — Kl. 973.
—— obtecta (Obtect.) Curr. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 32. p. 454. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 16. (Curr.).
—— obturata. — [S. 402. 418.]
—— ocellata (Halonia) Fr. — [S. 397.] cf. Aglaospora. — Kl. 1327.
—— —— P. Disp. — cf. Melogramma vagans Not. — (Obtect.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 85. (Fruct., Curr.).
—— ochraléa. — Dsm. 1799. 1800.
—— oculata. — [S. 397.]
—— Oedema. — Voges. 880.
—— Ogilviensis (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h 1852. IX. t. 11. f. 28. p. 379. (Fruct., B. B.).
—— Oleae DC. — cf. Diplodia Ol. — (Sphaeropsis?) DC.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 141. u. t. 58. f. 78. (Fruct., Curr.). — (Diplod.). — Kl. II. 543. — Letell. 649. 3. — Ital. 148.
—— Olearum. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 6. (Notar.). — Dsm. 1417. — Kl. II. 646. — (Pertus.) Cast.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 57. (Fruct., Curr.). — S. umbrina Mont.
—— Olerum. — [S. 391.] — Voges. 1076.
—— oligosperma. — cf. Melogramma.
—— olivacea Willd. — Wstd. 383.
—— oncostoma (Obvallat.). — Kl. II. 253.
—— operculata. — [S. 392.] — (Obtect.) A. S.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 75. (Fruct., Curr.).
—— ophioglossoides Eberh. — Voges. 565. — Bisch. f. 3491. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 4. (Fruct., Berk.). — (Cordyc.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 7. (Fruct., Curr.). — Wstd. 69. — Sturm h. 14. t. 64.
—— oppansa. — [S. 393.]
—— oppilata (Hendersonia?) Fr. — [S. 402.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 114. (Fruct., Curr.).
—— opulenta. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 7. (Notar.).
—— orbicula. — Carol. IV. 64.
—— orbicularis P. — cf. Hypoxylon nummular. Not.
—— ordinata Fr. — R. f. 329. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 26. p. 453. (Denudat.).
—— oreades Fr. — Voges. 1168. — Dsm. 768.
—— Orni. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 5. (Notar.).
—— oropensis (Nectria) Ces. — Kl. II. 524.
—— orthoceras (Ceratostoma). — Kl. 1455. — Fuck. s. 568.



— Salicina Berk. et Br. Not. N° 654. non Desm. Not. 24e N° 40 — non Fries in Sub. bot. pg. 710. —

— Perforans Rob. Desm. 10e Not. N° 31. — Ces. et De Not. Schema p. 64. sub Sphaerella.

— Serpyllii Desm. 13e Not. p. 80 (Excl. Syn. Acanthostigma)

— Ostryae De Not. [illegible]

— Serpyllii Desm. (Excl. Synonymum) 13e Not. p. 80. N° 29

Sphaeria Ostruthii Fr. — [S. 425.] — Dsm. 287. 1459. — Voges. 1083. — Brit. f. 330. — Wstd. 372.
—— Ostryae (Gnomonia). — Not. Sfer. 49. p. 42.
—— ovina P. — [S. 389.] — Bisch. f. 3573. — Kl. 532. — Kl. II. 730. — Fuck. s. 615. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 16. (Fruct., Curr.). — Dsm. III. 98.
—— —— v. glabrata Fr. — Fl. dan. XIII. 2333. 1.
—— ovoidea. — [S. 389.]
—— oxystoma — Voges. 767.
—— padicola. — Lib. 149.
—— padina. — Voges. 667. (Cenang. Cer. v. Pad.).
—— paecilostoma (Pertusae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 23. (B. B.).
—— paetula. — [S. 393.]
—— palina. — [S. 395.] — Voges. 878.
—— Pallor (Depazea) Berk. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 150. (Curr.).
—— palustris (Foliicol.). — Dsm. III. 365. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 384. t. 12. f. 39. (Fruct., B. B.). — Berk. Out. t. 1. f. 12. c. (Spor.).
—— pantherina. — Brit. f. 31.
—— papaveracea (Cucurb.). — Not. Sfer. 60.
—— papaverea. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 11. p. 189. (B. B.).
—— Papaveris Tul. — S. Brachycladii Lacr. — huc: Brachyclad. penicill. Cd. (Tul. Sel. I. 43.).
—— papillata. — [S. 390.] — Fuck. s. 559. — (Amphisph.). — Not. Sfer. 71.
—— parabolica Fr. — Bisch. f. 3531.
—— parallela Fr. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2038. 3. — (Concrsc.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 17. f. 100. (Fruct., Curr.).
—— pardalota. — Ann. sc. n. 1831. I. t. 12. (Mont.). — Brit. f. 175.
—— parmelioides. — Ann. sc. n. 1836. VI. t. 18. (Mont.).
—— parmularia B. (Hypoxyl.?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 40. (Fruct., Curr.).
—— Patella. — [S. 365.] — Voges. 485. — Wstd. 324. 1210. (Linar.).
—— pedunculata Dicks. (Xylar.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 5. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 168. — Mg. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. d—g. p. 225. (Fruct., Berk.).
—— pellita Fr. — [S. 389.] — Kl. 742. (var.?). — Fuck. s. 619. — Kl. 1246; Kl. II. 749. (Pleospora): Sphaeria Brachycladii Lacrx. — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 129. (Fruct., Curr.). — Wstd. 652.
—— peltata. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — Wstd. 713.
—— penetrans v. Patella. — Wstd. 324.
—— Penicillus. — Kl. 1942. — Voges. 768. (= S. decorticans Fr.).
—— peregrina. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 11. (Mont.).
—— perforans Rob. — Wstd. 274. — Dsm. 788. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 12. f. 36. e. p. 383. (Spor., B. B.).
—— perforata S. (Hypoxyl.) — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 45. (Fruct., Curr.).
—— perisporioides. — Carol. III. 69.
—— perpusilla. — Dsm. 987. — Wstd. 1114. — (Acanthostigma) Not. Sfer. 94.
—— persistens (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 326. t. 11. f. 22. (Fruct., B. B.).
—— Persolina (Rhaphidoph.) Not. Sfer. 85.
—— personata. — [S. 410.]

Sphaeria pertusa P. (Pertus.). — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 53. (Fruct., Curr.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 25. (B. B.).
—— —— Weigg.: Wstd. 1331.
—— perversa. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec 8. f. 8. (Notar.).
—— Petasitidis Rbh. — Kl. 977. — Kl. II. 733. — Wstd. 1215.
—— —— f. Digitalis. — Fuck. s. 530. b.
—— petiginosa Fr. (Diatry.?). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 86. (Fruct., Curr.).
—— petioli. — Fuck. Nass. f. 22; Fuck. s. 537; cf. ischnostyla. — R. f. 337. (cerastis Riess).
—— petiolicola. — Dsm. 1777. — Kl. 1835.
—— petiolorum. — Carol. I. 64. — Lib. 148.
—— Petrucciana Cald. — R. f. 335. — Comment. soc. critt. ital. 1861. no. 1. t. 2. f. 6. p. 40. (Caldes.). — Ital. 342.
—— Peziza Td. — Dsm. III. 371. — Bisch. f. 3540. — Berk. Out. t. 24. f. 6. (cf. Nectria). — Voges. 483. — Brit. f. 176. — Sturm h. 6. t. 12.
—— Pezizae Td. (Nectria). — Kl. 537. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 44. (Fruct., Curr.).
—— pezizoidea DC. — Wstd. 364.
—— Pezizula. — Carol. V. 61.
—— phaeocomes. — Lib. 44. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 11. f. 8. (Berk.). — Fuck. s. 511. — cf. Pyrenophora ph.
—— phaeospora (Villosae). — Kl. 1934.
—— phaeosticta Berk. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 38. (Fruct., B. B.). — R. f. 142. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 127. (Fruct., Curr.).
—— phaeostroma Mont. — R. f. 51. — (Byssis.), S. tristis β. engl. Fl.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 12. (Fruct., Curr.). — Carol. V. 63. — Alger. t. 26, 2.
—— phaselina — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 2. (Mont.).
—— phaseolicola (Depaz.). — Dsm. III. 359.
—— phomatospora (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 33. p. 381. (Fruct., B. B.). — (Obtect.) B. B.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 94. (Fruct., Curr.).
—— Phragmitis. — Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 2; t. 67. f. 4. 5. (R. Ludwig).
—— phyllogeneta. — [S. 422.]
—— picastra Fr. (Pertus.). — [S. 390.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 54. (Fruct., Curr.).
—— picea. — [S. 419 **.] — Kl. 851. (cf. Sphaeropsis).
—— pileiformis. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7. — (Xylaria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 4. (Fruct., Curr.).
—— pilifera. — [S. 392.] — Fl. dan. XII. 2039. 3. — Bisch. f. 3560. — Kl. 547.
—— —— v. dryina. — Kl. 743.
—— pilosa P. (Vill.). — [S. 405.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 21. (Fruct., Curr.).
—— pilulifera. — [S. 382 ***.]
—— Pinastri. — [S. 413. 392. 393.] — Voges. 772.
—— —— DC. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 82. (Fruct., Curr.).
—— pinea. — Dsm. 777.
—— Pini A. S. — Bisch. f. 3522. — Kl. 655.
—— —— Ludw.: Palaeont. VIII. L. 6. t. 63. f. 3.
—— pinodes B. Bl. (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 34. p. 454.

Sphaeria Pisi Sow. — [S. 394.] — Dsm. 985. — Loud. f. 16151. — Kl. 1338. — Fuck. s. 540. — cf. Sphaeria herbarum Not. — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 131. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 183. — Wstd. 272.
—— pisicola (Depazea) B. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 152. (Fruct., Curr.).
—— pithyophila. — [S. 391.] — (Cucurbit.) Not. Sfer. 57.
—— Placenta Td. — Wstd. 68. — Diatrype bullata R. f. 536.
—— planiuscula (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 35. (B. B.). — Hdw. I. t. 4. f. 7. — Kl. 1829.
—— Plantaginis. — Kl. 1742. a.
—— Platani (Massaria). — Carol. V. 62. — Kl. 1812. — R. f. 323.
—— plateata (Denud.) P. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 35. (Fruct., Curr.).
—— platystoma (Diatry.). — [S. 390. 48.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 66. (Fruct., Curr.).
—— pleuronervia. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 9. (Notar.).
—— pleurostoma. — [S. 392.]
—— plicata Td. — Bisch. f. 3549.
—— Plinthis. — [S. 365; 402, 6.]
—— Pocula. — [S. 399*.] — cf. Polypor. cupulaeformis B. C.
—— Podagrariae R. — cf. Dothidea. — Wstd. 722.
—— podoides P. (Diatry.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 85. (Fruct., Curr.). — Voges. 1074.
—— polita. — [S. 386.] (Melogr.). — [S. 395.] Picrost.
—— polycocca. — Carol. IV. 62.
—— Polygoni. — [S. 394.]
—— Polygonorum. — [S. 421.]
—— polygramma Fr. — [S. 419.] — Kl. 1247. — Dsm. 975. — cf. Sphaeropsis p.
—— polymorpha. — (Xylaria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 12. (Fruct., Curr.). — Sturm h. 6. t. 11.
—— Polypodii Rbh. — Kl. II. 533.
—— polytrichia Wllr. — R. f. 328. — Dsm. III. 787. — Voges. 1449.
—— pomiformis P. — [S. 389.] — Fuck. s. 556. — Voges. 482.
—— Populi Schum. — Fl. dan. XII. 2151. 2.
—— populina. — [S. 390. 421.] — Kl. 1045. — Wstd. 478. — cf. Hypospila p. — Mag. Zool. Bot. 1837. II. t. 7. f. a—c. p. 225. (Fruct., Berk.).
—— porphyrog. Td. — cf. Leptospora p. — Wstd. 171.
—— Posidoniae Mont. — Dsm. 1762. — R. f. 447. — Alger. t. 25, 8. — Ital. 650.
—— Potentillae. — [S. 394: 174.] — Carol. III. 61.
—— praemorsa Lasch. — Kl. 1249.
—— proboscidea. — [S. 415.]
—— profusa Fr. — Voges. 871. — Dsm. 262. — cf. Aglaospora pr. Not. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 128. (Fruct., Curr.). — Ital. 238.
—— prominula. — [S. 391.]
—— prosiliens. — [S. 391.]
—— protracta (Vermicularia) P. — [S. 420?] — Kl. 160. — Fuck. s. 619. — (Cryptovalsa) Not. Sfer. 46. p. 40.
—— protusa. — [S. 391.]
—— pruinata K. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 37. (Fruct., Curr.).

Sphaeria pruinosa. — [S. 393.] — Voges. 968. — Brit. f. 85. — Wstd. 268.
—— Prunastri P. — Kl. 358. (cf. Valsa). — Voges. 378. — Brit. f. 29. — (Valsa) Not. Sfer. 35.
—— Pruni Schum. = cupularis Fl. dan. — Wstd 528.
—— Pseudo-Bombarda Mont. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 6. p. 321. — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 171. (Fruct., Curr.).
—— pseudo-maculiformis. — Dsm. 1418.
—— Psoromatis. — Flora 1855. t. 3. f. 13. (Massal.).
—— Pteleae Rbh. — Kl. 1238.
—— Pteridis. — Dsm. 795. — Kl. 971.
—— —— Kz.; cf. Sphaeria filicina Fr.
—— —— Dsm.: S. punctiformis v. Pter., Fr. Scler. — (Sphaerella) Not. Sfer. 99.
—— puccinioides. — Voges. 566. — cf. Dothid. — Wstd. 165.
—— pulchella P. — Voges. 279. — Bisch. f. 3547. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 150—153. (Fruct., Curr.). — Schnzl. t. 15. f. 39—12. — Kl. 152. — Dsm. 263. — Carol. I. 56. — Letell. 692. 1. — Wstd. 24. (v. minor.). — Schweiz. 13.
—— pulchra (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 143. p. 279.
—— pulicaris Fr. — [S. 402.] — Kl. 744. — Kl. II. 735. — Gibbera p. — (Caespit.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 19. f. 180. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 253. — Carol. V. 68.
—— Pulsatillae Lasch. — Kl. 759.
—— pulveracea Ehrh. — [S. 389.] — Dsm. 978. — R. f. 338. — (Denud.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 42. (Fruct., Curr.). — Voges. 773.
—— pulvinata Hdw. — Wstd. 713.
—— Pulvinulus B. (Villos.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 24. (Fruct., Curr.).
—— pulviscula (Denudat.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 52. (Fruct.).
—— Pulvis pyrius. — [S. 389.] — Schnzl. t. 15. f. 31—33. — Berk. In. p. 281. f. 65. a. — Kl. 515. — Fuck. s. 552. — Kl. II. 650. — (Denudat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 32. (Fruct., Curr.). — Voges. 381. — Wstd. 71.
—— punctata. — Brit. f. 169. — Bisch. f. 3487. — (Poron.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 27. (Fruct., Curr.). — Kl. 255. — Voges. 958.
—— punctiformis (Sphaerella). — [S. 396. 423.] — Dsm. 284. 1443. 1794. 1795. — Kl. 972. — R. f. 228. — Fuck. s. 518. — Voges. 662. — Carol. III. 59. — Wstd. 276. 373. 177. 173. 1111. — Hoffm. Ic. t. 8. f. 5.
—— —— Fr.: Fl. dan. XII. 2036. 1. — ? P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 142. p. 333. (Fruct., Curr.).
—— —— var. graminaria DC. = S. perpusilla Dsm. (Wstd.).
—— punctulata. — Dsm. 1780.
—— punicea. — cf. Nectria. — Wstd. 1109.
—— Pupula. — [S. 397.] — Dsm. 1764. — R. f. 543. (Hercospora).
—— purpurea. — Fl. dan. X. 1781. 1. — Claviceps p. — (Cordyceps) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 25. (Fruct., Curr.). — Wstd. 1209.
—— Purtoni Grev. (Nectria). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 181. (Fruct., Curr.).
—— pusilla Wahl. — Wstd. 21.
—— Pustula Curr. (Denud.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 31. p. 317. (Fruct.).
—— —— P. — [S. 421.] — Wstd. 653.
—— pustulata. — Wstd. 19. — Dsm. 1405. — Voges. 659. (leucostoma P.). — Wstd. 1107.

— Pleuroneuria. (Sphaerella Ces. et Dntr. Schem. p. 63)
Calosphaeria pulchella Tul. Select. ii. p. 109. T. xiii. f. 17-22.

— Fulvoracea. Curr. pag. 319 Tab. 57, fig. 42;

— Pomiformis P. — Tul. Select. Fung. ii. p. 246. annot.

– quaternata Pers. = Quaternaria Persoonii Tul. Select. ii. p. 105. Tab. XII. f. 16-25. –

– Recutita. – Septoria Graminum Desm. 10e Not. p. 5.

Sphaeria putaminum (Pertus.) Schw. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 60. 61. (Fruct., Curr.). — Carol. I. 61.
—— pyrenula. — [S. 390.]
—— pyrochroa (Nectr.). — Dsm. III. 372.
—— Pyrolae. — [S. 423.]
—— quadrinucleata Curr. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 90. p. 325. (Fruct.).
—— quaternata P. — Brit. f. 300. — Dsm. 969. — Wstd. 269. — Fl. dan. XII. 2039. 2. — Bisch. f. 3546. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 7. (Notar.). — Pay. b. cr. p. 8. f. 30. — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 164. 165. (Fruct., Curr.). — Voges. 179. (S. ferrug.).
—— quercina (Diatry.). — [S. 421.] — Dsm. 1752. — Letell. 703. 1. — Kl. 249. — R. f. 319. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 90. (Fruct., Curr.). — Voges. 868. (leiphaemia, Tul.).
—— Quercuum. — [S. 386.] (Melogr.) — Carol. II. 58.
—— querna Curr. (Vals.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 141. p. 279. (Fruct.).
—— Racodium P. — [S. 389.] — Kl. II. 649. — Fuck. s. 616. — (Villos.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 15. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 283. — Carol. V. 66. — Wstd. 655.
—— radians Td. — Bisch. f. 3512. — Wstd. 903.
—— radiata Schum. = fragiformis v. rad., Fl. dan.
—— radicalis. — Kl. II. 254. — Fuck. s. 640. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 89. (Fruct., Curr.). — (Endothia) Not. Sfer. 3.
—— radicosa DC. — Wstd. 69.
—— Ramalinae. — Dsm. 1769.
—— Ranunculi. — [S. 421.]
—— Rebissia (Pleospora). — Not. Sfer. 79.
—— recutita. — [S. 394: lugub., no. 197. — 396.] — Fuck. s. 519. — Wstd. 373.
—— redimita Wllr. — Kl. 1244.
—— regia (Hypoxyl.). — Not. Sfer. 12.
—— relicina. — [S. 420.]
—— repanda (Hypoxyl.) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 54. (Fruct., Curr.).
—— repens. — Schnzl. t. 15. f. 45.
—— reptans Sow. — Loud. f. 16428.
—— Resinae Fr. — cf. Nectria.
—— reticulata DC. — [S. 425.] cf. Combosira, Asteroma. — Wstd. 636.
—— revelata (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 325. t. 11. f. 18. (Fruct., B. B.).
—— rhabdospora (Valsa). — Not. Sfer. 45. p. 39.
—— Rhamni Ns. — [S. 391.] — Bisch. f. 3572. — Fuck. s. 631. — R. f. 339.
—— rhaphidosperma. — Ann. sc. n. 1840. XIV. t. 19. f. 3. p. 325. (Mont.).
—— Rhinanthi. — [S. 408.] cf. Sphaeronaema.
—— rhizogenea B. (Confl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 188. p. 283. (Fruct., Curr.).
—— Rhizomatum. — Kl. 1839.
—— Rhizomorphae (Foliicol.) Kz. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 139. (Fruct., Curr.).
—— —— Mont.: [S. 382*.]
—— rhodochlora. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 12. (Mont.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 19. (Fruct., Curr.).
—— Rhododendri. — Kl. 1836. — (Sphaerella) Not. Sfer. 96.
—— rhodomela Fr. — Fl. dan. XII. 2154. 2.
—— rhodomphalos B. (Denud.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 28. (Fruct., Curr.).
—— rhodopis. — [S. 389.]
—— rhodostoma A. S. — [S. 397.] — Bisch. f. 3509. — (Hercosp.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 79. (Fruct., Curr.).
Sphaeria Rhois (Diatry.) S. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 71. (Fruct., Curr.).
—— rhopaloides M. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 14. (Fruct., Curr.).
—— rhytidotes. — (Denud.) Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 21. (B. B.).
—— rhytismoides (Confert.) B. — Brit. f. 324. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 209. (Fruct., Curr.). — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 10. (Berk.).
—— Ribesia P. — cf. Dothidea R. Not. — Voges. 275. — Wstd. 466.
—— Ribesii Schum. = cohaerens var.? Fl. dan.
—— ribicola (Depazea) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 153. (Fruct., Curr.).
—— Ribis Td. — [S. 390.] — Bisch. f. 3538. — Wstd. 474. — Kl. II. 352.
—— —— Wllr. — cf. Dothidea Ribesia Not.
—— riccioidea. — [S. 383.]
—— rigida. — [S. 400*.] — Bisch. f. 3784. (Stilbum r.).
—— rimarum Lasch. — Kl. 969.
—— rimosa A. S. — Voges. 963. — Bisch. f. 3590. — Dsm. 265. — cf. Dothidea r. Fr.
—— —— Fr.: Kl. 347.
—— —— v. b., A. S. = filicina Fr. S.
—— Robergeana. — Dsm. 1755.
—— Robergei (Nectr.). — Dsm. III. 374.
—— Robertiani. — [S. 421.] cf. Stigmatea R.
—— Robertsii. — Lindl. v. K. p. 40. f. 25. — Pay. b. cr. p. 58. f. 242. — cf. S. Hügelii, Cordyceps Rob. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 26. (Fruct., Curr.).
—— ? Robiniae S. — Kl. 1843.
—— Rosae Schum. — Fl. dan. XIII. 2334. 1.
—— —— Schl.: Wstd. 476.
—— Rosarum. — [S. 417.] — (Valsa) Not. Sfer. 42. p. 37.
—— rosea Pers. — Kl. 1014.
—— rosella A. S. — Loud. f. 16446. — Bisch. f. 3536. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 3. (Fruct., Curr.).
—— rostellata Fr. — [S. 393.] — Kl. 749. — Dsm. III. 783. — Lib. 147.
—— —— v. minor Dsm. — cf. S. Vepris.
—— rostrata. — [S. 392., ib. 103?] — R. f. 256. — Dsm. 273. — Bisch. f. 3558. — Carol. IV. 55. — Wstd. 532.
—— —— v. tenuior Fr. — Bisch. f. 3559.
—— Rousseliana. — Dsm. 1782. — Voges. 1462, 1255.
—— Rousselii (Diatrypella). — Not. Sfer. 32.
—— rubella P. — [S. 394.] — Bisch. f. 3554. — Wstd. 171. — Fuck. s. 593. — Kl. 1640. — Berk. Out. t. 1. f. 12. b. (Spor.). — (Caulicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 136. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 252. — (Rhaphidophora) Not. Sfer. 86.
—— —— v. porphyrogona P. — Dsm. 277.
—— Rubi Curr. — cf. S. Vepris. — (Obtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 91. p. 325.
—— —— Fr.: [S. 417.]
—— —— Dub.: Wstd. 938.
—— rubicola Curr. (Denudat.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 48. p. 319. (Fruct., Curr.).
—— rubiformis P. — Wstd. 713. 904: cohaerens.
—— rubiginosa P. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 43. (Curr.). — Loud. f. 16378.
—— Ruborum. — Lib. 340. = callimorpha M.? (Wstd.).

Sphaeria rubra Fr. — Wstd. 637. 903.
—— rubricosa F. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 42. (Fruct., Curr.).
—— rudis Fr. (Rabenhorstia). — [S. 410.] — Fuck. s. 467. — (Diplod.?) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 129. (Fruct., Curr.).
—— rufa P. — Brit. f. 171. — Fl. dan. X. 1781. 2. — (Hypocrea) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 36. (Fruct., Curr.).
—— rufescens Schw. — S. aculeans, Carol. I. 55.
—— rufo-fusca Fr. — Wstd. 1203.
—— rugosa Grev. — Loud. f. 16150.
—— Rumicis. — Dsm. 798.
—— Rusci Wllr. — Dsm. 781. — S. atrovirens b. Fr. — Kl. II. 540. — (Subtect.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 120. (Fruct., Curr.). — Voges. 1170. — Wstd. 535. — Ital. 880. (Cryptosph.). — (Sphaerella) Not. Sfer. 95.
—— Ryckholtii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 4. (Wstd.). — Wstd. 1204.
—— sabuletorum (Foliicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 383. t. 12. f. 36. a—d. (Fruct., B. B.).
—— Sacculus. — [S. 412. Tors.]
—— Sagraeana M. (Hypoxyl.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 45. f. 24. (Fruct., Curr.).
—— salicella Fr. — [S. 393.] — Dsm. 38. — Kl. 1445. (Halon.). — Voges. 1163. — Wstd. 370.
—— salicina P. — Bisch. f. 3525. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 4. (Notar.). — (Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 149. (Fruct., Curr.). — Carol. IV. 60. — Norweg. 196. (vibralis Somm.). — Wstd. 473.
—— —— Sow.: cf. S. saligna.
—— saligna Ehrb. — Wstd. 524. (Dothid.). — S. Capreae DC., salicina Sow., Variolaria Salicis Bouch.
—— Sambuci. — Ital. 784. (Dothid.).
—— sanguinea S. — (Nectria) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 45. 46. (Fruct., Curr.). — (Nect.) Not. Sfer. 8.
—— —— P.: Norweg. 94. (episphaeria v. media, Fr.).
—— —— v. cicatricum. — Brit. f. 83. — Mag. Zool. Bot. 1837. I. t. 3. f. 6. p. 48. (Berk.).
—— sapinea. — [S. 391.]
—— Saponariae. — cf. Spilosphaeria, Septoria, Depaz. — Wstd. 954.
—— sardoa. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 5. (Notar.).
—— sarmentorum Fr. — [S. 417.] — (Diplod.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 118. (Fruct., Curr.). — Voges. 1463.
—— Sarraceniae. — Carol. I. 65.
—— Sassafras (Hypoxyl.) S. — Carol. I. 53. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 50. (Fruct., Curr.).
—— Saturnus. — [S. 411. 23.]
—— Saubinetii (Caespitos.) Mont. — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 19. (B. B.).
—— scabiosaecola (Depaz.). — Wstd. 30.
—— scabra. — Kl. 1447.
—— —— Schmidt: Krypt. Bad. 428.
—— —— (Villos.) Curr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 13. p. 315. (Fruct.).
—— —— Schum. — cf. elongata, Let.
—— scabrosa (Diatry.) DC. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 84. (Fruct., Curr.). — Fl. dan. XII. 2038. 1.
—— scabrosae affinis Not. (Versatiles). — Kl. II. 537. — Wstd. 1372.
—— scarlatina Schum. = rufa Fl. dan.

Sphaeria scatigena (Villosae) B. B. — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. p. 452. t. 17. f. 25.
—— schistostroma Dub. — R. f. 53.
—— Scirpi. — [S. 393: 134.] — Kl. 1837. — Pringsh. Jahrb. I. 1858. t. XXIV. A. (Pringsh.). — Kl. II. 256. — scirpicola DC., Fr. — DC. 1128.
—— scirpicola. — [S. 393.] — Wstd. 373.
—— Sclerotium. — [S. 418. Clint.]
—— scoriadea Fr. (Confluent.). — [S. 391.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 187. (Fruct., Curr.).
—— Scrophulariae. — [S. 394: 155.]
—— scutellata P. — Bisch. f. 3543. — Kl. 963. — cf. Valsa.
—— Secretani Heer. — Fl. tert. Helv. t. 1. f. 4.
—— semilibera Rob. — Dsm. 1437.
—— seminuda. — [S. 390.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 4. (Notar.).
—— sentina. — [S. 394.] — Kl. 1562. — Fuck. s. 524. — Dsm. III. 364; 789.
—— sepincola. — [S. 398. Sacc.] — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 326. t. 11. f. 21. (Fruct., B. B.). — Dsm. 274. — Voges. 1078.
—— septorioides. — Dsm. 1447. — Wstd. 480.
—— septospora. — [S. 386.] (Melogr.).
—— seriata (Subtect.). — [S. 389.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 121. (Fruct., Curr.).
—— serograpta. — Dsm. 1793.
—— serpens P. — Fl. dan. XII. 2037. 1. — (Hypoxyl.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 48. (Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3508.
—— —— v. lumbricoides. — Kl. 1638.
—— setacea. — [S. 394.] — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 9. (Notar.). — Fuck. s. 536. — Kl. 548. — Dsm. 787. — (Foliicol.) P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 145. (Fruct., Curr.). — Voges. 1173. — cf. Thamnomyces Chamissonis E. — Brit. f. 184.
—— —— Alni: Norweg. 197. — Wstd. 536.
—— signans Wllr. — [S. 417. 3?] cf. Diplodia salicina Lév.
—— simplex. — [S. 391.]
—— sinensis. — Lindl. v. K. p. 39. f. 34. — Hook. J. 1843. II. t. 8. f. 1.
—— sinopica Fr. — Dsm. 759. — Voges. 1335. — (Nectria) Not. Sfer. 6.
—— siparia (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 9. f. 8. p. 321. (Fruct., B. B.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 98. (Fruct., Curr.).
—— Smilacis Cast. — Dsm. 1420.
—— socia. — [S. 390.] — Wstd. 477.
—— socialis. — [S. 412. 49.]
—— Solani. — [S. 394.]
—— solida Sow. — Wstd. 483.
—— Solidaginis Fr. — [S. 425.] — R. f. 332. — Carol. II. 60. (Dothid.).
—— Sorbi. — Voges. 869. — Bisch. f. 3556. — Norweg. 93. — Lib. 339. — (Valsa) Not. Sfer. 34.
—— sordaria Fr. — [S 389.] — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 3. (Notar.). — (Denudat.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 43. (Fruct., Curr.).
—— sordida. — [S. 386.] (Melogr.). — var. b.: Wstd. 520.
—— Spartii Ns. (Gibberidia). — [S. 395.] — Kl. 355. — Fuck. s. 624. — (Conflu.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 189. (Fruct., Curr.). — Voges. 664. — Letell. 692. 4. — Wstd. 716. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 18. (Fruct., Curr.).
—— spermoides. — [S. 389.] — Loud. f. 16420. — Bail S. t. 17. — Kl. 534. — Fuck. s. 554. — Kl. II. 651. — Dsm. 977. — Denudat. Hffm.:

— Salicella Fr. — Cryptosphaeria Ces. et De Not. Schema p. 57.

Cryptospora suffusa Tul. Sel. t. ii. p. 145. t. 17. f. 28-37.

– Melanconis stilbostoma Tul. Select. ii. p. 119. Tab. XIV. fig. 1-12. –

Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 36. (Fruct., Curr.). — Voges. 484. — Krypt. Bad. 150. — (Lasiosphaeria) Not. Sfer. 83.
Sphaeria sphaerocephala. — [S. 410*.]
—— sphaerococca. — [S. 385. 23.]
—— spiculifera Sow. — Wstd. 522.
—— spiculosa. — [S. 393.] — Dsm. 1403.
—— —— Bt.; cf. Sphaeria fimbriata Not. — Fuck. s. 614. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 111. (Fruct., Curr.). — Wstd. 467. 651.
—— —— v. Robiniae. — Hdw. I. t. 5. f. 6. — R. f. 336. — Kl. 1736. 1843.
—— Spinaciae. — [S. 425.]
—— spinifera W. — Fuck. s. 646.
—— spinosa P. — [S. 392; ib. 117.] — Fl. dan. XII. 2038. 2. — Fuck. s. 645. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 7. f. 3. (Notar.). — Bisch. f. 3555. — Kl. 356. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 108. (Fruct., Curr.). — Voges. 376.
—— spurca (Diplodia) Wllr. — [S. 417: 11.] — Kl. 965. — Fuck. s. 581. — ? Diplod. Rosar. Fr. (Wstd.).
—— squalens. — [S. 396.]
—— stannea. — [S. 389.]
—— Steinheilii. — Ann. sc. n. 1834. I. t. 13.
—— Stellariarum Rbh. — Kl. 975. — Fuck. s. 516. a.
—— —— f. Holosteae Awd. — Kl. 976.
—— —— f. Spergulae. — Fuck. s. 516. b.
—— Stellarinearum Rbh. — R. f. 148. (v. Cerastii).
—— stellaris. — [S. 371.]
—— stellata Td. — Bisch. f. 3613. (Sphaerobolus s.).
—— stellulata. — Brit. f. 79. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 6. (Notar.). — Kl. 658. — cf. Valsa. — Carol. I. 51.
—— stercoraria. — [S. 389.]
—— —— Fr.: non Fuck. s. 544. (t. Fr.). — (Denud.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 40. (Fruct., Curr.).
—— —— Sow.: Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 17. (Spor., Curr.).
—— —— Sow.: Xylariae pedunculatae Sow. t. 437: forma reducta (ex Berk. In. p. 279). — (Denud.) Sow.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 38. 39. (Fruct., Curr.).
—— stercorea Sow. — Kl. 432.
—— stercoris. — [S. 390*. 405.] — Kl. II. 433. — stercoraria Sow. var., Fr. Sy.
—— —— Fr. El. = S. (Denud.) stercoraria Fr. (Curr.). — Dsm. III. 97. — Voges. 1169.
—— Stigma. — (Diatry.) Norweg. 91. — Wstd. 112. 529. (c. v. decorticata). — Not. Sfer. 25. p. 26.
—— —— Hoffm. — Voges. 372. — Fl. dan. XII. 2037. 2. — Dsm. 963. — (Diatry.) H.: Kl. 49. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 82. (Fruct., Curr.). — cf. decorticans. — Carol. I. 63.
—— stigmatella Wllr. — Wstd. 38.
—— stilbostoma. — Dsm. 757. — (Valsa) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 140. u. 140. a. (Fruct., Curr.).
—— —— v. Platani. — Voges. 569. — Wstd. 906.
—— —— v. papula. — Kl. 159. — Voges. 962.
—— stipata Curr. = Valsa hypodermia Fr. — Lib. 343. — R. f. 320. — (Concresc.) C.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 197. p. 274. (Fruct., Curr.).
—— striaeformis Fr. — Wstd. 1132. — Dsm. 1410.
—— stricta. — [S. 392.]
—— strigosa. — [S. 389.]

Sphaeria strobiligena. — Dsm. 1422.
—— strobilina H. S. (Dichaena). — Kl. 544. — Kl. II. 539.
—— —— Fr. [S. 403.] — Voges. 572.
—— strumella Fr. — Voges. 960. — Dsm. 1102. — Kl. 757. — Kl. II. 255. — (Diatry.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 88. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 173.
—— strumellaeformis. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 8. f. 4. (Notar.).
—— stylophora B. B. (Ceratostom.). — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 17. f. 29. p. 453.
—— subcongregata. — Carol. IV. 57.
—— subiculata S. (Byssised.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 9. (Fruct., Curr.). — Carol. V. 72.
—— subradians. — Dsm. 1796. — Voges. 1252.
—— subscripta. — [S. 397.] — (Halon.).
—— subsolitaria S. (Diplod.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 49. f. 198. (Fruct., Curr.).
—— subtecta. — [S. 417.]
—— subterranea. — [S. 382*.]
—— subulata. — [S. 392.]
—— succenturiata Td. — Bisch. f. 3497. — Kl. 1838.
—— succincta W. — Fuck. s. 572. — ? Staurosphaeria Rhamni Wstd.
—— succinea Rob. — R. f. 326. — Dsm. 1444.
—— suffulta. — Kl. 1329. — Fuck s. 542.
—— suffusa (Valsa) Fr. — Voges. 1246. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 144. (Fruct., Curr.).
—— sulcata. — [S. 403.] — Wstd. 224.
—— superficialis (Villos.) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 25. p. 317. (Fruct., Curr.).
—— superflua Awd. = Sph. herbar. v. minor. Rbh. — Fuck. s. 545.
—— surculi. — [S. 390.]
—— syconophila. — Act. Turin. 1853. XIII. Dec. 6. f. 5. (Notar.).
—— syncephala. — [S. 412. 45.]
—— syngenesia. — Voges. 870. — Kl. II. 613. — Valsa Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 119. (Fruct., Curr.).
—— Syringae Fr. (Hendersonia). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 116. (Fruct., Curr.).
—— Taleola Fr. (Valsa). — Dsm. 1754. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 124. (Fruct., Curr.).
—— Talus v. licheniformis. — Wstd. 367. 908: v. plicata.
—— Tamariscinis Grev. (Obtect.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 81. (Fruct., Curr.).
—— taphrina Fr.? cf. Diplodia polymorpha. — [S. 392.]
—— Tassiana (Sphaerella). — Not. Sfer. 98.
—— —— (Rosellinia). — Tassi, Flora di Siena. III. 1862. c. ic. — Not. Sfer. 16. p. 19.
—— Taxi (Diplodia) Sow. — [S. 417.] — Dsm. 981. — Kl. 1036. — Voges. 1079. — Brit. f. 179. — Wstd. 718.
—— Taylori. — Hook. Lond. J. 1843. II. t. 8. f. 2.
—— tecta. — Kl. 353. 843.
—— tectae proxima. — Kl. 748.
—— tenacella. — [S. 391.]
—— tenebrosa (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 382. t. 12. f. 35. (Fruct., B. B.).
—— tephrotricha. — [S. 389.]
—— tessellata P. — Kl. 1035.
—— tessera Fr. — [S. 392.] — Fuck. s. 642.
—— tetraspora (Valsa) Curr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 148. (Fruct., Curr.).
—— thelebola (Valsa) Fr. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 157—159. (Fruct., Curr.).

Sphaeria thelena Fr. — [S. 388.] — Müller, Pflanzenstaat 270. — Byssis. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 8. (Fruct., Curr.). — Bisch. f. 3600. — Dsm. 271. — Wstd. 115.
—— therophila. — Dsm. 1776.
—— thoracella Rustr. — Wstd. 1243.
—— Thwaitesii (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 380. t. 11. f. 32. Fruct., B. B.).
—— Thyrsus. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 12. f. 18. p. 385. (Berk.).
—— Tiliae P. — [S. 410.] — Dsm. 979. — Spilobolus T., Rabenhorstia T. — Kl. 256. — Obtect. Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 104. (Fruct., Curr.). — (Valsaria) Not. Sfer 55.
—— —— M. et Nstl.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 105. 106. (Fruct., Curr.). — Voges. 660. — Wstd. 533.
—— tiliaginea. — Micr. J. 1859. VII. t. 11. f. 14. (Curr.).
—— Tocciaeana (Diatrypella). — Not. Sfer. 31.
—— Tomicum Lév. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 11. f. 17. p. 321. (Fruct., B. B.). — Dsm. 1426. — (Obtect.) Fr.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 87. Fruct., Curr.).
—— torquata Pers. — Wstd. 472.
—— tortuosa. — [S. 392.]
—— Tosquinetii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 2. (Wstd.).
—— tosta (Caulicolae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. p. 381. t. 11. f. 31. (Fruct., B. B.). — Kl. II. 252.
—— translucens. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 2. (Notar.). — Ital. 785.
—— transversalis Schw. (Obturat.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 109. Fruct., Curr.).
—— tremelloides Schum. — [S. 383.] — Fl. dan. XI. 1858. 2.
—— —— Weiss.: Wstd. 90. — Hoffm. Ic. t. 18. f. 2. Hypocrea).
—— trichella Fr. — [S. 420.] — cf. Vermicularia. — Wstd. 133.
—— trichina. — Voges. 666.
—— trichostoma Fr. — [S. 391.] — Kl. 1049. a. — Kl. II. 535. — Dsm. III. 788.
—— trichostroma. — [S. 407 **.]
—— —— v. globosa. — Kl. 1019. b.
—— Tridactylitis. — Kl. 1451.
—— Trifolii P. — Voges. 1167. — Dsm. 976.
—— tristis Td. — [S. 388.] — Bisch. f. 3599. — (Byssis.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 57. f. 11 (Fruct., Curr.). — Alger. t. 26. f. 1.
—— tritorulosa (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 15. p. 466. Fruct., B. B.).
—— trivialis (Obtectae). — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 10. f. 16. p. 311. Fruct., B. B.).
—— Trogii. — Heer, Fl. tert. Helv. t. 1. f. 5.
—— tubaeformis Td. — [S. 394.] — R. f. 54. — Kl. 359. — Fuck. s. 533. — (Foliicol.) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 140. Fruct., Curr.). — Voges. 280. — (Ceratost.) Not. Sfer. 23. p. 24.
—— Tubercularia. — [S. 385 *.]
—— tuberculata Schum. = scabrosa Fl. dan.
—— tuberculosa. — [S. 419?.] — Loud. f. 16126. — fusca, Fl. dan. — Wstd. 219.
—— tubulina A. S. (Hypoxy.). — [cf. S. 325. 14.]. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 55. (Fruct., Curr.).
—— tumida P. — Cytispora t. Lib. — Wstd. 1130.
—— tumulosa. — Dsm. 1775.
—— turbinea. — Palaeont. VIII. t. 8. f. 10. (Ludwig).
—— turgida P. — [S. 412. 37.] — Kl. 516. — Valsa) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 48. f. 139 (Fruct., Curr.). — Wstd. 997.
Sphaeria turpis Not. — Kl. II. 536.
—— Typhae Lasch. — Kl. 660.
—— Typharum. — Kl. II. 731.
—— typhina. — cf. Dothidea t. — Nov. Act. 1861. XXIX. t. 1. f. 1—5. 7—10. t. 2. f. 1—10. (Bail). — Dsm. 958. — Voges. 79. — Wstd. 522. — R. f. 541.
—— uberiformis Fr. (Topospora). — [S. 415.] — Kl. 442. — (Sphaeropsis?) Linn. Tr. 1859. XXII. t. 59. f. 113. (Fruct, Curr.). — Mastomyces Friesii.
—— uberina Mont. — Ann. sc. n. 1855. III. t. 6. f. 1. (Fruct.).
—— uda (Hypoxy.) P. — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 46. f. 61—63. (Fruct., Curr.). — v. salicaria P.: Wstd. 166.
—— Ulicis Fr. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 365. f. 7. (Wstd.).
—— uliginosa. — [S. 389.] — Dsm. III. 782.
—— ulmaria Sow. — Wstd. 111.
—— ulmea. — Carol. II. 63. (Xyloma).
—— Ulmi Fr. — Kl. 669; Cent. IX. Suppl. — Voges. 766. — Wstd. 111.
—— ulmicola Curr. (Pertus.). — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 58. p. 321. (Fruct., Curr.). — Bivona t. 3. f. 2.
—— —— Bern: Wstd. 137.
—— umbonata. — [S. 390.]
—— umbrina Fr. — [S. 390.] — Fl. dan. XIII. 2332. 2. — R. f. 327. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 2. (Notar.).
—— —— Mont. = S. Olearum Cast. (cf. R. f. 327).
—— —— B.: [S. 388. 17?] — Ital. 239.
—— umbrinella. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 5. (Notar.).
—— undulata Schum. = serpens Fl. dan.
—— —— P.; cf. Diatrype. — Loud. f. 16363. — Voges. 371.
—— Unedonis. — Act. Turin. 1857. XVI. Dec. 9. f. 6. (Notar.).
—— unguiculata. — Chile n. 9. f. 8.
—— unicaudata (Obtect.). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 11. f. 31. (B. B.). — R. f. 50.
—— urceolata. — [S. 397. 2?]
—— Urticae Rbh. (S. herbarum Pers. s.). — Kl. II. 545.
—— Uvariae (Depazea) Berk. — Linn. Tr. 1859. XXII t. 59. f. 147. Fruct., Curr.).
—— Vaccinii (Gibbera) Sow. — [S. 402.] — Linn. Tr. 1859. XXII. t. 58. f. 49. (Fruct., Curr.). — Wstd. 1043. — Voges. 665. (accum.). — Lib. 39.) — (Gibbera) Not. Sfer. 93.
—— vacillans. — Not. Sfer. 68.
—— vagabunda. — Dsm. 1445.
—— vagans. — cf. Melogramma v. — (Depazea). Brit. f. 188. — Wstd. 960.
—— Vaginae Lasch. — Kl. 663.
—— varia. — [S. 395.]
—— Variolariae. — Flora 1855. t. 3. f. 10. 11. (Massal.).
—— vasculosa Fr. — cf. Valsa.
—— Vectis (Caulicol.). — Ann. Mg. n. h. 1854. XIII. t. 16. f. 16. p. 467. (Fruct., B. B.).
—— velata. — [S. 392.] — Kl. 1324. — (Concresc.) P.: Linn. Tr. 1859. XXII. t. 47. f. 104. (Fruct., Curr.). — Brit. f. 78.
—— velutina W. — (Diatrype) Fuck. s. 674. — Wstd. 475.
—— ventricosa. — [S. 415.. Top.]

— T. torulosa Sull. Br. Not. 778. Pl. xvi. f. 15. —

— Vervecina Denm. — Ceratostoma Ver. Cat. Dut. Schema
p. 55.

Sphaerostilbe Tul. Select. Carp. I p. 130 – III. p. 99
S. aurantiaca – S. gracilipes – S. cinnabarina – S. flammea.

— Macularis Cord. Icon. III. p. 23. Tab. IV. f. 66.
Hendersonia Lévil. Champ. Mus. No 478. —

Sporochisma Mirabile Berk et Br. Brit. Fung.
No 467. — Mont. 6e Cent pag. 94 No 83 bis

Sporodinia grandis. — [S. 488.] — Bon. t. 7. f. 160.
—— —— Lk. = Aspergill. maxim. Lk. — Sturm h. 36. t. 8.
Sporodum. — [S. 499.]
—— asperum. — Kl. 1894.
—— conopleoides. — [S. 499. gram.] — Cd. Anl. t. B. f. 14: 1. 2. — Fuck. s. 166. — Kl. 774. — Fuck. rh. II. 104.
—— gramineum. — [S. 499.]
—— herbarum. — Bon. t. 3. f. 69.
—— lineatum. — [S. 499.]
—— sparsum. — [S. 499.]
Sporomega Andromedae. — Dub. Hyst. t. 2. f. 24.
—— degenerans. — [S. 368, 15.] — Cd. Ic. V. t. 9. f. 60. — Cd. Anl. t. F. f. 59: 9—12. — Pay. b. cr. p. 91. f. 423.
Sporonema. — [S. 423.]
—— glandicola. — Dsm. III. 83. — Voges. 1461.
—— hyemalis. — Dsm. III. 81.
—— phacidioides. — Dsm. 1245.
—— ramealis. — Dsm. III. 82.
—— strobilina. — Kl. II. 756. — Dsm. III. 700. — Voges. 1343.
Sporophleum. — [S. 502, 4.]
—— Graminum. — cf. Arthrin. spor.
Sporormia fimetaria. — Act. Turin. 1849. X. Dec. 5. f. 6. (Notar.). — Kl. II. 257. — cf. Sphaeria.
Sporoschisma mirabile. — Fres. t. 6. f. 26—28. — Berk. In. p. 327. f. 74. a. — Kl. 1854. — Kl. II. 762.
Sporotheca. — [S. 507.]
—— Carpini. — [S. 507.] — Sturm h. 9. t. 5.
Sporotrichum. — [S. 492. 495.] Trichosporium. Tuburcinia.
—— ? in unguibus hominis. — Archiv f. phys. Heilk. XII. p. 193. ic. (G. Meissner). — in abdomine piscis: Bull. ac. belg. 1858. V. 2. p. 29. (Poelman).
—— aeruginosum. — cf. Sp. viride.
—— agaricinum. — cf. Monospor. ag. Bon.
—— aurantiacum. — [S. 496.]
—— caesiellum. — [S. 496.]
—— candidum Lk. — Wstd. 592.
—— chartaceum. — Letell. 679, 4. (Myxotrich.). — Wstd. 149.
—— chlorinum. — [S. 495.]
—— Collae. — Kl. 1682.
—— conspersum Kz. — Bisch. f. 3759. (cf. Acladium).
—— densum Fr. — Bisch. f. 3760.
—— fallax. — Lib. 187.
—— fenestrale Ditm. — Wstd. 866. — Sturm h. 1. t. 1.
—— ferrugineum. — [S. 495.]
—— Fiedleri. — Kl. 1573.
—— flavissimum. — Letell. 635, 3.
—— flavo-virens. — Kl. 1781.
—— foliorum.
—— —— v. Brassicae. — Dsm. 227.
—— fungorum. — Letell. 679, 1.
—— fusco-album. — [S. 496.] — Kl. 881.
—— fuscum. — Bon. t. 6. f. 130. — Letell. 679, 3. — Fuck. rh. 139.
—— griseum. — [S. 496.]
—— Hippocastani. — Cd. Anl. t. B. f. 7: 2.
—— holosericeum Pr. — Kl. 1273.
—— Iolithus Ficin. — Wstd. 699.
—— lanatum Wllr. — Kl. 1274.
—— laxum. — [S. 496.] — Kl. 1437.
Sporotrichum lycoeccon. — [S. 496.] — Kl. 1574.
—— maculare Lk. — Wstd. 116.
—— merdarium. — [S. 496.]
—— minutum Grev. — Loud. f. 16570.
—— murinum. — Bon. t. 6. f. 145.
—— nigrum Fr. — Bisch. f. 3715.
—— nitens. — Dsm. 1541.
—— olivaceum. — Lib. 186.
—— pannosum. — Hedw. I. t. 8. f. 4. — Kl. 1971.
—— polysporum. — [S. 496.]
—— pulchellum Dub. — Wstd. 116.
—— roseum. — [S. 495.]
—— ruberrimum. — [S. 496.] — R. f. 174. — cf. Verticill. ruberr. — Letell. 635, 5.
—— rubiginosum. — [S. 495.]
—— salicinum. — [S. 496.]
—— sporulosum. — Letell. 635, 1—3.
—— sulfureum Grev. — [S. 496.] — Loud. f. 16571. — Brit. f. 211. — Bull. ac. belg. 1852. XIX. 1. p. 561. (Spring.).
—— torulosum. — Bon. t. 8. f. 178.
—— virescens. — [S. 495.]
—— viride. — Letell. 679, 2. (aeruginos. P. ?).
—— vitellinum. — [S. 496.] — Letell. 635, 2.
Spumaria. — [S. 449.]
—— alba. — [S. 449.] — Fl. dan. XI. 1978. 1. — Fuck s. 297. — Bisch. f. 3630. — Dsm. 119. — Loud. f. 16541. — Bot. Zt. 1848. t. 5. f. 1—6.
—— —— Schum. = Diderma spumarioides, Fl. dan. — Purton. II. t. 21. — Lib. 179. — Wstd. 381.
—— —— v. laminosa Kl. — Kl. 59.
—— cornuta Schum. = alba, Fl. dan.
—— didermoides P. = Diderma oblong. Fl. dan. [S. 451.]
—— granulata Schum. = Diderma gr. Fl. dan.
—— minuta Schum. = Diderma min. Fl. dan.
—— Mucilago. — Wstd. 381. — Cd. Anl. t. C. f. 34: 1—3. — Schnzl. t. 15. f. 52—56.
—— physaroides. — [S. 452. 2.] cf. Didymium, Let.
—— ramosa Schum. = Diderma ram. Fl. dan.
Stachylidium. — [S. 490.] — Botrytis.
—— agaricinum. — [S. 490.]
—— araucarium. — Bon. t. 7. f. 155.
—— Bassianum. — [S. 490.]
—— bicolor. — [S. 490.]
—— candidum Grev. — Loud. f. 16586.
—— characeum. — Cd. Anl. t. B. f. 16: 3—5.
—— diffusum. — [S. 490.] — Bisch. f. 3744. — Kl. 1389. — Berk. In. p. 314. f. 71. c. — cf. Botryospor. diff.
—— paradoxum. — Bon. t. 7. f. 152.
—— pulchrum. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 7. (Hoffm.). — cf. Botryospor. p., u. Cephalospor. botryoid.
—— Sceptrum Fr. — Bisch. f. 3746. — cf. Sceptromyces.
—— terrestre. — [S. 490.]
Stachyobotrys. — [S. 491.]
—— alternans. — Bon. t. 9. f. 185.
—— atra. — Cd. Anl. t. B. f. 18: 5—8. — Pay. b. cr. p. 74. f. 333.
Staurophallus. — [S. 434*.]
—— senegalensis Mont. — Cd. Ic. VI. t. 4. f. 1.
Staurosphaeria Lycii. — Bull. ac. belg. 1859. VII. p. 366. f. 20. (Wstd.).
—— Rosarum. — Wstd. 1371.
Steganosporium. — [S. 508.] cf. Stegonosporium.
Stegasma. — [S. 458*.]

Sporon. Thaid. et Sp. aestivalis Desm. 19 not. p. 24.


Spororm. Linet.: Hormospora Ces. et Dnt. Schema. Co.



Stegasma depressum. — Cd. Ic. V. t. 3. f. 34. — Cd. Anl. t. C. f. 29: 31.
Stegia. — [S. 370.]
—— arundinacea. — [S. 370.] — Dsm. 84. — Kl. II. 32.
—— Ilicis. — [S. 370.] — Kl. II. 441. — Dsm. 411. — Fuck. s. 723. — R. f. 463. — Ital. 538. — Eustegia. — Schweiz. 19. — Krypt. Bad. 557.
Stegilla arundinacea Fr. — Kl. 852.
—— discolor. — Bail S. t. 18.
Stegobolus. — [S. 524.]
Stegonosporium. — [S. 508.] — Fres. t. 7. f. 53—57.
—— cellulosum. — Micr. Journ. IV. t. 11. f. 10—25. (Curr.). — Kl. II. 148. — Ital. 417.
—— clavatum Riess. — Bot. Zt. 1853. t. 3. f. 24—27.
—— elevatum. — Kl. 1853. — Dsm. III. 255. — Fuck. rh. 95. — R. f. 583.
—— muricatum. — Bon. t. 2. f. 52. — ?R. f. 264.
—— pyriforme. — Cd. Anl. t. F. f. 57: 15. — Fuck. s. 121. — Bail S. t. 16. — Wstd. 577. — Fuck. rh. 91.
Steirochaete Malvarum. — Verh. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen. 1851. I. c. (Braun, Casp., de B.). — Kl. 1979.
—— Solani. — Kl. 1980.
Stemmaria Carestiae. — Ital. 888.
—— cyathiformis. — Wstd. 182.
—— globosa Preuss. — Sturm h. 36. t. 7.
Stemonitis. — [S. 455.]
—— arcyrioides. — [S. 455.]
—— coccinea Roth. — Wstd. 81.
—— decipiens. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 7. B. (Evolut., Ns.).
—— elegans Roth. — Wstd. 1260.
—— fasciculata P. — Wstd. 82. — Loud. f. 16519. Voges. 490.
—— ferruginea. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2016. 1. — Fuck. s. 278. — Bisch. f. 3701. — Pay. b. cr. p. 122. f. 580. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. X. f. 1—13. (de Bary). — Carol. II. 75. — Wstd. 82.
—— flavescens Schrk. = Arcyria umbrina, Fl. dan.
—— Friesiana de B. (oblonga et obtusata). — R. f. 568. — Krypt. Bad. 550.
—— furfuracea Gmel. — Wstd. 518.
—— fusca Roth. — [S. 455.] — Fl. dan. XII. 2016. 2. — Kl. 374. — Fuck. s. 279. — Bisch. f. 3661. — Kl. II. 457. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 20, 25; t. 10. f. 14. (de Bary). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 13. (?Keimg., Hoffm.).
—— globosa Schum. = obtusata v. glob., Fl. dan.
—— leucocephala P. — Wstd. 482.
—— leucopodia DC. — Wstd. 1260.
—— leucostyla P. — Wstd. 1260.
—— lutea Trent. = Arcyr. umbr., Fl. dan.
—— mammosa. — [S. 455.]
—— nigra Schum. = St. ovata v., Fl. dan.
—— oblonga. — [S. 455.] — R. f. 568. (Friesiana v.).
—— obtusata Fr. — [S. 455.] — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 21—24. (de Bary). — Carol. V. 84. — R. f. 568. (Friesiana).
—— —— v. globosa Fr. — Fl. dan. XII. 2091. 2.
—— ovata. — [S. 455.] — Cd. Anl. t. C. f. 32: 5. 6. — Fuck. s. 277. — Kl. 1132. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 6. f. 18. 19. (de B.). — cf. Enerthenema eleg.
—— —— v. nigra P. — Fl. dan. XII. 2091. 1.
—— papillata P. — [S. 455.] — Loud. f. 16520. — Ns. f. 118. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 10. f. 17—19. (de Bary). — cf. Enerthenema el.
Stemonitis physaroides Fr.? = Trichia phys., Fl. dan. [S. 455.]
—— protracta. — [S. 455.]
—— pulchella. — Ann. Mg. n. h. 1841. VI. t. 12. f. 11. (Berk.).
—— pumila. — [S. 455.] — Cd. Ic. V. t. 3. f. 37.
—— tubulina. — [S. 455.]
—— typhina Willd. — Wstd. 82.
—— typhoides. — [S. 455.] — Kl. 923. — Fuck. s. 280. — Cd. Anl. t. C. f. 32: 1—4. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X. t. 10. f. 15. 16. (de Bary). — Carol. II. 76.
—— violacea Schum. = ferruginea, Fl. dan. — Wstd. 82.
Stemphylium. — [S. 506.] — e Cladosporio: Hedw. I. t. 10. f. 7.
—— botryosum. — [S. 506.]
—— Cordae. — [S. 506.]
—— dubium. — [S. 506.]
—— ericoctonum. — Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gartenbaues in Preussen. 1851. I. t. 2. (Braun, Casp., de B.). — Kl. 1888.
—— polymorphum. — Bon. t. 3. f. 73. — Fuck. rh. 121.
—— pyriforme. — Bon. t. 3. f. 71.
—— subtile. — [S. 506.]
Stephanoma strigosum Wllr. — cf. Asteroph. Pezizae Cd.
Stephensia bombycina. — Tul. F. hyp. t. 12. f. 1.
Sterbeeckia. — [S. 443.]
—— cornucopioides. — Nov. Act. 1832. XVI. I. t. 11. f. 33. (Dumortier). — Wstd. 192.
Stereum. — [S. 332. 330 ****.] cf. Thelephora.
—— abietinum. — [S. 332.]
—— acerinum. — [S. 333.] — Carol. II. 37.
—— albo-badium. — Carol. I. 29. (Theleph. Schw.).
—— alneum. — [S. 333.]
—— atratum. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 12. p. 382. (Berk.).
—— aurantiacum. — [S. 333.]
—— avellanum. — [S. 332.]
—— bicolor. — [S. 332.] — Carol. II. 33.
—— candidum. — Carol. I. 32.
—— cinereo-badium. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 5. (Klotzsch).
—— coeruleum. — Carol. III. 27.
—— complicatum. — Carol. II. 30.
—— conchatum. — [S. 332.]
—— Curtisii. — Carol. III. 26.
—— disciforme. — [S. 332.] — Dsm. 822.
—— dryinum. — [S. 332.]
—— ferrugineum. — [S. 332.]
—— fistulosum. — Carol. II. 34.
—— frustulosum. — [S. 333.]
—— giganteum. — Carol. II. 38.
—— hirsutum. — [S. 332.] — Kl. 42. — Kl. II. 211. — Ital. 292.
—— hydrophorum. — Hook. J. 1856. VIII. t. 6. — Ann. Mg. n. h. 1844. XIV. t. 9. (Berk.).
—— laeve. — Carol. II. 39.
—— Leveillianum. — Carol. II. 35. (Corticium).
—— lilacinum. — Ital. 336. (Thel. purp. v. pinea).
—— lobatum. — Carol. I. 28.
—— ochraceo-flavum. — Carol. II. 31.
—— papyrinum. — Carol. II. 36.
—— pergamenum. — Carol. III. 25.
—— Pini. — [S. 332.] — Kl. II. 213.

Stereum purpureum (Schum.) Fr. — [S. 330 ***. 332.] — Kl. II. 504. — Ital. 335.
—— Ravenelii. — Carol. IV. 13.
—— reniforme. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 11. p. 382. (Berk.).
—— repandum. — [S. 333.]
—— rubiginosum. — [S. 332.] — Dsm. 821. — Kl. II. 212. — Wstd. 1289. — Ital. 293.
—— rugosum. — [S. 332.] — Kl. II. 503.
—— sanguinolentum. — [S. 332.] — R. f. 210. — ? Bail S. t. 28.
—— spadiceum. — [S. 332.] — Carol. II. 32. — — Wstd. 1290.
—— spectabile. — Nov. Act. 1843. XIX. Suppl. I. t. 5. (Klotzsch).
—— striatum. — Carol. I. 31. (Theleph. sericea Schw.).
—— subpileatum. — Carol. I. 30.
—— tabacinum. — [S. 332.] — Wstd. 1288.
—— vorticosum. — [S. 332.]
Sterigmatocystis antacustica Cramer. — Vierteljahrschr. nat. Ges. Zürich. 1859. IV. t. 2. p. 337. — cf. Aspergillus dub. Berk.
—— sulphurea. — Fresen. t. 10. f. 30—33. p. 83.
Stictis. — [S. 372: Xyl. 373.] — cf. Propolis, Schmitzomia.
—— alba Fr. — Fuck. s. 707.
—— arundinacea. — [S. 373.]
—— atrata. — Dsm. 927.
—— atrocyanea. — [S. 373.]
—— Berberidis. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 6. (Notar.).
—— Berkeleyana D. L. = Propolis Berk. Dsm. Tul.). — Voges. 1346. — Alger. t. 29, 8.
—— chrysophaea. — [S. 363.] — Ann. Mg. n. h. 1861. VII. t. 16. f. 19. p. 451.
—— circinata. — Lib. 232.
—— coccinea. — [S. 356.]
—— exigua. — Voges. 1241. — Dsm. 1033. — Wstd. 989.
—— fenestrata. — Dsm. 1601.
—— furfurella. — Kl. 1929.
—— graminicola. — Kl. II. 713.
—— Graminum. — Dsm. 471.
—— hemisphaerica. — [S. 373.]
—— hysterioides. — Voges. 1242. — Dsm. 717. — Brit. f. 308.
—— inclusa. — [S. 373.]
—— Lecanora. — [S. 373.] — Kl. 923. — R. f. 157. — Dsm. 69. — Lib. 30.
—— lichenicola. — [S. 373.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.).
—— Luzulae. — Lib. 133.
—— macroloma. — Alger. t. 29, 5.
—— nigrella. — [S. 373.]
—— nivea P. — Voges. 1095. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 5. (Notar.). — Fuck. s. 708. — Kl. 1850. — Kl. II. 712. — Wstd. 1280.
—— ocellata. — [S. 373.]
—— Oleae. — [S. 367**.] — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 3. f. 1. (Notar.).
—— pallida. — [S. 373.] — Norweg. 187.
—— Panizzei. — Act. Turin. 1845. VII. Dec. 4. f. 2. (Notar.). — Kl. II. 313. — Ital. 44.
—— pelvicula. — [S. 373.]
—— Pupula. — [S. 364; 363***.] — Carol. II. 54.
—— radiata. — [S. 364; 363***.] — Loud. f. 16288. — Dsm. 470. 1032. — Bisch. f. 3404. — Kl. 637; 1928. — Brit. f. 70. — Carol. I. 43.
—— rosacea. — [S. 361, 3.]
—— rubicunda. — Alger. t. 29, 6.
—— seriata. — Lib. 233.
Stictis Sesleriae. — Carol. I. 42. — Lib. 132.
—— sphaeralis. — [S. 366.]
—— stellata W. — Fuck. s. 704.
—— Thelotrema. — Alger. t. 29, 3.
—— Tiliae Lasch. — Kl. 638.
—— valvata. — Kl. 1927. — Dsm. 921. — Wstd. 235.
—— versicolor. — Cd. Anl. t. G. f. 61: 5—8. — Bail S. t. 19. — Pay. b. cr. p. 86. f. 390. — Dsm. 716. — Bisch. f. 3405. — Fuck. s. 706. (Propolis). — Kl. 1633. — Carol. II. 53.
Stigmatea. — [S. 421.] Dothidea.
—— Alchemillae. — [S. 422.] — Fuck. rh. 425.
—— Chaetomium. — [S. 422.] — Fuck. s. 390. — Fuck. rh. 424.
—— circinans. — Fuck. rh. 421.
—— conferta. — [S. 421.]
—— Geranii Fr. — [S. 421.] — Fuck. s. 388. — Fuck. rh. 420.
—— maculaeformis. — [S. 421.] — Kl. II. 72. — Fuck. rh. 422.
—— Petasitidis. — Fuck. rh. 426.
—— Polygonorum. — [S. 421.]
—— Potentillae (Coleroa). — [S. 422.] — Kl. II. 155. — Dothidea P. — Fuck. s. 489. (p. pte.). — Dsm. III. 557. — Fuck. rh. 423.
—— Ranunculi. — [S. 421.]
—— Robertiani Fr. — [S. 421.] — Sphaeria R. Rbh., Dothid. R. Fr. — Kl. II. 569. — Fuck. s. 387. — Krypt. Bad. 425. — Fuck. rh. 419.
Stigmatella aurantiaca. — Berk. In. p. 313. f. 70. b.
—— dryina. — cf. Stigmella dr.
Stigmatosphaera Artocreas Dmtr. — Wstd. 27.
—— Racodium. — Wstd. 655.
—— rubella Dmtr. — Wstd. 171.
Stigmella. — [S. 426.]
—— dryina Lév. — R. f. 351. (Stigmatella, Sporidesmium foliicolum Dsm., Stilbospora dryophila Cd., Dicoccum dryophilum Cd. Ic.). — Démid. Russ. t. 5. f. 5. — Voges. 1464.
Stilbinum. — cf. Stilbum.
Stilbospora. — [S. 508.]
—— affinis. — Not. Sfer. 53.
—— angustata P. — [S. 508.] — Kl. II. 591. — Fuck. s. 130.
—— asterosperma. — [S. 508.] — cf. Asterospor. Hoffmanni Kz. — Wstd. 576. — R. f. 584.
—— atherosperma Hoffm. — Bisch. f. 3896.
—— botryospora. — Ann. sc. n. 1836. VI. t. 18. Mont.) = Myrocephal. botryospor. Fres.
—— bullata Lk. — Wstd. 857.
—— cellulosa. — [S. 508.]
—— ceratospora. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 1. f. 10. (Notar.).
—— chartarum. — Wstd. 149.
—— conglomerata Lk. — Wstd. 573.
—— didym. — cf. Didymosporium complanatum.
—— dryophila Cd. — cf. Stigmella dryina Lév.
—— fugax. — cf. Didymosp. compl.
—— Juglandis. — Wstd. 1189.
—— Kickxii. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XVIII. p. 417. f. 6. (Wstd.). — Wstd. 850.
—— macrosperma P. — [S. 508.] — Bisch. f. 3879. — Fuck. s. 131. — Schnzl. t. 12. f. 16—18. — Fres. t. 7. f. 46—52. — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 9. u. t. 10. f. 2. — Pay. b. cr. p. 61. f. 254. — Kl. 993; 1871. — R. f. 180. — Dsm. III. 754. — Voges. 383. — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 16. — Lib. 390. Wstd. 575. — Fuck. rh. 82.
—— macrospora Lk. — Wstd. 575.


— Olea. Sutr. Trochila Sutr. Rettif. Sic. p. 13.




Thel. caesia P. – Sebacina caesia Tul. – Not. Tremell in Linnean Soc. Journ. vol. XIII. p. 37. (1871) –

— Sebacea: Genus Sebacina Tul. in Not. Tremell. Linnean Soc. Journal. Vol. XIII. p. 36 (1871) —

Loud. f. 16138. — Bail S. t. 28. — cf. T. sericea Schmitz.
Thelephora orbicularis. — Alger. t. 33, 7. — cf. Hypochnus Michel.
—— Ostrea. — Nov. Act. 1826. XIII. I. t. 2. (Blum et Ns.).
—— pallida. — [S. 330****.] — Carol. II. 29.
—— palmata Fr. — [S. 331. 330**.] — Loud. f. 16131. — Bisch. f. 3311. — Fuck. s. 929. a. — Kl. II. 13; 131. — cf. T. anthocephala (var.). — R. f. 119. — Schweiz. 20. — Krypt. Bad. 57.
—— —— v. angusto-incisa. — R. f. 411.
—— pannosa. — [S. 330.] — Loud. f. 16127. — — Dsm. III. 797.
—— papillosa. — Lib. 21.
—— papyracea Fl. dan. — Wstd. 766.
—— paradoxa Lév. — Bon. t. 139. f. 4.
—— pergamena. — Voges. 778.
—— Piceae. — Voges. 681.
—— Pini Fr. (Stereum). — Kl. 906. — Fuck. s. 920.
—— polygonia P. — Dsm. 78.
—— princeps. — Jungh. pr. t. 7.
—— Pruni Schum. — Fl. dan. XII. 2035. 2.
—— pubera. — cf. Hypochnus puber.
—— purpurea (Stereum) P. — Kl. 50. — Fuck. s. 925. a. b. — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 5. f. 15. (Fruct., Berk.). — Brit. f. 147. — Huss. I. 20. A. — Wstd. 431. — v. pinea: Ital. 336 (Stereum lilacinum).
—— puteana Fr. — Fl. dan. XII. 2035. 1. — (Corticium) Schum.: Kl. 628.
—— quercina P. — Lib. 224. — Loud. f. 16147. — (Corticium) Kl. 129. (629). — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 26. (Keimg., Hoffm.). — Voges. 679. — Wstd. 1393.
—— radiata Fr. — [S. 331.] — Bisch. f. 3310. (cf. Th. caryophyllea).
—— —— Fl. dan. R. f. 409.
—— radiosa. — Pringsh. Jahrb. II. t. 32. f. 38. (Fruct., Hoffm.).
—— reticulata Fr. — Kl. 1216.
—— rosea. — Letell. 630. 3.
—— roseo-cincta (Resupin.). — Linn. 1830. V. t. 11. f. 5. (Fries). — cf. Hypochnus.
—— Rubi. — Lib. 323.
—— rubiginosa (Stereum) Schrad. — Kl. 811. — Fuck. s. 922.
—— —— Lk.: Dsm. 821. — Brit. f. 247. — Wstd. 1289. 1290.
—— —— v. resupinata. — Kl. 908.
—— rugosa (Stereum) P. — Kl. 327. — Fuck. s. 919. — (Laurocerasi) Brit. f. 145.
—— Sambuci. — Voges. 779. — Wstd. 588.
—— sambucina. — Letell. 607.
—— sanguinaria P. — Wstd. 791.
—— sanguinolenta Fr. — Loud. f. 16146. — Fuck. s. 923. — (Stereum) A. S.: Kl. 51.
—— sebacea. — Letell. 608 (incrustans). — Bon. t. 12. f. 253. — Berk. Out. t. 17. f. 6. — Kl. 1811.
—— sericea. — [S. 333***.] — Linn. 1843. XVII. t. 12. 13. (Schmitz); ochroleuca Fr.
—— —— Schw. — cf. Stereum striatum Fr.
—— setosa. — Ann. Mg. n. h. 1842. X. t. 11. f. 10. p. 381. (Berk.).
—— sinuans. — [S. 333. 17.] — cf. T. frustulata: Voges. 680., var. crassior.
—— spadicea (Stereum) Fr. — Brit. f. 144. — ? Kl. 910.
—— —— Schw.: Wstd. 1290.
—— spiculosa Fr. — [S. 331.] — ? Fuck. s. 926.
Thelephora suberosa. — Alger. t. 33. 6.
—— sulphurea (Corticium) Fr. — Kl. 519.
—— tabacina Fr. — Lib. 121. — Loud. f. 16135. — (Stereum) Kl. 1120. — Brit. f. 248. — Norweg. 186. — Wstd. 1290. 1288.
—— terrestris. — [S. 331.] — Kops Fl. bat. X. 750. 3. — Bail S. t. 28.
—— —— Ehrh.: Fuck. s. 928. — Ann. sc. n. 1837. VIII. t. 11. f. 29; t. 8. f. 12. (Fruct., Lév.). — Nov. Act. 1842. XIX. II. t. 57. f. 104—110. (Fruct., Phöb.). — Kl. 40. — Kl. II. 130. — Voges. 297. — Wstd. 765.
—— tremelloides DC. — Wstd. 693.
—— tuberosa. — Loud. f. 16133.
—— Typhae. — Kl. 1518. — (Corticium) Kl. II. 411. — Dsm. 1811.
—— Ulmi. — Kl. 1716.
—— umbrina P. — Wstd. 765.
—— undulata. — [S. 331.]
—— uvida. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 27. (Anat., Hoffm.). — cf. Hypochnus uv.
—— variegata Schrad. — Wstd. 1288.
—— viscosa P. — Fl. dan. XI. 1851. 1.
—— vitellina. — Alger. t. 33, 4.
—— vorticosa Fr. — Wstd. 431.
—— vulgaris. — [S. 536.]
Theleporus. — [S. 325.]
Thermutis. — [S. 524.]
Thyrsidium. — cf. Myriocephalum hederaecolum.
Thysanopyxis pulchella. — Kl. 1432.
Tilletia. — [S. 516.] cf. Uredo.
—— Caries. — [S. 516.] — Kl. 1998. — Berk. Out. t. 1. f. 5. — Fuck. s. 112. — Krypt. Bad. 401. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 5. f. 1—16; — 1853. XX. t. 3. f. 21—26; t. 4. f. 23—29; — 1854. II. t. 12. f. 1—26. (Tul.). — Schnzl. t. 12. f. 1—6. (Ust. sit.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 6: c—g. — Kühn, Krankh. t. 4. f. 1—6; t. 1. — Berk. In. p. 318. f. 72. b—f. — cf. Uredo sitophila. — Fuck. rh. 252. — Journ. hort. soc. II. 1847. Fusispor. inoscul. (Keimg. Berk.).
—— endophylla. — Kl. II. 500.
—— Lolii. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 1—12. — Kl. 1999.
—— Sorghi vulgaris. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 5. f. 17—22. (Tul.).
Tilmadoche. — [S. 454.]
Tipularia. — [S. 459.]
Tophora. — [S. 521. 523.]
Topospora. — [S. 415. 524.]
Torsellia. — [S. 412.]
Torula. — [S. 505.] cf. Oidium. — Bonord. in: Bot. Zt. 1857. t. 4. f. 13.
—— abbreviata Cd. — cf. Xenodochus brevis. — Ann. Mg. n. h. 1850. V. t. 11. f. 4. p. 161. (B. B.).
—— Acrosporium Cd. — Sturm h. 8. t. 34. — cf. Oidium monil.
—— aequivoca. — cf. Alysidium aeq.
—— alta. — [S. 505.] — Cd. Anl. t. B. f. 5: 5. 6. — Kl. 1376.
—— alternata Fr. — Bisch. f. 3869.
—— antennata. — [S. 505.] cf. Hormiscium a. — ? Bisch. f. 3870. — Brit. f. 215. — Letell. 673, 4. — Wstd. 433. — Sturm h. 8. t. 39.
—— antiqua. — Fuck. rh. 60.
—— arbuscula. — [S. 505**.]
—— aurea. — Kl. 1374. — Sturm h. 8. t. 36.
—— botryoides. — Sturm h. 8. t. 35.
—— bulbigera Bon. — R. f. 175. — Bot. Zt






Trichia clavata P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2089. 1. — Bisch. f. 3668. — Voges. 281. — Fuck. s. 266. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 7. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 1—3. (Anat., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 1—3. (Wigd.).
—— —— Beck. = T. obtusa Wigd.
—— coccinea Bull. — Wstd. 81.
—— coerulea Trent. — Wstd. 382.
—— crassa Schum. — Fl. dan. XII. 2088. 2.
—— craterioides. — Auerswald, Bot. Unterhaltungen. 1863. S. 38?
—— denudata.— Purton. I. t. 24. f. 2. — Wstd. 81.
—— difformis. — [S. 457**.]
—— fallax P. — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2088. 3. — Krypt. Bad. 420. — Bisch. f. 3674. — Fuck. s. 267. — Loud. f. 16529. — Kl. 931. — Kl. II. 137. — Voges. 578. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 14. 15. (Wigd., aus Pringsh. Jahrb. 1861. III.).
—— favoginea Schum. = chrysosperma, Fl. dan.
—— flava Hall. — Wstd. 518.
—— flexuosa Schum. — Fl. dan. XII. 2088. 1.
—— furcata Wigd. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 1. f. 1—11. (Structur). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 1—11. (Wigd.).
—— furfuracea With. — Wstd. 518.
—— leucopodia Bull. — Wstd. 1260.
—— Neesiana. — Cd. Anl. t. C. f. 30: 4—6. — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 5. 6. (Capill., Curr.).
—— nigripes. — [S. 456*. 457*.] — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 4. (Capill., Curr.). — Kl. 1025. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 5. (Anat., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 5. (Wigd.).
—— nitens Lib. — Fuck. s. 264. — Lib. 277 (chrysosperma a Fr.).
—— notata. — Fl. dan. X. 1680. 2.
—— nutans Grev. — Loud. f. 16524.
—— —— Bull. = Arcyria n., Fl. dan. — Purton. I. t. 21. f. 1.
—— obtusa Wigd. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 4. (Spor.). — clavata de B. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 4. (Wigd.).
—— ovata P. — Loud. f. 16528. — Dsm. III. 260.
—— physaroides Schum. — Fl. dan. XII. 2087. 3.
—— pyriformis. — [S. 457.] — Cd. Anl. t. C. f. 30: 1—3. — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 9. 10. (Capill., Curr.). — Kl. 1026; — 1632. — Krypt. Bad. 329. — R. f. 244 (bis). — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 1. f. 12. 13. (Anat., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 11. f. 12. 13. (Wigd.).
—— —— Schum. = clavata, Fl. dan. — Carol. II. 81. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 10. — Ital. 640.
—— ramulosa Rud. = Arcyria r. Wigd.
—— reticulata P. — [S. 457.] — Loud. f. 16527. — Cd. Ic. VI. f. 34.
—— retiformis. — Pay. b. cr. p. 122. f. 574.
—— rubiformis P. — [S. 457. 458**.] — Bisch. f. 3664. — Fuck. s. 268. — Krypt. Bad. 421. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 12. (Fruct., Wigd.). — Purton. I. t. 19. f. 1. — Purton. I. t. 37. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 12. (Wigd.).
—— serotina. — [S. 457.]
—— serpula — [S. 457.] — Fl. dan. XII. 2089. 3. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. XVI. f. 13. (Elater.). — Micr. Journ. 1854. III. t. 2. f. 7. 8. (Capillit., Curr.). — Bisch. f. 3622. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 3. f. 5*. (Fruct., Wigd.). — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 11. — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 16. f. 5*. (Wigd.).
Trichia serpula v. reticulata Fr. — cf. Tr. reticul.
—— turbinata With. — [S. 457.] — Kops Fl. bat. XI. 809. 2. — Kl. 762. — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 42. (Curr.). — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 6. (Capill., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 6. (Wigd.).
—— varia. — [S. 457.] — De Cand. Org. vég. 1827. II. t. 60. f. 6. (Hedwig f.). — Schnzl. t. 11. f. 27—33. — Zeitschr. f. wiss. Zool. 1859. X t. 8. f. 10—20 (de Bary). — Krypt. Bad. 419. — Kl. 422. — R. f. 245. — Fuck. s. 263. — Pringsh. Jahrb. 1861. III. t. 2. f. 7—10. (Fruct., Wigd.). — Ann. sc. n. 1862. XVI. t. 15. f. 7—10. (Wigd.).
—— venosa Schum. = T. serpula, Fl. dan.
Trichiamphora. — cf. Trichamphora.
Trichobasis. — cf. Uredo, Caeoma.
—— linearis. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9: 1. u. 3. — de Bary, Br. t. 3. f. 5.
Trichocoma. — [S. 446.] — paradoxa: Carol. IV. 77. — Jungh. pr. t. 2. f. 7.
Trichoconium glutinatum. — Sturm h. 13. t. 37.
Trichoderma. — [S. 447.]
—— carneum Schum. — Wstd. 137.
—— dubium. — [S. 448.]
—— flavum. — [S. 448.]
—— laeve. — [S. 447.]
—— roseum. — [S. 492.] — cf. Trichothec. r.
—— viride. — [S. 448.] — Cd. Anl. t. C. f. 33: 5—8. — Nees j. Syst. t. 10. — Schnzl. t. 14. f. 17—19. — Kl. 772. — Loud. f. 16589. — R. f. 67. — Wstd. 383. — Fuck. rh. 161.
Trichodesmium. — [S. 422.] — cf. Graphiola.
Tricholeconium. — [S. 472.]
—— fuscum. — Cd. Ic. V. t. 2. f. 20. — Cd. Anl. t. B. f. 15: 5—7. — (Sarcopodium) Kl. 1378.
—— roseum. — [S. 472.] — Fuck. rh. 185.
Trichosporium. — [S. 492.]
Trichostroma. — [S. 466.]
—— decipiens. — Sturm h. 34. t. 7. (Strauss).
—— olivacea. — Sturm h. 25—. t. 23. (Preuss.).
—— purpurascens. — Cd. Anl. t. B. f. 13: 6. — Sturm h. 9. t. 62.
Trichothecium. — [S. 492.] cf. Verticillium.
—— agaricinum. — Bon. t. 5. f. 114.
—— anodotrichum. — [S. 492.]
—— candidum. — Cd. Anl. t. B. f. 9: 2. — Bon. t. 8. f. 167. — Pay. b. cr. p. 73. f. 331. — Regel, Gartenflora. 1852. t. 21. f. 7—10.
—— capitatum. — [S. 492.]
—— clavatum. — Letell. 685. 4.
—— diffusum. — cf. Fusisporium Solani tub. Dsm.
—— domesticum. — [S. 492.]
—— mutatum. — Jungh. pr. t. 1. f. 2.
—— nigrescens. — [S. 492.]
—— roseum Lk. — [S. 492.] — Dsm. 156. — Loud. f. 16575. — Fuck. s. 181. — Bot. Zt. 1854. t. 8. A. (Hoffm.). — Kl. 182. 439. — Kl. II. 176. — Bisch. f. 3803. — Pringsh. Jahrb. II. t. 29. f. 21. (Keimg., Hoffm.). — Voges. 997. — Fuck. rh. 150. — Brit. f. 99. — Letell. 685. 3. — Lib. 78 (Trichoderma r. P.). — Wstd. 437. — Krypt. Bad. 547.
Trichulius. — [S. 455*.]
—— Schmidelii. — Cd. Anl. t. C. f. 28: 11—13.
Triglyphium album. — Fres. t. 9. f. 6.
Trimmatosporium Salicis. — Cd. Anl. t. B. f. 6: 4. 5.
Trimmatostroma. — [S. 474***.]

Trimmatostroma Salicis. — Pay. b. cr. p. 69. f. 303.
Trinacrium subtile. — Fres. t. 5. f. 14—17.
Triphragmium. — [S. 513.]
—— deglubens. — Berk. In. p. 325. f. 73. d.
—— echinatum. — Kl. II. 787. — Krypt. Bad. 313.
—— Isopyri Moug. — Dsm. 1087. — Voges. 892.
—— Ulmariae. — [S. 513.] — Cd. Anl. t. B. f. 4: 13. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 10. f. 14—18. (Tul.). — Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 23. 24. (Curr.). — Pay. b. cr. p. 61. f. 250. — Fuck. s. 38. — Kl. 271. — Kl. II. 336. — R. f. 181. — Dsm. 1088. — Voges. 891. — Wstd. 1183. — Ital. 889. — Fuck. rh. 317.
Triposporium. — [S. 491.]
—— elegans. — Cd. Anl. t. B. f. 11: 2. 3. — Pay. b. cr. p. 73. f. 329. — Bon. t. 3. f. 75. — Wstd. 1000.
—— Ficinusium. — Sturm h. 29—. t. 11. (Preuss.). — ? Micr. Journ. 1857. V. t. 8. f. 40. (Curr.).
—— Gardneri. — Journ. hortic. soc. 1849. IV. p. 8. (Berk.).
—— strepsiceras. — Hdw. I. t. 4. f. 2. — Kl. 1874.
Tripotrichia. — [S. 451**. 453.]
Trochila. — cf. Phacidium, Sphaeria.
Trogia. — [S. 315.]
Trullula Leguminum. — Kl. 1661.
—— Oreoselini. — Kl. 1660.
—— Spartii. — Kl. II. 752.
Tuber. — [S. 437.] cf. Melanogaster, Oogaster. (Anat.) Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856. p. 91.
—— aestivum. — Vitt. t. 2, 1. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 3.
—— —— Vitt.: Kl. 1222. — Berk. Out. t. 23. f. 2.
—— —— Tul.: Cd. Ic. VI. f. 129. (zu T. culinare Zob., p. 82). — Pringsh. Jahrb. 1860. II. t. 33—35. (Copulat., Hofmst.). — cf. T. bohem. — Vent. mi. 35. f. 4. 5. — Ital. 638.
—— affine Cd. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 140.
—— albidum Cd. — Loud. f. 16340.
—— —— Pico: cf. Tuber Borchii Vitt.
—— album. — Ann. sc. n. 1844. II. t. 6. (Lespiault).
—— —— Bull. (t. 404. f. A. B.): cf. T. Borchii Vitt.
—— —— Sow.: cf. Choiromyces meandriformis V. (ex Cd. Ic. VI.). — Staude t. 1. f. 1. 2.
—— algericum Mont. — cf. Tulasneinia Leon. Z.
—— arenarium Moris. — cf. Terfezia Leonis T.
—— Asa. — Tul. F. hyp t. 5. 2.
—— bohemicum Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 128 (zu culinare p. 82). = T. aestivum Tul. F. hyp.
—— Borchianum Zob. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 137. (T. Borchii).
—— Borchii. — Vitt. t. 1, 3. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 1; t. 21. f. 13.
—— —— Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 21. f. 139 (T. elegans). — Ital. (40.) 90.
—— brumale. — Vitt. t. 1, 6. — Tul. F. hyp. t. 7. f. 2; — t. 17. f. 3. — Kl. 1966. — de Bary, Ascomycet. 1863. t. 1. f. 16—23. (evolut. fruct.).
—— —— Vitt.: cf. Oogaster brum. Cd.
—— castaneum Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 132 (?).
—— cibarium. — Cd. Anl. t. D. f. 46: 19—22.
—— —— Sibth.: Loud. f. 16339. — Cd. Ic. V. t. 5. f. 46 (mesenteric. Tul. F. hyp.).
—— —— Sibth.: Sturm h. 19—. t. 13. (Cd.). — ? Roq. t. 24.
—— —— Sibth.: Bisch. f. 3655. — Truffe du Perigord: Oogaster melanosporus, Cd. Ic. VI. p. 74.
Tuber cibarium St. Krbh.: cf. Oogaster cibarium, Cd. Ic. VI. t. 17. f. 126. p. 71. — Schacht, Phys. Bot. 1852. t. 2. f. 1—11. (Fruct.). — id., Lehrb. d. An. Phys. I. 1856. t. 1. f. 23—30. (Fruct.). — Schwabe Fl. anhalt. II. t. 6. f. 8. — Huss. I. 11.
—— cinereum Tul. — cf. Oogaster rufus Cd.
—— culinare Zob. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 128 - 131. 138. (t. 19). p. 81.
—— —— v. cf. T. brumale et gallicum.
—— dryophilum. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 3; t. 19. f. 8.
—— elegans Cd. — cf. Tuber Borchii Vitt.
—— excavatum. — Vitt. t. 1, 7. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 1. (cf. T. fuscum Cd.), — t. 17. f. 5.
—— —— Vitt.: cf. Vittadinion Montagnei Z.
—— ferrugineum. — Vitt. t. 3, 10.
—— foetidum Vitt. — Vitt. t. 1. 8; — u. t. 3, 11. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 135. — Tul. F. hyp. t. 17. f. 7.
—— fuscum Cd. Mpt. cf. Vittadinion Montagnei Z. — Cd. Ic. VI. f. 142. = T. excavatum Tul. F. hyp.
—— gallicum Cd. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 138. (zu culinare Zob. p. 82).
—— griseum P. — cf. T. Magnatum Pico.
—— macrosporum. — Vitt. t. 1. 5. — Tul. F. hyp. t. 17. f. 8.
—— —— Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 18. f. 134. — T. macrospermum.
—— maculatum. — Vitt. t. 3. 16. — u. t. 4, 11. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 9.
—— —— Vitt.: Cd. Ic. VI. t. 18. f. 133.
—— Magnatum. — Vitt. t. 1. 4. — u. t. 2. 9. — Tul. F. hyp. t. 6. f. 3., t. 17. f. 6. — Lindl. v. K. p. 33. f. 4. (Spor.).
—— —— Pico: Cd. Ic. VI. t. 19. f. 136. — Vent. mi. 67. f. 7. 8. — Ital. 545.
—— melanospermum. — Berk. In. p. 281. f. 65. d. (Spor.). — Dsm. III. 262.
—— melanosporum. — Vitt. t. 2, 3. — u. t. 3, 20. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 2; t. 7. f. 1; t. 17. f. 2; t. 19. f. 12. — Berg, Charakteristik. 1860. t. 1. f. 5. — Kl. 1965.
—— —— Vitt.: cf. Oogaster m. Cd. — Ital. 45.
—— mesentericum. — Vitt. t. 3, 19. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 5; t. 7. f. 4; t. 17. f. 1.
—— —— Vitt.: zu culinare Zob. (Cd. Ic. VI. p. 82).
—— microsporum. — Vitt. t. 2, 6. — Willkomm, Wund. d. Mikr. 1856. p. 95. b. (Spor.).
—— Montagnei Lesp. — cf. Vittadinion Mont. Z.
—— moschatum Sow. — cf. Melanogast. Broom.
—— —— Bull.: cf. Melanogast. varieg.
—— nigrum Bull. — cf. Oogaster melanosp. Cd.
—— nitidum Vitt. — Vitt. t. 2, 10. — cf. Oogast. nit. C. — [S. 437***.] — Brit. f. 303.
—— niveum Dsf. (non Krbh.). — cf. Tulasneinia Leon. Z.
—— nuciforme Cd. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 143.
—— obtextum Spr. — Wstd. 39.
—— occidentale Cd. — Cd. Ic. VI. t. 20. f. 144. (= nuciforme Zob. p. 80).
—— oleraceum Web. — Wstd. 182.
—— oligosporum. — Vitt. t. 3, 1.
—— panniferum. — Tul. F. hyp. t. 3. f. 3; t. 17. f. 4. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 95. f. a. (Fruct.).
—— puberulum. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 11.
—— Rabenhorstii Cd. — Cd. Ic. VI. t. 18. f. 131. (zu culinare Zob., p. 83). — Kl. 934.

Tuber rapaeodorum. — Tul. F. hyp. t. 5. f. 4; t. 18. f. 1. — Willkomm, Wund. d. Mikrosk. 1856. p. 95. c.
—— Requienii. — Tul. F. hyp. t. 19. f. 10.
—— rufum. — Vitt. t. 1, 1. — Tul. F. hyp. t. 18. f. 2; t. 6. f. 2. — Kl. 1961.
—— —— Pico: cf. Oogaster r. Cd.
—— —— Poll. Spr.: cf. Oogast. r. Cd.
—— suillum Bornh.: cf. Oogast. r. Cd.
—— tesselatum Zob. — Cd. Ic. VI. t. 19. f. 138? (zu culinare Zob., p. 82).
Tubercinia Scabies. — Journ. hort. soc. 1846. I. t. 4. f. 30. 31. (Berk.).
Tubercularia Acaciae Fr. — Wstd. 394.
—— Aceris. — Act. Turin. 1841. III. Dec. 2. f. 8. (Notar.).
—— Aesculi. — Voges. 1478.
—— albida. — [S. 341 ÷.]
—— Cerasi Schum. = Cenangium Cer., Fl. dan.
—— ciliata. — [S. 361.] cf. Volutella cil. Fr., u. Fusar. ciliat. Lk. — Sturm h. 1. t. 14.
—— —— Ditm.: Bisch. f. 3829.
—— —— DC.: cf. Chaetostroma stipit. — Fusar. cil. Kops.
—— confluens. — [S. 361.] — Kl. 1264. — Voges. 576.
—— —— P.: Fuck. s. 777.
—— —— v. Acaciae (P.). — Kl. II. 595.
—— —— v. minor. — Letell. 691. 3.
—— —— v. Sophorae. — Kl. II. 778.
—— discoidea. — [S. 361.]
—— expallens. — [S. 361.] — Voges. 1091. — Wstd. 396.
—— fascicularis Td. — [S. 362. 8.] cf. Dermatea carpinea Fr.
—— fasciculata Td. — Wstd. 1274.
—— Filicis. — Kl. 1818.
—— floccipes Cd. — Bisch. f. 3830. — Sturm h. 7. t. 24.
—— fungiformis Wigg. — Wstd. 109.
—— granulata. — [S. 361.] — Bon. t. 11. f. 222. — R. f. 279: forma concava. — Bisch. f. 3831. — Kl. 99. — Dsm. III. 452. — Voges. 1090. — Carol. III. 40. — Letell. 691. 4. — Wstd. 395.
—— —— f. Ulmi. — Kl. 1392.
—— herbarum. — [S. 361.]
—— hirsuta Schum. — Fl. dan. XIII. 2337. 1.
—— liceoides. — [S. 361.]
—— longipes. — Lotos 1857. VII. t. 2.
—— Menispermi. — [S. 361.]
—— minor Lk. — Wstd. 394. — Dsm. 828.
—— minuta Schum. — Fl. dan. XIII. 2339. 2.
—— mutabilis. — [S. 361.] — Wstd. 1191.
—— mycophila. — [S. 472.] — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.). — [S. 472.] (Pactil.).
—— nigra Schum. — Fl. dan. XIII. 2273. 3.
—— persicina Ditm. — [S. 361.] — Bisch. f. 3833. — Dsm. 1082. — Kl. 1163. — Carol. III. 41. — Sturm h. 4. t. 49.
—— pezizoidea. — [S. 361.]
—— Pinastri. — [S. 361.] — Lib. 296.
—— Pini Schum. = Ditiola rad., Fl. dan.
—— Populi Schum. — Fl. dan. XIII. 2337. 2.
—— Pruni Schum. — Fl. dan. XIII. 2336. 2.
—— reticularioides. — Letell. 702.
—— Rubi. — [S. 361. 9.]
—— sarmentorum. — [S. 361.]
—— sulcata Schum. — Fl. dan. XIII. 2338. 2.
—— vulgaris. — [S. 361.] — Fl. dan. XIII. 2339. 1. — Cd. Anl. t. G. f. 68: 36—40. — Fuck. s. 776. — Bisch. f. 3832. — Dsm. 827. — Schnzl. t. 12. f. 22. 23. — Kützing, Philos. Bot. 1852. t. 19. f. 12. — Kl. 185. — (Aesculi) Kl. II. 777. — (Corchori, Coluteae) Kl. 1586. — forma conidifera Nectriae cinnabarinae: R. f. 321. β. — Voges. 84. — Carol. V. 45. — Schwabe, Fl. anhalt. II. t. 6. f. 4. — Wstd. 90. — R. f. 585 (sarmentor.). — Krypt. Bad. 152. — Fuck. rh. 181.
Tubulina. — [S. 459.]
—— fragiformis. — Cd. Anl. t. C. f. 27: 17—19.
Tuburcinia. — [S. 497.]
Tulasneinia Leonis. — cf. Oogast. algericus.
—— —— Zob.: Cd. Ic. VI. t. 16. f. 122.
Tulasnia elegans Lesp. — cf. Tulasneinia Leon. Zob.
Tulasnodea. — [S. 440.] cf. Tulostoma.
Tulostoma. — [S. 440.] (Tulasnodea).
—— brumale. — Cd. Ic. VI. f. 39. — Fl. dan. X. 1740. 1. — Cd. Anl. t. C. f. 36: 12. 13. — Loud. f. 16502. — cf. T. mammos. — Voges. 387. — Wstd. 122.
—— exasperatum Mont. — Cd. Ic. VI. f. 42. — Sagra, Cuba. t. 11. f. 4.
—— fimbriatum Fr. — Kl. II. 31. — Cd. Ic. VI. f. 40. — Carol. V. 80. — Wstd. 122.
—— granulosum Lév. — Démid. Russ. t. 4. f. 1.
—— Leveilleanum Gaud. — Cd. Ic. VI. f. 41. — Bonite, t. 140. f. 4.
—— mammosum Fr. — [S. 440.] — Kl. II. 30. — Fuck. s. 318. — Krypt. Bad. 331. — Kops Fl. bat. X. 750. 2. — Pay. b. cr. p. 9. f. 40—42. — Bisch. f. 3609. — Dsm. 1121. — Kl. 177. — cf. T. brumale. — Wstd. 122. — Ital. (39.) 89.
—— —— v. b.: Bisch. f. 3610.
—— Meyenianum. — Nov. Act. XIX. Suppl. I. t. 5. (Klotzsch).
—— pusillum. — Hook. Lond. J. 1842. I. t. 7.
Tympanis. — [S. 399.] — Bail S. t. 19. — Berk. In. p. 244. f. 60. c. (Spor.).
—— alnea Fr. — [S. 399.] — Kl. 344. — Norweg. 191.
—— Ariae. — [S. 400.]
—— conspersa. — [S. 399.] — Cd. Anl. t. G. f. 61: 34—39. — Ann. sc. n. 1853. XX. t. 16. f. 15. 16. (Tul.). — Pay. b. cr. p. 62. f. 272. — Brit. f. 160. — Lib. 129.
—— Cotoneastri. — [S. 400.]
—— Crataegi Lasch. — R. f. 353.
—— Frangulae Fr. — [S. 400.] — Kl. 343. — Kl. II. 661. — Fuck. s. 509. — Cenang. Fr. Tul. (Wstd.). — Wstd. 1276.
—— Fraxini. — [S. 400.]
—— inconstans. — [S. 400.]
—— Lonicerae. — Ann. sc. n. 1836. V. t. 13. (Mont.).
—— nigra Horn. = Tubercularia n., Fl. dan.
—— obtexta Wllr. — Kl. 1138.
—— —— v. pezizaeformis W. — R. f. 354 (Peziza Rosae P.).
—— Patella. — [S. 365.] cf. Phacidium P. — Wstd. 324 (v. sphaeriaef. Wllr.). — Fuck. s. 764 (Heterosphaer.).
—— picastra. — Carol. III. 63.
—— plinthis. — [S. 365.]
—— Prunastri. — [S. 400.]
—— Ravenelii. — Carol. IV. 66.
—— rigida. — [S. 400.]
—— Rubi Wllr. — Wstd. 1277.
—— saligna. — [S. 400.] — Bisch. f. 3155. — Berk. Out. t. 1. f. 10. (Fruct.). — Hook. J. 1851. III. t. 9. f. 1. — R. f. 229. — Fuck. s. 510.
—— turgida Wllr. — Wstd. 1279.
—— viticola Schw. — Kl. 1139.



Uromyces appendiculatus DeBary Champ. parasit.
An. S. nat. 4e Ser. XX. 1863. Pl. 10, 11.

Typhodium Graminis Lk. — Wstd. 522. — R. f. 511. a. b.
Typhula. — [S. 339.]
—— erythropus. — [S. 339.] — Dsm. 401. — Fl. dan. XII. 2030. 1. — Fuck. s. 893. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 9. — Sturm h. 31—. t. 12. (Szl.). — Bail S. t. 27. — Loud. f. 16193. — Kl. 830. — zu Sclerot. crustuliforme D. (Tul.). — Kl. II. 506. — Brit. f. 21.
—— Euphorbiae Fuck. en. n. 896: Claviceps. (Fuck. in lit.).
—— filiformis. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 10. — Loud. f. 16195. — Dsm. III. 310.
—— gilva Lasch. — R. f. 419.
—— ? gracilis. — [S. 339.] — Ann. Mg. n. h. 1838. I. t. 7. f. 1. (Berk.)
—— Grevillei Fr. — Bisch. f. 3382. — Carol. V. 35.
—— gyrans. — [S. 339.] — Fuck. s. 892. — Dsm. 1048. — Brit. f. 66. — v. foliorum: ib. 151. (Clavar. setip. Grev.).
—— incarnata. — Kl. 1313.
—— Laschii Rbh. — Kl. 1221.
—— muscicola. — [S. 339.] — Bisch. f. 3388. — R. f. 417. — Carol. III. 36.
—— penicillata Horn. = Clavaria pen., Fl. dan.
—— Persoonii Bail = Phacorhiza sclerotioides P.
—— phacorhiza. — [S. 339.] — Loud. f. 16192. — Kl. 926. — R. f. 239 u. 418. (huc Sclerot. complan.). — Dsm. III. 659. — Brit. f. 23.
—— ramentacea. — [S. 339.]
—— sclerotioides. — Cd. Anl. t. G. f. 72: 11.
—— tenuis Fr. — Loud. f. 16194.
—— Todei Fr. — [S. 339.] — Bisch. f. 3381. — Pistillaria quisquil. Fr. (Tul.). — Dsm. III. 341.
—— variabilis. — Hdw. I. t. 3. f. 2. a—c. — Kl. 1725.
—— —— Riess. c. Sclerot. Sem. cult. Kl. II. 507. — Fuck. s. 895.
—— villosa. — [S. 339.] — Fl. dan. XI. 1967. 2.

Ulocladium Botrytis. — Sturm h. 29—. t. 42. (Preuss.). — ?cf. Septosporium bifurc. Fres.
Ulvina. — Mycelium.
—— Aceti. — Kützing, Philos. Bot. 1851. t. 2. f. 2. — Wstd. 1319.
—— Sambuci. — Kützing, Philos. Bot. 1851. t. 2. f. 1.
Uncinula. — cf. Erysiphe.
—— adunca. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 15. (Lév.) = Erys. Salicis Tul. — Berk. In. p. 278. f. 64. d.
—— —— f. Salicum. — Fuck. s. 485. a. — Kl. II. 464: Erys. Salic. Tul.
—— f. Populorum. — Fuck. s. 485. b. — R. f. 560.
—— bicornis. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 17. (Lév.) = Erys. Aceris Tul. — R. f. 559.
—— Bivonae. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 14. (Lév.). — Erys. Biv. Tul.; adunca f. Ulmorum.
—— polychaeta. — Carol. IV. 68.
—— spiralis B. C. — Berk. In. p. 278. f. 64. a.
—— Wallrothii. — Ann. sc. n. 1851. XV. t. 7. f. 16. (Lév.) = Erys. Prunastri Tul. Sel.
Uredo. — [S. 515.] — cf. Caeoma, Cystopus, Coleosporium, Epitea, Melampsora, Podocystis, Polycystis, Rubigo, Thecaphora, Tilletia, Trichobasis, Urocystis, Uromyces [S. 514.], Ustilago.
—— acetosa Schum. — Wstd. 285.
—— Acheroïs Spr. — Wstd. 127.
—— Actaeae S—l. — Kl. 289.
—— Adoxae Awd. — Kl. 1197.
—— aecidioides DC. — Wstd. 127.
Uredo acrigina Chev. — Wstd. 127.
—— Agrimoniae Schw. — cf. Potentillae, Carol.
—— Agropyri. — Sturm h. 25—. t. 1. (Preuss.). — Kl. 1696.
—— Albertiniana Spr. — Wstd. 228.
—— Alchemillae P. — [S. 515.] — Kl. 287. —
—— Kl. II. 383. — huc: Trachyspora Alchem. Fuck. Voges. 91. — Wstd. 1168. (Uromyc.).
—— Alliorum. — [S. 514.] — Bisch. f. 3874. — Dsm. 573. — Lib. 86. — Wstd. 567.
—— alnea. — [S. 520.]
—— Alsineacearum. — [S. 515.]
—— Amaranthi. — Journ. hort. Soc. 1848. III. p. 270. f. 4. (Berk.).
—— ambigua. — Kl. 1797. — Fuck. s. 92. — Fuck. rh. 400. (limbata et ambig.).
—— Andropogonis (Podocystis). — Kl. 1997. — Fuck. Nass. f. 9. — Fuck. s. 76. — R. f. 595. — Ital. 663. — Fuck. rh. 407.
—— Androsaemi DC. — Wstd. 565.
—— Anemones (Polycystis) P. — [S. 516.] — Wstd. 678. — Krypt. Bad. 541. — Dsm. 721. — Kl. 1297.
—— annularis Strss. — Wstd. 753.
—— antherarum. — [S. 516.] — cf. Ur. violacea.
—— apiculata Strss. — [S. 511.] — Kl. 277. — Wstd. 287. — Schweiz. 1. — Fuck. rh. 383—386.
—— —— v. Astragali Lasch. — Kl. 895.
—— —— f. Cytisi. — R. f. 93.
—— —— f. Phaseoli. — (Kl. II. 364: appendic.). — Fuck. s. 89. b.
—— —— f. Pisi sativi. — Kl. II. 363.
—— —— v. Trifolii arv. — Kl. 1697. — Kl. II. 362.
—— —— v. Viciae. — Kl. II. 766.
—— apiculosa. — Wstd. 387.
—— —— Berk: Dsm. 572. — Brit. f. 116. 117.
—— —— v. Laburni. — Dsm. 233. — Wstd. 1172.
—— —— v. Phaseoli. — Letell. 619. 1.
—— —— v. Trifolii. — Dsm. 956.
—— Apii graveolentis. — Wstd. 841.
—— appendiculata P. — [S. 514.] — Kl. 93. — Krypt. Bad. 42. — (Uromyces) Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9. (P). — Fuck. s. 88. b. — de Bary, Br. t. 3. f. 6. — Kühn, Krkh. t. 5. f. 47—52. — Fuck. s. 88. a—c. — Voges. 191. (P. Ph.). — Wstd. 128. 1174. (Lathyri). — Fuck. rh. 380—382.
—— —— v. Fabae. — Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 12—14. (Tul.).
—— —— v. Phaseol. P. — Dsm. 360.
—— —— v. Pisi P. — Letell. 619, 2. — Dsm. 361. — Wstd. 838.
—— Armeriae. — Kl. 493. — Dsm. 356. — Wstd. 1166. (Uromyc.).
—— Artemisiae. — Kl. 486; — it. Cent. XVI.
—— —— Chev.: Dsm. 33. — Brit. f. 235. — Wstd. 748.
—— arundinacea N. — Wstd. 390. — Fuck. s. 40. — Dsm. 1077. — cf. Puccin. ar.: Fuck. rh. 320.
—— Asparagi Lasch. — Kl. 1180.
—— Avenae. — Oekon. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 1. f. 23—26. (cf. Ur. segetum).
—— Balsamitae Strss. — Kl. Cent. XIII.
—— Behenis. — [S. 514.]
—— Berberidearum Lk. — Kl. 95.
—— Betae P. — [S. 515.] — Kl. 582. — Kl. II. 798. — Fuck. s. 98. — Brit. f. 60. — Wstd. 286. — Ital. 249. — Fuck. rh. 398.
—— betaecola Bellk. — Wstd. 1170.
—— Betonicae Strss. — Wstd. 680.

Ured. Campanularum. — Coleosporium Lévil. — De Bary
Champ. parasit. in Ann. Sc. nat. 4e Sér. XX. Pl. 12. f. 5. 6.




293. — Kl. II. 797. — Fuck. s. 83. — Brit. f. 339. — Carol. IV. 97. — Ital. 899. — Fuck. rh. 406.
Uredo Filipendulae Lasch. — Kl. 580.
—— flosculorum. — [S. 516.]
—— Flosculosarum DC. — Loud. f. 16661.
—— —— A. S.: R. f. 91. — Fuck. s. 57. — Kl. II. 360. (Uromyces). — Wstd. 287.
—— —— v. Arctii tom. — R. f. 499.
—— foetida. — Ann. sc. n. 1824. II. t. 7.
—— formosa. — [S. 515.] — Kl. 278. — ? Wstd. 818.
—— —— v. Cichoracearum. — Kl. 1698.
—— fraterna (Uromyces). — Kl. II. 693.
—— frumenti. — Wstd. 91. 331.
—— fulva P. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 11. (Keimg., Hoffm.). — Wstd. 126. 1165. (Senec.).
—— —— v. Sonchorum Sch. — Fuck. s. 33. b.
—— fusca Bon. — R. f. 192. — cf. globoso-fusca.
—— fusco-virens (Ustilago). — Kl. 1197.
—— Galii. — Kl. 585. — R. f. 500. — Dsm. 720. — Wstd. 814.
—— Geranii (Uromyces). — [S. 514.] — Kl. 88.
—— —— DC.: Loud. f. 16617. — Fuck. s. 74. — Dsm. 722. — Kl. II. 295. — Wstd. 671.
—— globoso-fusca. — Bon. Con. p. 196. t. 2. f. 21 = fusca Bon. ap. R. f. 192.
—— globoso-rufa. — Bon. Con. p. 197; huc Caeoma porphyrogeneta Lk.
—— glumarum Rob. — Dsm. 1076. — Wstd. 568.
—— Graminis. — Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
—— gyrosa Rbt. — Wstd. 386. — Bisch. f. 3872. — (Epitea) Kl. 477. — Fuck. s. 36. b. — ? R. f. 189.
—— Helianthi. — Carol. II. 93.
—— Helioscopiae. — Kl. 290; it. Ct. V, Suppl. — Wstd. 288.
—— Hydrocotyles. — Dsm. 1723.
—— Hydropiperis Schum. — cf. Ustilago Candollei Tul. — Wstd. 1163.
—— Hypericorum DC. — [S. 515.] — Kl. 483. — Fuck. s. 77. — Dsm. 660. — Wstd. 565. — Fuck. rh. 402.
—— hypodytes (Ustilago). — [S. 516.] — Kl. 83. — Wstd. 572. 1161. (Tritici).
—— —— f. Tritici. — Dsm. 473.
—— Idaei Mart. — Wstd. 386.
—— Impatientis Schultz. — Kl. 288.
—— inaequialta (Uromyces) Lasch. — R. f. 94.
—— inconstans. — Wstd. 331. (gram.), 333 (semin.), 334 (spiculaecola).
—— intrusa Grev. — Wstd. 1169.
—— Inulae Kz. — Kl. 589. — Fuck. Nass. f. 10. Fuck. s. 82.
—— Ipomaeae. — Carol. IV. 99.
—— Iridis Dub. — Brit. f. 59. — Kl. 581.
—— Junci. — Fuck. rh. 379.
—— Labiatarum Lk. — [S. 515.] — Wstd. 388.
—— —— f. Calaminthae. — Brit. f. 233.
—— —— f. Clinopodii. — Kl. 98. 1195.
—— —— f. Menthae. — Kl. 98. 1195; Kl. II. 297. — Brit. f. 232. — Krypt. Bad. 142.
—— Laburni DC. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 7. f. 32—34. (Tul.). — Wstd. 1172.
—— Lapsanae Rbh. — Kl. 478. — Fuck. Nass. f. 6. p. 13.
—— Lathyri Bellk. — Wstd. 1174.
—— Ledi A. S. — [S. 515.] — Kl. 195.
—— Leguminosarum. — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 9: 2. — Kl. 92. (cf. Uromyces). — Letell. 619. 3. — Wstd. 284. 846. — Fuck. rh. 387 —391.

Uredo Leguminosarum v. Fabae. — Dsm. 362. — Kl. 480. — Kl. II. 361. — Fuck. s. 90. b. d. — cf. Uredo Fabae.
—— —— v. Fabarum. — Krypt. Bad. 405.
—— —— v. Glycyrhizae. — Kl. 799.
—— —— v. Lathyri. — Kl. 1189.
—— —— v. Medicaginis. — Kl. II. 386.
—— —— v. Viciae. — Kl. 1189.
—— Leguminum. — Dsm. 234.
—— leucosperma Spr. — Wstd. 662.
—— Ligustri Rbh. — Kl. 579.
—— lilacina Rob. — Dsm. 1082.
—— limbata. — cf. Ur. ambigua.
—— —— v. Alliorum. — Kl. 1193. — Fuck. s. 75.
—— Limonii Dub. — Démid. Russ. t. 6. f. 1.
—— linearis P. — [S. 515.] cf. Trichobasis. — Wstd. 331.
—— —— Strss.: Wstd. 91. — 561: v. Polypodii. — Krypt. Bad. 345. — Kl. 794. — Fuck s. 39. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 13. (Keimg., Hoffm.). — zu Puccin. Gramin.: Kühn, Krankh. t. 5. f. 16; — Ann. sc. n. 1851. II. t. 9. f. 1—8. — (Tul.).
—— —— frumenti: Voges. 288.
—— —— v. Polypodii: Voges. 289. — cf. Puccin. Gramin.: Fuck. rh. 319.
—— Lini. — [S. 512.] — Dsm. 133. — Loud. f. 16643. — Fuck. s. 30; zu Melampsora, Tul. — (Podocystis) Kl. 182. — Voges. 90. — Brit. f. 118. — Wstd. 1179. — cf. Melamps. Lin.: Fuck. rh. 301.
—— Lobeliarum. — Kl. 1597.
—— longicapsula. — Wstd. 129. (v. Betulae). — cf. Melampsora pop., Carpin.
—— —— f. betulina DC. — cf. Melampsora bet.
—— —— f. Carpini. — Fuck. s. 26.
—— —— f. populina DC. — cf. Melamps. pop. — Fuck. s. 25. c.
—— longipes. — Kl. 1995. 1295. — (Epitea) Kl. 893.
—— —— f. Legumin. — Kl. 1799.
—— longissima (Ustilago) Sow. — [S. 516.] — Wstd. 232. — Kl. 84. — Fuck. s. 103. — cf. Caeoma l. — Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 5. (Keimg., Hoffm.). — Brit. f. 230.
—— —— v. Holci. — Kl. 1498.
—— —— v. megalospora. — Kl. 1897.
—— Luzulae. — Dsm. 1360; III. 651. — Wstd. 566.
—— Lychnidearum. — [S. 515.] — Dsm. 662. — Kl. II. 698.
—— macrospora. — Dsm. III. 401.
—— maculosa Strss. — Wstd. 848.
—— Majanthae. — Norweg. 88.
—— marginalis. — Kl. 1499. — Kl. II. 388.
—— Maydis (Ustilago). — Carol. IV. 100. — Bisch. f. 3912. — Fuck. s. 108. — Dsm. 1081. — Kl. 193. — Pringsh. Jahrb. II. t. 21. f. 4. (Keimg., Hoffm.). — cf. U. Zeae. — Oekonom. Neuigk. v. Hlubeck. 1846. t. 3. f. 1—2.
—— Mei Kz. — Kl. 588.
—— Melampyri Rbt. — Kl. 584. — cf. Coleospor. Rhinanthac. — Wstd. 669.
—— Menthae P. — [S. 515. 5.] — Fuck. s. 50. — Wstd. 388.
—— Mercurialis. — [S. 515.] — Kl. 1190. — Kl. II. 387. — Fuck. s. 7. — Dsm. 955. — Wstd. 668.
—— miniata (Epitea) P. — Voges. 187. — Kl. 1100. — Bon. t. 2. f. 41. — Fuck. s. 5. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 9. (Keimg., Hoffm.). — Letell. 619, 4. — Wstd. 1179. (Lini).
—— minima. — Bon. Con. p. 196. t. 2. f. 23.

Uredo mixta (Epitea) Kz. — Kl. 119. — Fuck. s. 28. a. — Brit. f. 120. — Wstd. 812. — cf. Melampsora sal.: Fuck. rh. 296.
—— mucronata Strss. — Wstd. 131.
—— muricella Wllr. (Angelicae, Saniculae). — Kl. 1196; it. Cent. XV; 1169, Suppl. — Fuck. s. 61.
—— —— f. Oreoselini. — Kl. II. 366.
—— Muscari. — Dsm. 1724.
—— mycophila P. — Wstd. 436.
—— nivalis Bauer. — Wstd. 790.
—— obconica Bon. — R. f. 191. — Bon. Con. t. 2. f. 22. (p. 196.)
—— oblonga. — Kl. 1694.
—— oblongata. — [S. 515.] — Kl. II. 381. — Loud. f. 16629.
—— obtegens Lk. — Wstd. 87.
—— obtusa Strss. — Wstd. 860.
—— obtusata Lk. — Wstd. 329.
—— occulta. — Kühn, Krankh. t. 2. f. 13—34; t. 4. f. 11—13. — Kl. II. 393. — Kl. 1898. (Polycystis). — Dsm. 1725. — Wstd. 335. — Fuck. rh. 256.
—— olida — Kl. 1695. — Caeoma ol. Bon. Con. 174.
—— olivacea (Ustilago) DC. — [S. 516.] — Kl. 1192.
—— orbicularis Mart. — Wstd. 843.
—— Orchidis. — [S. 515.]
—— Oreoselini. — cf. Puccin. Umbellif.
—— Ornithogali S. K. — Kl. 587.
—— ovata Strss. — Dsm. 661. — Fuck. s. 25. a. — Wstd. 129. 1173. 1178. (Uromyc.). — R. f. 596. (Semperv.).
—— Oxalidis. — [S. 511.] — Ann. sc. n. 1841. XVI. t. 14. u. 15. f. 8. (Lév.). — Caeoma canum Bon. Con. 174.
—— Padi. — [S. 515.] — Kl. 1699.
—— Paeoniarum. — Dsm. 1364. — Wstd. 1172.
—— parallela. — [S. 516.]
—— Parnassiae. — Wstd. 676.
—— penicillata Spr. — Wstd. 556.
—— Phaseoli Strss. — Bisch. f. 3891. — Carol. II. 94. — Wstd. 387.
—— Phaseolorum? cf. Puccinia Phaseol. — Wstd. 128. 838. (Pisi).
—— Phragmitis Schum. — Wstd. 186.
—— Phyteumatum. — [S. 514.] — Ung. Ex. t. 7. f. 35.
—— piluliformis. — Hook. Lond. Journ. 1843. II. t. 22. f. 6. (Berk.).
—— Pimpinellae Bellk. Wstd. 811.
—— Pisi DC. — Wstd. 838.
—— Poae sudeticae. — Wstd. 1268.
—— Polygoni Fuck. (Uromyces). — Fuck. rh. 399.
—— —— Convolvuli: Wstd. 749.
—— Polygonorum (Uromyces) DC. — [S. 514.] — Dsm. 355. 476; III. 751. — Kl. 292. — Fuck. s. 46. — Ital. 665. — Kl. II. 294. — Loud. f. 16620. — R. f. 487. — Brit. f. 231. — Carol. IV. 98. — Wstd. 283.
—— polymorpha Strss. — Wstd. 288. 672. 1179.
—— Polypodii DC. — Wstd. 561.
—— pompholygodes (Polycystis) S—l. — Kl. 86. — Brit. f. 236. — Wstd. 1181.
—— Populi Mart. — Kl. 488. 798. — cf. Caeoma p. B. — Purton. I. t. 27.
—— populina. — Wstd. 129.
—— —— f. betulina. — Fuck. s. 29. — cf. Melampsora bet.: Fuck. rh. 299.
—— porphyrogeneta. — [S. 515.]
—— Portulacae Dec. — Wstd. 330.


Uredo Portulacae DC.: Dsm. 363.
—— Potentillae. — cf. Phragmid. Pot. — Carol. II. 97. (Agrimoniae Schw.).
—— Potentillarum. — Kl. 91. — Dsm. 130.
—— —— DC: zu Phragmid. obtus.: Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 18—23 (Tul.). — Fuck. s. 34. 35. a. — Brit. f. 115. — Wstd. 561. 672.
—— —— f. Agrimoniae. — Kl. 796, 1800.
—— Poterii Spr. — Wstd. 561. — cf. Phragmid. apicul.: Fuck. rh. 312.
—— —— S—l. — Kl. 282. — Fuck. s. 35. b.
—— Prunastri. — Carol. II. 95.
—— Pruni Cast. — Dsm. 1081. — Fuck. Nass. f. 12. — Fuck. s. 96. — Wstd 569.
—— Prunorum DC. — ? Wstd. 569.
—— Pseudo-Cyperi. — [S. 516. 4.] — Wstd. 815.
—— puccinioides. — Kl. 1596.
—— Pulsatillae DC. — Kl. 999.
—— pustulata. — [S. 515?] — Fuck. s. 85. (Podocystis). — Dsm. 724. — v. Epilobii P.: Wstd. 570. 674. (c. v. Cerast., Caryoph.). 1267 (Salic.). — Fuck. rh. 409.
—— Pyrolae. — [S. 515.] — Bisch. f. 3905. — Wstd. 1067. — Kl. 1194. — Krypt. Bad. 401. Ung. Ex. t. 6. f. 30. — Fuck. rh. 404.
—— Quercus. — Dsm. 1721. — Brit. f. 239. — Wstd. 562. — Ital. 600.
—— Quincunx Str — Wstd. 580.
—— Ranunculacearum (Uromyces). — [S. 516. 514.] — Brit. f. 237. — (Hellebori) Lib. 291. — Kl. 281. — Dsm. 1368. — Wstd. 580. 678.
—— —— f. Ficariae. — Krypt. Bad. 322.
—— Ranunculi. — Lib. 194. (Sporisorium).
—— Receptaculorum DC. — [S. 516.] — cf. Ustilago. — Dsm. 128.
—— Rhinanthacearum (Coleosporium). — Dsm. 954. — Kl. 283. — Fuck. s. 32. — Wstd. 381 (v. Euphras.); 669.
—— Rhododendri. — Kl. 1900. — R. f. 92.
—— ribicola Lasch. — Kl. 490. — Kl. II. 367.
—— Ribis. — [S. 515.] — Kl. 489.
—— Ringentium Mart. — Wstd. 384.
—— Roestelites Lk. — cf. Roestelia cancellata.
—— Rosae. — Letell. 619. 4. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 19. (Tul.). — (Epitea) Kl. 90. — Dsm. 359. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 10. (Keimg., Hoffm.). — Wstd. 229. — Fuck. rh. 313 (c. Phragmid. incrass.).
—— Rubi. — Ung. Ex. t. 7. f. 36. d. — Fuck. s. 36. a. — Wstd. 563.
—— —— Idaei P. — Wstd. 386.
—— Rubigo (Uromyces). — Kl. II. 365.
—— Rubigo vera. — [S. 515.] — Bon. t. 2. f. 50. — Fuck. s. 41. — Kl. 1599. — Bot. Zt. 1859. t. 11. f. 1. (Keimg., Hoffm.). — zu Puccin. coron.: Kühn, Krkht. t. 5. f. 43—45. — Carol. I. 100. — Wstd. 231. — cf. Puccin Straminis: Fuck. rh. 321.
—— Ruborum DC. — Voges. 92. — ? Fuck. s. 37. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 11—18. (Tul.). — Fuck. s. 36. b. — Pay. b. cr. p. 75. f. 343 u. 347—350. — (Epitea) DC.: Kl. 797. — zu Phragmid. bulbos.: Ann. sc. n. 1854. II. t. 9. f. 15—17. (Tul.). — Wstd. 563. — Ital. 354. — Fuck. rh. 314. (c. Phragmid. incrass.).
—— Rumicis Lasch. — Kl. 476.
—— Rumicum DC. — Kl. 497. — Fuck. s. 97. (cf. Uromyces R.). — Krypt. Bad. 103. — Kl. II. 359. — Wstd. 285. — Ital. 895. — Fuck. rh. 397.
—— Sagittariae. — Wstd. 1177.
—— Saliceti. — Kl. 485. — Wstd. 86.




Ured. Sempervivi. — Endophyllum Lévl. — De Bary Champ. parasit. in Ann. Sc. nat. 4e Sér. XX. Pl. 12. f. 1-4. (1863)


Uredo Salicis. — Ung. Ex. t. 5. f. 25; t. 6. f. 31. — Bisch. f. 3907. — Kl. 491.
—— Saxifragarum. — [S. 515.] — Kl. 1096. 1191. — Kl. II. 385.
—— Schlechtendalii DC. — Kl. 87.
—— Scillae (Uromyc.). — Fuck. rh. 401.
—— Scirpinii. — Wstd. 1266. — R. f. 591.
—— Scrophulariae Lasch. — Kl. 198. — Ital. 353. (Uromyc., Aecid.). — Fuck. rh. 395.
—— scutellata P. — Voges. 93. — Kl. 583; it. Cent. IX. Suppl. — Uromyces. — Kl. II. 293. — Fuck. s. 91. — Fuck. rh. 396.
—— Secalis. — Kl. 1399. — André, Ökon. Neuigkeiten. 1818. t. 1. (Cd.).
—— Sedi DC. — Wstd. 1173. — R. f. 597.
—— segetum P. (Ustilago Carbo.). — [S. 516.] — cf. Avenae. — Fl. dan. XII. 2150. 1. — Kl. 81. — Pringsh. Jahrb. II. t. 26. f. 2. (Keimg., Hoffm.). — Voges. 291. — Carol. II. 99. — Ökonom. Neuigk. v. Illubeck. 1846. t. 2. f. 1—8. — Wstd. 334. (Hord. Aven.).
—— Sempervivi. — Ung. Ex. t. 3. f. 16; t. 5. f. 24. — Bisch. f. 3904. — Kl. 1899. — Kl. II. 699. — Letell. 621. 4. (Sedi). — Wstd. 1173. — R. f. 597. — Ital. 661.
—— Senecionis. — Wstd. 230. — Kops. Fl. bat. XI. 880. 2. — (Coleosporium) Kl. 286. — Fuck. s. 33. d. — Pringsh. Jahrb. II. t. 27. f. 12. (Keimg., Hoffm.).
—— —— Schum. = U. globoso-flava Bon. Con.
—— Silenes. — Fuck. rh. 392.
—— sitophila (Ustilago) Ditm. — [S. 516. Caries] Oekonom. Neuigk. v. Illubeck. 1846. t. t. f. 1 22. — Kl. 1398. — Tilletia Caries Tul — Fuck. s. 112. — Wstd. 333. — Sturm h. 3. t. 34.
—— Smilacis. — Carol. II. 96.
—— solida (Uromyc.). — Carol. IV. 92.
—— Solidaginis. — Fuck. Nass. f. 11. — Fuck. s. 95. — Carol. III. 96.
—— Sonchi P. — Wstd. 126.
—— sororia Lasch (Uromyc.). — Kl. 1291.
—— sparsa. — [S. 514.]
—— Spermacoces. — Carol. II. 91.
—— Spiraeae Sow. — Wstd. 1167. — zu Triphragm. Ulmar.: Ann. sc. n. 1854. II. t. 10. f. 17. (Tul.).
—— Stellariae. — Fuck. s. 84.
—— striaeformis. — Wstd. 677. (Ustilago macrospora Dsm.).
—— Striola Strss. — Wstd. 186.
—— suaveolens. — [S. 515.] — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 6. f. 1—10. (Tul.). — Fuck. s. 59. — Pay. b. cr. p. 75. f. 345. 346. — de Bary Br. t. 3. f. 1—4. — Dsm. 129. — Kl. 280. — Kl. II. 389. — Voges. 189. — Wstd. 87. — Ital. 664.
—— subcorticalis. — [S. 520.]
—— Symphyti DC. — [S. 515.] — Dsm. 357. — Kl. 285. — Fuck. s. 78. — Kl. II. 200. — Brit. f. 320. — Wstd. 332. — Ital. 50. — Fuck. rh. 403.
—— Syntherismae. — Carol. II. 98.
—— Tanaceti. — Kl. 487. — Kl. II. 198. — Wstd. 847.
—— Taraxaci P. — Kl. 474.
—— tecta. — Fuck. Nass. f. 3. p. 10.
—— Terebinthi DC. — Kl. 1095. — Kl. II. 199. Dsm. 1365. — cf. Pileolaria T.
—— Toxicodendri. — Carol. III. 97.
—— Tragopogonum. — Kl. 481.
—— —— prat. P. — cf. Ustilago recept. f. Tragopog. — Wstd. 329.

Uredo tremellosa. — [S. 512.] cf. Erannium aureum Bon. — Wstd. 385.
—— —— v. Sonchi Strss. — Kl. 294. — cf. Coleospor. Sonchi.
—— —— v. Senecionis. — Kl. 295. — Wstd. 1165.
—— Trifolii DC. — Wstd. 387.
—— Tropaeoli. — Dsm. 37. — Wstd. 839.
—— tuberculata. — Fuck. s. 86. — Fuck. rh. 408.
—— Tussilaginis P. — Bisch. f. 3911. — Ung. Ex. t. 5. f. 26. — Fuck. s. 33. a. — cf. Erann. aurantiac. u. Caeoma Tuss. — Wstd. 126.
—— —— Farfarae P. — cf. Coleospor. Tuss.
—— Ulmariae Grev. — Wstd. 1167. (Uromyc.).
—— Umbellatarum Lk. — Kl. 284. — Dsm. 31. — Fuck. s. 61. = Ur. muricella f. Conii etc. — Letell 621. 3. (Cicutae). — Wstd. 389. 841. — R. f. 596.
—— Umbelliferarum. — [S. 514. 515, 7.]
—— urceolorum (Caricis P.). — Dsm. 1083. — Brit. f. 114. — Wstd. 750. 1162.
—— utriculosa. — [S. 516.] — Cd. Anl. t. B. f. 3: 3. 4. — Fuck. s. 110. (cf. Ustil. Candoll.). — Dsm. 32. — Kl. 1099. — Wstd. 1163.
—— Vaccinii A. S. — Kl. 484. 795. — Fuck. s. 80.
—— Vacciniorum. — [S. 515.] — Wstd. 1066. — Dsm. 478. — Fuck. rh. 405.
—— Valerianae. — Kl. 894. — Kl. II. 382. — Fuck. s. 81. — Dsm. 482. — Brit. f. 319. — Wstd. 571. — Fuck. rh. 394.
—— Vepris. — Dsm. 1722.
—— Veratri DC. — Kl. 296. — Kl. II. 98. — Dsm. 1361. — Ital. 800.
—— Viciae Bellk. — Wstd. 816. 849 (Ervi). 1175 (v. cracc.).
—— Vincae DC. — Brit. f. 231. — Dsm. 477.
—— Vincetoxici DC. — Fuck. s. 100.
—— violacea P. — Kl. 87; it. Cent. VI. Suppl.; — 87. b. (Cent. XIV.); 87 (Cent. XVIII.). — Fuck. s. 105. — Letell. 629. 2 (antherar.).
—— Violae. — Kl. 1796.
—— Violarum DC. — Fuck. s. 71. — Dsm. 180. — Wstd. 840.
—— Vitellinae DC. — Fuck. s. 28. c. — Wstd. 86.
—— Zeae. — cf. Ur. Maydis. — Dsm. 474.
Urnula. — [S. 361.]
—— Craterium. — Carol. I. 39 (cf. Peziza Cr.).
—— minor. — Afzel. t. 12. f. 28.
Urocystis. — cf. Uredo.
Uromyces. — [S. 364.] cf. Uredo.
Ustilago. — [S. 516.] cf. Uredo, Tuburcinia.
—— antherarum. — [S. 516.] — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 4. f. 12—19. — t. 5. f. 23 (Tul.). — de Bary Br. t. 1. f. 6—8. — Kl. II. 100. — Dsm. III. 403.
—— axicola. — Ann. Mg. n. h. 1852. IX. t. 8. f. 2. p. 200. (Berk.).
—— Candollei. — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 3. f. 20. 21. (Tul.). — Fuck. s. 110 (Uredo utriculosa Cd.). — Kl. II. 700. — R. f. 399 (Uredo Hydropip. S.). — Fuck. rh. 250.
—— capsularum. — [S. 516: Th. h.]
—— Carbo (cf. U. segetum). — (hordei) Pay. b. cr. p. 120. f. 565; p. 58. f. 244. — Kühn, Krankh. t. 4. f. 7—9. — (aven.) Kühn, Krankh. t. 3. f. 10—21. — (evolutio) Ann. sc. n. 1830. XX. t. 2. (A. Brongniart). — Ann. sc. n. 1847. VII. t. 3. f. 1—12 (Tul.). — Kolaczek, Lehrb. d. Bot. 1856. 6: a. — (aven.) Pay. b. cr. p. 120. f. 561.
—— Caricis. — Fuck. s. 109. — Fuck. rh. 249.
—— Cissi DC. = Puccinia incarc. Lév. (Tul.).





Valsa melastroma Fr. — [S. 412.] — R. f. 254. (= V. stellulata Fr.).
—— microcarpa. — [S. 412.]
—— microstoma. — [S. 411.] cf. Microstoma vulg. Awd. — Fuck. s. 449.
—— monadelpha Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 165.
—— nivea. — [S. 411. 410***.] — Kl. II. 635. — Fuck. s. 452.
—— Pini A. S. — [S. 412.] — R. f. 147.
—— platanigera (Obvallatae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 12. (B. B.).
—— profusa. — S. 411.]
—— Prunastri. — [S. 411.] — Fuck. s. 461.
—— pulchella. — [S. 412.] — Fuck. s. 441. — R. f. 525.
—— pusilla. — [S. 412.]
—— quaternata. — [S. 412.] — R. f. 255. — Fuck. s. 439. — Krypt. Bad. 334.
—— salicina Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 444.
—— scutellata Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 451. — R. f. 321.
—— Sorbi. — [S. 411.]
—— spectabilis. — [S. 412.]
—— sphinctrina. — [S. 412.]
—— stellulata Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 440. — R. f. 254. (mel.).
—— stilbostoma — [S. 412.] Fuck. s. 443. — Carol. III. 68. — Wstd. 906.
—— suffulta. — Kl. II. 56.
—— suffusa. — [S. 412.]
—— syngenesia Fr. — [S. 411.] — Fuck. s. 451.
—— Taleola (Incusae). — [S. 411.] — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 9. f. 11. (B. B.) — Carol. III. 69.
—— tessella. — [S. 411.]
—— tetratrupha (Obvallatae). — Ann. Mg. n. h. 1859. III. t. 10. f. 13. (B. B.).
—— thelebola. — [S. 412.]
—— turgida (faginea). — [S. 412.] — R. f. 118. — Fuck. s. 445. — Wstd. 907.
—— umbilicata. — [S. 412. 40.]
—— vasculosa Fr. — [S. 412.] — Fuck. s. 438.
—— vestita. — [S. 412.]
Valsaria cf. Sphaeria.
Variolaria melogramma Bull. — cf. Melogr. vagans Not.
Venturia. — [S. 405.] cf. Sphaeria.
—— circinata. — [S. 405.]
Vermicularia. — [S. 419.] cf. Sphaeria, Depazea, Excipula. — Bail S. t. 16.
—— Chenopodii. — Wstd. 1238.
—— clavuligera Schw. — cf. Sporidesmium concinnum, Carol.
—— culmifraga. — [S. 419***. 420.] — Wstd. 987.
—— culmigena. — [S. 420.] — Dsm. 930.
—— Dematium Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 397. — Dsm. 1282. — Wstd. 578.
—— Dianthi. — Wstd. 393.
—— ditricha Fr. — [S. 420.] — Fuck. s. 395.
—— epixyla. — [S. 420.]
—— Geranii. — Wstd. 1239.
—— graminicola. — Wstd. 1241.
—— Graminum. — Lib. 318. — Dsm. 929. (Peziza strigosa Fr.). — Wstd. 184. — Excipula Gram. Cd. — Dinemaspor. gramineum Lév.
—— herbarum. —
—— —— f. Sedi. — Bull. ac. belg. 1. Sér. XXI. 2. p. 246. f. 5. (Wstd.). — Wstd. 1068.
—— hispida. — Lib. 347.
—— hispidula. — [S. 420.]
—— hypoderma. — [S. 420.]
Vermicularia Liliacearum. — Wstd. 1237 (Ornithogali, Scillae).
—— Luzulae. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 12. (Wstd.). — Wstd. 1242.
—— macrochaeta Dsm. — R. f. 345. — Dsm. 682. — Wstd. 1240. — Ital. 787.
—— maculans. — [S. 420.]
—— Mercurialis. — Bull. ac. belg. 2. Sér. 1857. II. p. 579. f. 13. (Wstd.).
—— metallorum. — [S. 419***.]
—— minuta. — Lib. 350. (Exospor.).
—— oblonga. — Dsm. 931.
—— protracta. — [S. 420.]
—— Pseudo-Sphaeria. — [S. 419***; 451. Carc.; 470**.]
—— pubescens. — [S. 451. Carc.; 470**.]
—— relicina. — [S. 420.]
—— Schoenoprasi Awd. — R. f. 316.
—— strigosa. — Lib. 349. (Pez. strig. v. hyst.).
—— trichella. — [S. 420.] — Dsm. 1281. — Kl. 1615. — Fuck. s. 396. — Lindl. v. K. p. 29. f. 6. — Voges. 973. — Wstd. 133.
—— velutina. — Carol. V. 76.
Verpa. — [S. 347.] — (Cidaris). — Bail S. t. 21.
—— agaricoides. — Sturm h. 6. t. 3.
—— atro-alba. — [S. 347.] — Bisch. f. 3360. — Sturm h. 6. t. 5.
—— conica. — [S. 347.] — Loud. f. 16205. — Sturm h. 6. t. 4.
—— digitaliformis. — [S. 340****.] — Pay. b. cr. p. 85. f. 380. — Kl. 1629. — Berk. Out. t. 21. f. 6. — Sturm h. 6. t. 2.
—— grisea. — Sturm h. 6. t. 6.
—— Krombholzii. — Cd. Anl. t. G. f. 67: 1—3. Sturm h. 6. t. 1.
Verticicladium trifidum Preuss. — Sturm h. 35. t. 8.
Verticillium. — [S. 490***.] — Verhältniss zu Trichothec. ros.: Bot. Zt. 1854. t. 8. A. (Hoffm.).
—— allochroum. — Sturm h. 11. t. 8.
—— apicale. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. p. 101. t. 7. f. 17. (B. B.).
—— Candelabrum. — Bon. t. 5. f. 121.
—— capitatum. — Bon. t. 5. f. 118.
—— corymbosum. — Zeitschr. f. wiss. Zool 1858. IX. t. 16. f. 1—5. (Lebert).
—— crassum. — Bon. t. 7. f. 149.
—— crustosum. — Kl. 1977.
—— cylindrosporum. — Cd. Anl. t. B. f. 17: 1. 2. — Pay. b. cr. p. 72. f. 316.
—— distans. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 16. p. 102. (B. B.).
—— epimyces. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 15. p. 102. (B. B.).
—— glaucum. — Bon. t. 5. f. 120.
—— hamatum. — Bon. t. 5. f. 117.
—— lateritium Htg. — Verhandl. Amsterd. Akad. XII. — Ann. sc. n. 1846. VI. = Acrostalagm. cinnab. Cd.
—— minutulum P. — Lotos. 1857. VII. t. I. f. 2.
—— nanum. — Ann. Mg. n. h. 1851. VII. t. 7. f. 18. p. 102. (B. B.).
—— ochro-rubrum. — Ann. sc. n. 1834. II. t. 2.
—— pyramidale. — Bon. t. 8. f. 179.
—— ruberrimum. — Bon. t. 7. f. 166.
—— tenerum. — [S. 491.]
Vibrissea. — [S. 360.]
—— flavipes. — Kl. 1627.
—— Guernisaci. — Ann. sc. n. 1857. VII. t. 4. f. F. (Crouan).
—— Persoonii. — Cd. Anl. t. G. f. 66: 3. 4.





Corrigenda et addenda.

Pag. 1. Acanthostigma cf. Sphaeria.
,, ,, Acremonium alternatum. — Sturm h. 1. t. 2.
,, 2. Actinonema Crataegi. — Fuck. rh. 456.
,, ,, —— Populorum. — Fuck. rh. 458.
,, ,, —— Rosae. — Fuck. rh. 457.
,, 8. Agaricus collariatus. — Sturm h. 14. t. 52.
—— coprinoides. — Sturm h. 14. t. 50.
,, 10. —— fragilis (Russula). — Sturm h. 14. t. 53.
,, 21. —— virescens. — Sturm h. 3. t. 47.
,, 23. Amylocarpus encephaloides. — Proceed. roy. Soc. Lond. 1859. IX. p. 123. c. ic. (Anat. Curr.).
,, 24. Ascobolus vinosus. — Berk. Out. t. 23. f. 1.
,, ,, Ascochyta (Cheilaria) Aceris. — Fuck. rh. 474.
,, ,, —— Armoraciae. — Fuck. rh. 486.
,, ,, —— Cannabis. — Fuck. rh. 484.
,, 25. —— Polygoni. — Kl. II. 442.
,, 29. Boletus picrodes Rostk. = impolitus? (Fr. in lit.).
,, 30. Botrytis Jonesii B. B. = Chaetocladium J., Fres.
,, 36. Chaetocladium Jonesii Fres. = Botrytis Jonesii B. B.
,, 40. Coniothecium Evonymi. — Fres. p. 103. t. 13. f. 25—28.
,, 58. Fumago vagans. — cf. Coniothecium Tiliae Fres.
,, 61. Helicoma Mülleri Fuck. = Helicosporium Fuckelii Fres.
,, 82. Oidium fusisporioides cf. et Ramularia Urticae.
,, 98. Podospora fimicola Ces. — cf. Sordaria fimiseda Not.
,, ,, Polyangium vitellinum. — Sturm h. 2. t. 27.

Typis Breitkopfii et Hartelii, Lipsiae.

